



ANNO ACCADEMICO 2006/2007

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN

PSICHIATRIA

1. Ognuno dei seguenti farmaci è utilizzato nel trattamento preventivo del disturbo bipolare tranne:
- A Sali di litio
 - B Carbamazepina
 - C Valproato di sodio
 - D* Clomipramina
 - E Lamotrigina
2. Quali delle seguenti patologie possono presentare una sintomatologia simile a quella del disturbo di panico:
- A Feocromocitoma
 - B Convulsioni parziali complesse
 - C Intossicazione da caffeina
 - D Ipoglicemia
 - E* Tutte le patologie indicate
3. Il disturbo da dimorfismo corporeo (dismorfofobia) è caratterizzato tipicamente da:
- A Elevata prevalenza
 - B Maggiore frequenza nel sesso femminile
 - C Umore depresso
 - D Tendenza all'irritabilità
 - E* Eccessiva preoccupazione (fino alla convinzione delirante) per una immaginaria deformità e/o per una modesta imperfezione fisica
4. La prevalenza nell'arco della vita del disturbo ossessivo compulsivo è di circa:
- A 0.2 - 1%
 - B* 2 - 3%
 - C 5 - 10%
 - D 10 - 20%
 - E oltre il 20%
5. I farmaci di prima scelta nel trattamento della fobia sociale sono:
- A* Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI)
 - B Inibitori delle Monoamino-ossidasi (MAO)
 - C Inibitori reversibili delle Monoamino-ossidasi (RIMA)
 - D Antidepressivi triciclici
 - E Benzodiazepine
6. I sintomi clinici di intossicazione da cocaina comprendono i seguenti segni tranne:
- A Sintomi psicotici con eccitamento
 - B Aritmie cardiache
 - C Ipertensione
 - D Convulsioni
 - E* Umore depresso
7. Quali tra i seguenti sintomi sono patognomici della schizofrenia:
- A Deliri
 - B Allucinazioni
 - C Eloquio e/o comportamento disorganizzato o catatonico
 - D Sintomi negativi (appiattimento affettivo, abulia, alogia)
 - E* Nessuno dei sintomi indicati
8. Il trattamento farmacologico di prima scelta del disturbo di panico è:
- A Antidepressivi triciclici
 - B Inibitori delle Monoamino-ossidasi (MAO)
 - C* Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI)
 - D Benzodiazepine
 - E Beta-bloccanti
9. Per fare diagnosi di bulimia nervosa le abbuffate devono essere:
- A Frequenti
 - B Sporadiche
 - C* Oggettive
 - D Soggettive
 - E Atipiche
10. Le caratteristiche della depressione atipica comprendono i seguenti sintomi tranne:
- A Ipersonnia
 - B Iperfagia e craving per i carboidrati
 - C Ipersensibilità al rifiuto
 - D Reattività dell'umore
 - E* Sintomi paranoidei
11. Quale tra i seguenti farmaci psicotropi ha una accertata "finestra terapeutica":
- A Clorpromazina
 - B Paroxetina
 - C* Nortriptilina
 - D Diazepam
 - E Carbamazepina
12. La più frequente condizione psichica in comorbidità con il disturbo post-traumatico da stress è:
- A* L'episodio depressivo maggiore
 - B Il disturbo ossessivo compulsivo
 - C Il disturbo di panico
 - D Il disturbo di somatizzazione
 - E Il disturbo delirante
13. Cosa differenzia l'anoressia nervosa dalla bulimia nervosa:
- A La compulsività delle abbuffate
 - B L'iperattività
 - C La frequenza delle abbuffate
 - D La durata delle abbuffate
 - E* Il peso corporeo
14. Quali tematiche sono di solito tipiche delle "ossessioni pure"
- A Idee di contaminazione
 - B Idee di simmetria
 - C Ossessioni numeriche
 - D* Idee ossessive a carattere religioso, sessuale, aggressivo
 - E Nessuna delle precedenti
15. I sintomi caratteristici dell'attacco di panico sono:
- A* Paura di svenire, morire, impazzire, perdere il controllo
 - B Paura del giudizio degli altri
 - C Paura di essere aggrediti
 - D Paura di particolari oggetti
 - E Nessuno dei sintomi indicati
16. Silvano Arieti è noto in modo particolare per:
- A aver introdotto la terapia di coppia
 - B aver studiato per primo la genetica della schizofrenia
 - C aver introdotto la terapia del sonno
 - D aver introdotto l'uso della clorpromazina
 - E* gli studi clinici sulla schizofrenia
17. In quale tipo di personalità disturbata si riscontrano instabilità affettiva, con frequenti comportamenti autolesivi, disforia e crisi d'instabilità e rabbia?
- A narcisistico
 - B compulsivo

- C* borderline
- D paranoide
- E passivo-aggressivo

18. Il delirium:

- A non è mai dovuto a eziologie molteplici
- B è tipico della schizofrenia efebrenica
- C* può essere dovuto sia a intossicazione sia ad astinenza da sostanze
- D è sinonimo di delirio
- E non presenta mai fluttuazioni giornaliere

19. La modalità più frequente del gesto nel tentato suicidio adolescenziale, è:

- A impiccagione
- B colpo di arma da fuoco
- C precipitazione
- D* assunzione di psicofarmaci
- E annegamento

20. Ai fini della prevenzione primaria dei disturbi mentali è utile:

- A attuare la terapia sin dall'esordio dei disturbi
- B aumentare i dosaggi dei farmaci assunti
- C* agire sui fattori di rischio
- D agire sulla compliance ai trattamenti
- E nessuna risposta è corretta

21. Il disturbo di ansia generalizzato è:

- A* cronico
- B acuto
- C una reazione ad eventi stressanti
- D ad evoluzione progressiva
- E espressione di una sindrome fobica

22. I "neurolettici" sono più propriamente chiamati:

- A tranquillanti
- B ipnotici
- C* antipsicotici
- D antidepressivi
- E nessuna delle risposte è corretta

23. L'ICD-10 è il sistema nosografico psichiatrico di:

- A Associazione Psichiatrica Americana
- B Società Italiana di Psichiatria
- C Associazione Europea di Psichiatria
- D* Organizzazione Mondiale della Sanità
- E nessuna risposta è corretta

24. Rientra fra i criteri diagnostici del delirium:

- A normale livello di coscienza
- B assenza di disturbi percettivi
- C assenza di disturbi del ritmo sonno-veglia
- D attività psicomotoria nella norma
- E* disorientamento nel tempo e nello spazio

25. Tra i seguenti sintomi della schizofrenia quale risponde peggio al trattamento con neurolettici:

- A agitazione
- B* appiattimento affettivo
- C allucinazioni
- D deliri
- E interpretazioni deliranti

26. Una "complicazione" del processo fisiologico del lutto può più frequentemente condurre a:

- A attacchi di panico
- B crisi catatoniche
- C* depressione
- D episodi schizofrenici
- E nessuno dei casi indicati

27. Chi "liberò i malati mentali dalle catene"?

- A Dejerine
- B Mayer-Gross
- C Tuke
- D* Esquirol
- E Pinel

28. Quale delle seguenti non è una caratteristica dell'anoressia nervosa?

- A precedente storia di obesità
- B difficile rapporto con la figura materna
- C* bassa estrazione sociale
- D amenorrea
- E comportamento autopunitivo

29. L'interdizione NON comporta per il soggetto il divieto di:

- A fare testamento
- B* rifiutare i trattamenti
- C contrarre matrimonio
- D acquistare un appartamento
- E aprire un conto bancario

30. In quale delle seguenti condizioni l'efficacia dei sali di litio viene generalmente considerata inferiore?

- A nel trattamento degli stati maniacali
- B* nel trattamento degli stati depressivi
- C nella profilassi degli episodi di eccitamento
- D nella profilassi degli episodi depressivi
- E le precedenti risposte sono tutte appropriate

31. I criteri diagnostici per la demenza vascolare sono:

- A* demenza, cerebrovasculopatia, correlazione temporale fra demenza e cerebrovasculopatia
- B età sempre <45 anni
- C ittero
- D pressione arteriosa nella norma
- E tutte le risposte sono errate

32. Il "Problem solving" si riferisce a:

- A la capacità di comprendere ed eseguire comandi scritti
- B la soluzione di conflitti inconsci problematici
- C la capacità di risolvere problemi matematici
- D la capacità di elaborare calcolo mentale complesso
- E* l'utilizzo clinico della psicologia cognitiva per insegnare ai pazienti ad identificare e a risolvere i problemi come parte di processi più generali di auto-controllo

33. Riguardo il disturbo autistico, gli studi di follow-up indicano che:

- A tutti i soggetti da adulti vivono in modo indipendente
- B i soggetti maschili raggiungono regolarmente l'indipendenza da adulti
- C* solo una piccola percentuale di soggetti riesce in età adulta a vivere in modo indipendente
- D molti soggetti autistici presentano esordio del disturbo in età presenile
- E i soggetti autistici adulti tipicamente superano i problemi comunicativi

34. Quale dei seguenti studiosi ha introdotto il concetto di "inconscio collettivo"?

- A Mead
- B Freud
- C Kardiner
- D Ey
- E* Jung

35. Cos'è un disturbo fittizio?

- A* la produzione intenzionale di segni o sintomi fisici o psichici
- B la convinzione di avere una malattia sconosciuta
- C la produzione inconsapevole di segni o sintomi fisici o psichici
- D un disturbo caratterizzato da perdita acuta della memoria di fissazione
- E l'incapacità a riconoscere di essere malati

36. Che cosa è un messaggio "paradossale" ?

- A è un messaggio ben augurante
- B è un messaggio caratterizzato dalla gioiosità
- C* è un messaggio che afferma una cosa ad un livello (per es. verbale) e la nega ad un altro livello (per es. non verbale)
- D è un messaggio esclusivamente pubblicitario
- E comporta domande aperte

37. Cos'è la confabulazione?

- A la falsa convinzione di vivere in un mondo fantastico
- B il bisogno ossessivo di raccontare favole
- C* la ricostruzione fantastica di lacune mnestiche
- D l'uso di un linguaggio ricercato
- E il dire bugie consapevolmente

38. Cos'è il Disturbo dell'Adattamento?

- A* lo sviluppo di sintomi emotivi o comportamentali clinicamente significativi

- in risposta ad uno o più fattori psicosociali stressanti identificabili
- B l'incapacità di accettare critiche al proprio operato
- C un'alterata percezione del proprio cambiamento corporeo nell'adolescenza
- D l'incapacità di riconoscere i ruoli sociali
- E un disturbo della memoria
39. Le allucinazioni più tipiche della schizofrenia sono quelle:
- A olfattive
- B tattili
- C* uditive
- D visive
- E cenestesiche
40. Secondo i parametri dell'O.M.S. (1980) si parla di insufficienza mentale grave il Q.I. è compreso fra:
- A* 0-25
- B 0-45
- C 25-50
- D 40-60
- E 50-70
41. La dinamica temporale degli antidepressivi prevede che molti degli effetti indesiderati insorgano:
- A* prima degli effetti terapeutici
- B contemporaneamente agli effetti terapeutici
- C dopo gli effetti terapeutici
- D una settimana dopo gli effetti sinaptici
- E dopo molti mesi di trattamento
42. Nell'ambito della schizofrenia la terapia familiare:
- A* mira a risolvere i problemi interni al nucleo familiare
- B mira a far esplodere i problemi del nucleo familiare
- C è controindicata
- D sostituisce la terapia farmacologica
- E è l'unica terapia efficace
43. Riguardo il decorso della schizofrenia:
- A i sintomi negativi tendono ad essere meno gravi col tempo
- B i sintomi negativi scompaiono del tutto
- C* i sintomi positivi tendono ad essere meno gravi col tempo
- D è caratterizzato da un'alternanza di fasi maniacali e depressive
- E non è influenzato dalla presenza di fattori stressanti
44. Quale delle seguenti condizioni caratterizza l'insorgere di una sindrome paranoide?
- A* idee di riferimento
- B idee di rovina
- C pensiero ossessivo
- D epilessia
- E catatonia
45. La tangenzialità è:
- A un disturbo extrapiramidale
- B un disturbo delle senso-percezioni
- C* un disturbo del pensiero
- D un rituale ossessivo
- E tipica del paziente depresso
46. Nel disturbo psicotico cronico indotto da alcol:
- A il quadro si sviluppa sempre durante una intossicazione acuta
- B* le allucinazioni possono essere sia uditive sia visive
- C il paziente non è mai un bevitore abituale
- D l'età media di insorgenza è intorno ai 18 anni
- E non vi è mai agitazione psicomotoria
47. La fobia sociale è un disturbo caratterizzato da:
- A* timore di situazioni nelle quali un individuo è in relazione sociale con altri
- B timore di trovarsi in luoghi dai quali sarebbe difficile allontanarsi
- C timore eccessivo conseguente alla vicinanza con animali
- D timore di fenomeni naturali presenti nell'ambiente
- E nessuna risposta è corretta
48. Le alterazioni psichiche e comportamentali della malattia di Alzheimer causano:
- A distress solo per la madre
- B nessuna preoccupazione
- C mai distress per i familiari
- D* distress per i caregiver
- E nessuna delle precedenti
49. Quali delle seguenti scale di valutazione misura la depressione?
- A Brief Psychiatric Rating Scale
- B Clinical Global Impression
- C Simpson Angus Rating Scale
- D* Hamilton Depression Rating Scale
- E Young Mania Rating Scale
50. Il sintomo agorafobico:
- A è un termine in disuso, che andrebbe sostituito con quello più appropriato di "nevrosi fobica"
- B non rientra nell'ambito generale della nevrosi fobica, perché va considerata come una manifestazione isterica
- C* può essere presente nel disturbo da attacco di panico
- D è un sintomo della schizofrenia
- E è un sintomo gravissimo, indicativo dell'esistenza di una seria psicosi latente
51. L'uso terapeutico della clorpromazina fu preconizzato da:
- A Roth
- B Charpentier
- C Meyer
- D* Delay e Deniker
- E Lambert
52. Nelle donne, il rischio di disturbi dell'umore è particolarmente elevato:
- A nella pubertà
- B nel primo trimestre di gravidanza
- C* nel periodo postpartum
- D prima del matrimonio
- E nel periodo premenopausale
53. In quale delle seguenti situazioni si osserva la sindrome di Cotard?
- A nevrosi traumatiche
- B stati involutivi
- C eccitazione maniacale
- D crisi di depressione nevrotica
- E* delirio melanconico
54. L'acido 3-metossi-4-idrossifenilglicole (MHPG) è:
- A* il principale metabolita della noradrenalina
- B un metabolita della serotonina
- C un metabolita implicato nella oligofrenia fenilchetonurica
- D un indice della schizofrenia
- E nessuno dei precedenti
55. I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura sono inseriti:
- A* in ospedali generali
- B solo in policlinici universitari
- C solo in cliniche private
- D all'interno di ex ospedali psichiatrici
- E all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari
56. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio in regime di degenza previsto dalla legge 833
- A* dura fino a 7 giorni ed è prorogabile
- B dura 3 giorni
- C dura al massimo un mese
- D dura almeno un mese
- E dura fino alla guarigione del paziente
57. Nel trattamento con antidepressivi, la terapia di continuazione è quella che, a partire dalla scomparsa dei sintomi, ha una durata compresa tra:
- A 2 settimane
- B 1 mese
- C* 4-8 mesi
- D 1-3 anni
- E per tutta la vita
58. Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione:
- A solo dell'attenzione
- B* di tutte le funzioni cognitive
- C solo della memoria
- D solo dell'orientamento temporo-spaziale
- E solo della memoria a breve termine
59. Nell'anziano i farmaci antipsicotici vanno usati:

- A alle stesse dosi di quelle utilizzate nei soggetti giovani
 B sempre in associazione a farmaci anticolinergici
 C a dosi superiori di quelle utilizzate nei soggetti giovani
 D* a dosi inferiori di quelle utilizzate nei soggetti giovani
 E preferibilmente a giorni alterni
60. L'acatisia è:
 A un disturbo dell'ideazione
 B un sintomo tipico della schizofrenia
 C indicativa di uno stato di ipotonia muscolare
 D la secchezza delle fauci indotta dagli antidepressivi triciclici
 E* una sindrome ipercinetica da neurolettici
61. Nella malattia di Alzheimer vi sono:
 A solo alterazioni macroscopiche del cervello
 B solo alterazioni microscopiche del cervello
 C* sia alterazioni macroscopiche che microscopiche del cervello
 D non sono mai riscontrate alterazioni del cervello
 E tutte le risposte sono errate
62. La teoria catecolaminergica sulla genesi della depressione si basa fra l'altro sul fatto che:
 A il depresso sta meglio alla sera
 B il depresso ha spesso inappetenza e stitichezza
 C* gli antidepressivi aumentano la quantità di catecolamine e viceversa gli antimaniacali la diminuiscono
 D la depressione spesso si alterna a mania
 E il depresso presenta tristezza vitale
63. Con *typus melancholicus* si contrassegna:
 A le caratteristiche della personalità pre-depressiva del bipolare
 B una forma particolare di nevrosi depressiva
 C depressione attenuata o sub-clinica
 D le caratteristiche della personalità post-depressiva
 E* le caratteristiche della personalità del candidato alla depressione monopolare
64. L'uso di antipsicotici durante la gravidanza:
 A comporta rischi maggiori nel primo trimestre rispetto al secondo e al terzo
 B va evitato se possibile
 C può forse favorire malformazioni congenite, ma il rischio reale è difficilmente quantificabile
 D può comportare una riduzione dei recettori della dopamina nel cervello del neonato
 E* tutte le risposte sono esatte
65. Attribuire ad una percezione reale, senza un motivo comprensibile, un significato abnorme, in genere nel senso dell'autoriferimento, è un fenomeno cui si dà il nome di:
 A allucinazione
 B* percezione delirante
 C disorientamento spazio-temporale
 D intuizione delirante
 E stato crepuscolare
66. Tutte le seguenti condizioni sono fattori di rischio per il disturbo depressivo maggiore tranne:
 A genere femminile
 B storia di una depressione precedente
 C* genere maschile
 D storia familiare di depressione
 E assunzione di alcol oppure abuso di sostanze
67. Di quale ordine di grandezza è dosaggio medio giornaliero dell'imipramina?
 A da 1 a 5 mg
 B da 10 a 20 mg
 C da 20 a 40 mg
 D* da 50 a 200 mg
 E da 350 a 800 mg
68. Quale, tra le seguenti, è la definizione più precisa di "censura onirica"?
 A Il lavoro attuato dalla coscienza per tenere lontani da sé le tendenze e i pensieri inconsci emessi durante il sonno
 B Un particolare tipo di tendenza inconscia, con la funzione di neutralizzare i desideri sessuali durante il sonno
 C Un particolare tipo di tendenza preconsocia, con la funzione di neutralizzare i desideri sessuali durante il sonno
 D* Un particolare tipo di attività preconsocia con la funzione di mascherare determinati significati inconsci dei sogni
 E Un particolare tipo di attività inconscia con la funzione di mascherare determinati significati dei sogni
- determinati significati dei sogni
69. Le allucinazioni sono:
 A alterazioni della vigilanza
 B disturbi della forma del pensiero
 C disturbi del contenuto del pensiero
 D percezioni distorte
 E* percezioni senza oggetto
70. Le allucinazioni cenestetiche sono:
 A* percezioni infondate di una alterazione dello stato di parti del corpo
 B sono percezioni alterate dello stato di equilibrio
 C sono più comuni delle allucinazioni uditive nei pazienti schizofrenici
 D sono impropriamente chiamate allucinazioni in quanto illusioni
 E la loro presenza esclude la diagnosi di schizofrenia
71. Eventi di vita stressanti (life events):
 A sono la causa della depressione endogena
 B sono più frequenti nelle forme bipolari che in quelle monopolari di depressione
 C* sono spesso associati all'insorgenza delle sindromi depressive
 D sono di più frequente riscontro nei casi gravi di depressione
 E sono un fattore che controindica il trattamento farmacologico della depressione
72. La terapia elettroconvulsivante è stata scoperta:
 A* in Italia alla fine degli anni '30
 B in Italia subito dopo la guerra mondiale
 C in Italia quasi contemporaneamente all'introduzione nella clinica della clorpromazina
 D in Ungheria da Sakel
 E in Austria da Von Meduna
73. I segni caratteristici del disturbo da conversione includono tutti i seguenti tranne:
 A* rigidità a ruota dentata
 B astasia-abasia
 C anestesia a quanto
 D riflessi normali
 E emianestesia del corpo che inizia dalla linea mediana
74. La prognosi della schizofrenia:
 A* è migliore quando il paziente coopera alla terapia farmacologica di mantenimento
 B non è in relazione con l'età d'insorgenza
 C è più favorevole nei soggetti non sposati
 D è migliore quando i genitori sono deceduti
 E è migliore quando i genitori sono separati
75. Nell'anziano i farmaci idrosolubili, come il litio:
 A vengono metabolizzati prevalentemente a livello epatico
 B* hanno un ridotto volume di distribuzione
 C hanno un accresciuto volume di distribuzione
 D non presentano alcuna modificazione del volume di distribuzione
 E devono essere somministrati a dosi maggiori rispetto ai soggetti più giovani
76. Il decorso classico della schizofrenia:
 A* è caratterizzato da esacerbazioni e remissioni
 B è caratterizzato da miglioramento continuo
 C non viene influenzato dalla terapia
 D è caratterizzato dal progressivo peggioramento dei sintomi positivi
 E non richiede mai ospedalizzazione
77. L'attuale legislazione prevede che il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) possa avvenire:
 A esclusivamente in regime ambulatoriale
 B esclusivamente in regime di degenza
 C solo in una città diversa da quella di residenza
 D* sia in regime di ricovero che in regime ambulatoriale
 E solo in reparto di medicina generale
78. La melanconia presenta tutte le condizioni seguenti tranne:
 A* reattività ad eventi esterni oppure a stimoli solitamente piacevoli
 B perdita di interesse oppure piacere per tutte le attività
 C peggioramento della sindrome al mattino
 D insensibilità ad eventi esterni favorevoli
 E profondi sensi di colpa

79. L'obiettivo più importante nel trattamento di un paziente alcolista è:
 A il ritorno a bere alcol solo in situazioni sociali
 B un periodo di trattamento con disulfiram
 C migliorare le relazioni interpersonali
 D bere solo bevande a bassa gradazione alcolica
 E* totale astinenza dall'alcol
80. Nella gestione del delirium del paziente anziano bisogna:
 A mantenere il paziente in ambiente sterile
 B stimolare il paziente in maniera da tenerlo sveglio
 C* ridurre le richieste eccessive e gli stimoli ambientali conflittuali
 D illuminare intensamente l'ambiente
 E non alimentare il paziente
81. Cos'è il pensiero magico?
 A convinzione di poter trasmettere magicamente il proprio pensiero
 B ripetizione ossessiva di formule magiche e scaramantiche
 C convinzione di potersi trasformare in un animale
 D* convinzione che i propri pensieri, parole, o azioni possano causare o prevenire qualche evento
 E esperienza allucinatoria di partecipare ad un sabbia di streghe
82. La legge di riforma psichiatrica (n.180 del 1978) è nota come:
 A legge "Burani"
 B legge "Pannella"
 C* legge "Basaglia"
 D legge "Segni"
 E legge "Mariotti"
83. La presenza di glaucoma e/o di ipertrofia prostatica controindica l'uso:
 A delle benzodiazepine ipnogene
 B* degli antidepressivi triciclici
 C dei barbiturici
 D degli antibiotici
 E delle amfetamine
84. La fissazione consiste in:
 A* un processo per il quale la libido rimane legata a precedenti stadi di sviluppo della personalità
 B una amnesia anterograda
 C regressione della libido ad una fase precedente
 D un impoverimento dell'energia pulsionale durante il passaggio da una fase all'altra
 E un'idea ossessiva
85. Nella valutazione del rischio suicidario vanno tenuti in considerazione in particolare i seguenti aspetti tranne:
 A supporti sociali
 B sesso
 C status psichico attuale
 D comorbilità somatica
 E* malattie esantematiche nell'infanzia
86. Chi ha introdotto il termine Dementia Praecox?
 A Jung
 B Bleuler
 C Jaspers
 D Pinel
 E* Kraepelin
87. In un paziente demente che presenti agitazione psicomotoria è indicato l'uso di:
 A benzodiazepine
 B barbiturici a basse dosi
 C* antipsicotici a basse dosi
 D sostanze placebo
 E clorimipramina
88. Le benzodiazepine nell'anziano:
 A possono raramente indurre amnesia anterograda
 B* possono indurre frequentemente amnesia anterograda
 C possono indurre mania
 D non alterano le funzioni psicomotorie
 E sono farmaci di prima scelta nel trattamento della depressione
89. Quale gruppo di individui sottoelencato ha la maggiore prevalenza di schizofrenia?
 A popolazione generale
 B* gemelli monozigoti di un paziente schizofrenico
 C gemelli dizigoti di un paziente schizofrenico
 D fratelli non gemelli di un paziente schizofrenico
 E figli di almeno un genitore schizofrenico
90. L'epilessia temporo- limbica:
 A è caratterizzata da crisi di assenza, senza altra sintomatologia
 B coinvolge soprattutto le vie di moto
 C* si può associare a manifestazioni psicotiche sia in fase critica sia in fase intercritica
 D presenta tracciato EEG costantemente negativo
 E non è mai accompagnata da fenomeni di depersonalizzazione / derealizzazione
91. Durante un episodio maniacale il paziente:
 A* si distrae con facilità
 B si autodenigra
 C è sempre coerente
 D è sempre triste
 E ha idee fobiche
92. Nella concezione freudiana, il complesso di Edipo viene risolto quando il bambino
 A sviluppa una relazione oggettuale con il genitore del sesso opposto
 B riesce a gestire il conflitto ansia-aggressività
 C entra nello stato di latenza
 D* si identifica con il genitore dello stesso sesso
 E riesce a controllare i meccanismi di difesa
93. Il disturbo schizoaffettivo può essere:
 A sempre di tipo maniacale/misto
 B sempre depressivo
 C* di tipo bipolare o di tipo depressivo a seconda della presenza di episodio maniacale o depressivo
 D non è incluso nei criteri diagnostici del DSM IV-TR
 E nessuna delle risposte risulta vera
94. L'avolizione è:
 A* un'incapacità a iniziare e persistere in attività finalizzate
 B la fobia del volo
 C una mancanza di buona volontà
 D il contrastare sistematicamente la volontà degli altri
 E un'incapacità a portare a termine attività finalizzate cominciate da altri
95. Quale di queste tecniche non è stata utilizzata nello studio della fisiopatologia della schizofrenia?
 A sviluppo di modelli animali della patologia
 B* biopsie cerebrali in vivo
 C rilievi postmortem su tessuto cerebrale autoptico
 D tecniche di neuroimaging
 E esposizione di probandi umani a sostanze psicotogeniche
96. La comparsa di attività muscolari involontarie è:
 A* una discinesia
 B una pareidolia
 C un sincretismo
 D una condensazione
 E un manierismo
97. I pazienti con episodio maniacale di solito:
 A i maschi sono più consapevoli di malattia delle femmine
 B sono perfettamente consapevoli di essere ammalati
 C* non riconoscono di essere ammalati
 D sono consapevoli di malattia solo se anziani
 E nessuna risposta è corretta
98. Nella schizofrenia, quale tra i seguenti non è un fattore di rischio?
 A madre affetta da schizofrenia
 B complicazioni ostetriche (rischio perinatale)
 C eventi stressanti
 D* clima temperato (rischio ambientale)
 E abuso di sostanze psicotrofe
99. Quale delle seguenti sostanze, contenuta in alcuni alimenti, può provocare una crisi ipertensiva in soggetti che assumono anti-MAO:
 A tirosina
 B acetilcolina
 C* tiramina

- D ac. oleico
E muscarina

100. Il tipo paranoide di schizofrenia è caratterizzato da:

- A marcata regressione ad un comportamento primitivo
B stereotipie e manierismi
C* presenza di deliri a tema persecutorio e di grandezza
D rapido deterioramento cognitivo
E alterazioni del movimento

101. In quale delle seguenti condizioni patologiche non sono tipicamente presenti disturbi della memoria?

- A nella demenza
B nell'epilessia
C nei traumi cranici
D* nella schizofrenia
E nei quadri tossi-infettivi

102. I gruppi Balint sono formati da:

- A pazienti che si sottopongono a psicoterapia di gruppo secondo le teorie di M. Balint
B medici che si sottopongono a psicoterapia di gruppo come parte di un training di formazione all'esercizio della psicoterapia di gruppo
C medici che si sottopongono a psicoterapia di gruppo per problemi personali
D medici che si sottopongono a psicoterapia di gruppo come parte di un training di formazione all'esercizio della psicoterapia individuale
E* medici che analizzano in gruppo, con l'aiuto di uno psicanalista, gli aspetti inconsci dei loro rapporti con i pazienti

103. Nei pazienti schizofrenici:

- A* ciascuno dei cinque sensi può essere colpito da allucinazioni
B le allucinazioni visive sono più comuni di quelle uditive
C possono sussistere solo allucinazioni uditive e visive
D la presenza di allucinazioni olfattive esclude la diagnosi di schizofrenia
E nessuna delle risposte è esatta

104. Quale dei seguenti farmaci è stato il primo antipsicotico "atipico"?

- A olanzapina
B clotiapina
C* clozapina
D risperidone
E tioridazina

105. Il ricovero in OPG viene revocato:

- A quando l'infermo viene giudicato guarito
B quando l'infermo accetta le terapie propostegli
C quando l'infermo viene giudicato migliorato
D* quando vien meno la sussistenza della pericolosità sociale
E quando lo decide il tribunale penale

106. Quali tra queste sostanze sono psicomimetiche?

- A antiaritmici
B barbiturici
C antiepilettici
D* amfetamine
E antidepressivi triciclici

107. Quale dei seguenti NON è un meccanismo di difesa dell'ansia?

- A* perseverazione
B dissociazione
C formazione reattiva
D sublimazione
E annullamento

108. Il litio è:

- A un antipsicotico
B* uno stabilizzatore del tono dell'umore
C un ansiolitico benzodiazepinico
D un antiepilettico
E un antidepressivo

109. L'amnesia di fissazione, la confabulazione ed i falsi riconoscimenti sono caratteristiche:

- A della parafrenia fantastica
B dell'intossicazione da morfina
C del delirium tremens
D* della sindrome di Korsakov
E dell'ansia

110. L'emiparesi isterica è:

- A dovuta ad un tumore del lobo frontale
B* un sintomo di conversione
C una simulazione pura
D una comorbidity medica
E un effetto collaterale dei trattamenti

111. Si definiscono primari quei deliri che:

- A sono causati da lesioni degenerative cerebrali
B consentono di porre diagnosi di schizofrenia
C esordiscono nell'infanzia
D* non possono essere spiegati da altri processi psicopatologici
E precedono i secondari

112. La sindrome maligna da neurolettici è:

- A* uno stato di ipertensione, tachicardia, leucocitosi, aumento delle CPK conseguente a somministrazione di svariati neurolettici
B una neoplasia cerebrale conseguente all'uso di fenotiazine
C una degenerazione irreversibile del nucleo rosso per eccessivo dosaggio di aloperidolo
D una rara forma depressiva a prognosi infausta che insorge dopo somministrazione di alte dosi di neurolettici
E una forma di epilessia da neurolettici

113. L'ereutofobia è:

- A la paura dell'altezza
B la paura degli animali
C la paura della folla
D* la paura di arrossire
E la paura di contrarre le malattie

114. L'olanzapina, rispetto all'aloiperidolo:

- A* è associato a un ridotta incidenza di parkinsonismo
B è un farmaco antipsicotico tipico
C dai dati di letteratura risulta leggermente meno efficace nel trattamento delle psicosi
D è associato ad un aumentato rischio di acatisia
E nessuna delle risposte è corretta

115. Quale dei seguenti antidepressivi ha il maggiore indice di tossicità letale?

- A SSRI
B SNRI
C* triciclici
D trazodone
E mirtazapina

116. Quale tra le seguenti benzodiazepine ha l'emivita più breve?

- A Clordiazepossido
B* Oxazepam
C Lorazepam
D Diazepam
E Nitrazepam

117. Negli episodi maniacali la autostima del paziente è di solito:

- A instabile
B* ipertrofica
C oscillante
D diminuita
E imm modificata

118. Segno evidente di dipendenza alcolica è:

- A confabulazione
B disturbo di memoria
C* comparsa di sintomi da sospensione
D cirrosi epatica
E tremore

119. Nel delirium tremens può essere opportuno instaurare una terapia farmacologica sedativa?

- A Sì con antidepressivi
B No perché peggiora lo stato confusionale
C No, piuttosto è meglio legare il paziente al letto
D Sì con barbiturici, tenendo conto del rischio di dipendenza
E* Sì con sulpiride, tenendo conto del rischio di dipendenza

120. Cos'è l'allucinosi?

- A una serie di allucinazioni ripetute con le stesse modalità
B la percezione di figure di animali mitologici

- C l'incapacità di percepire correttamente il significato delle situazioni vitali
D* una allucinazione criticata dal soggetto, che è consapevole di stare avendo un fenomeno patologico
E allucinazioni elementari in forma di lampi, colori, strie luminose
121. Quale tra le seguenti sostanze non è classificabile come neurolettico?
A olanzapina
B tioridazina
C* clorodiazepossido
D cloropromazina
E clotiapina
122. La prevalenza della demenza nei soggetti >65 anni:
A diminuisce in modo esponenziale con l'età
B* cresce in modo esponenziale con l'età
C rimane stabile nelle diverse età
D non si correla con l'età
E nessuna delle risposte precedenti è corretta
123. La coprofilia è una perversione sessuale caratterizzata da:
A godimento tramite il contatto con un indumento femminile
B godimento tramite animali
C* godimento tramite il contatto con escrementi
D godimento tramite l'esposizione dei genitali
E incapacità di raggiungere l'orgasmo
124. La malattia di Alzheimer, in Italia:
A è la forma più rara di demenza
B non esiste
C non comporta seri rischi per la salute della persona colpita
D* è la forma più frequente di demenza
E nessuna delle risposte precedenti è corretta
125. Nel paziente fobico l'angoscia insorge:
A nelle ore notturne
B in occasione di scompensi depressivi
C solo in presenza di catastrofi naturali
D solo se è in una condizione di etilismo cronico
E* davanti alla specifica situazione fobica
126. La durata media della malattia di Alzheimer è:
A 1 mese
B 6 mesi
C 1 anno
D* fra i 7 e i 10 anni
E oltre i 30 anni
127. Tutti i seguenti sono classificati come disturbi somatoformi tranne:
A disturbo di conversione
B ipocondria
C disturbo da somatizzazione
D disturbo da dismorfismo corporeo
E* sindrome di Gilles de la Tourette
128. Nella fase depressiva del disturbo bipolare è più frequente trovare:
A un delirio di grandezza
B* un delirio di colpa
C un delirio di fine del mondo
D confabulazione
E un delirio di gelosia
129. Cosa postula la teoria del doppio messaggio riguardo alla genesi della schizofrenia?
A che il modo di rapportarsi dei pazienti è scisso in funzione dell'ambito di interrelazione
B che i bambini crescono in una condizione di scarsa fiducia che altera la corretta evoluzione psichica
C che esiste una importante dissociazione tra i contenuti ideativi e quelli volitivi dei pazienti
D* che i bambini ricevono messaggi conflittuali in vari ambiti da parte dei genitori
E che i bambini reagiscono in modo duplice agli eventi stressanti
130. Quale dei seguenti trattamenti è efficace nel disturbo depressivo maggiore con sintomi psicotici:
A solo antidepressivi
B solo antipsicotici
C* antidepressivi più antipsicotici
D solo stabilizzatori dell'umore
E stabilizzatori dell'umore ed antipsicotici
131. Tra le seguenti patologie non rappresenta un disturbo psicotico:
A* disturbo ciclotimico
B disturbo schizofreniforme
C disturbo psicotico breve
D disturbo schizoaffettivo
E schizofrenia
132. La sospettosità pervasiva nei confronti degli altri è tipica:
A dell'autismo schizofrenico
B del disturbo ossessivo compulsivo
C della personalità evitante
D della fobia sociale
E* del disturbo paranoide di personalità
133. Disturbi psicotici dovuti a condizione medica generale:
A corrispondono a tutti i criteri del DSM-IV per la diagnosi di schizofrenia
B sono un ricorrente effetto di cardiopatia ischemica
C si curano tramite trattamento psicoanalitico
D* possono essere dovuti a endocrinopatie
E si curano tramite trattamento riabilitativo
134. Cos'è il transfert?
A la reazione emotiva dello psicoanalista a espressioni e comportamenti dell'analizzato
B* la ripetizione di vissuti infantili, incongrui con la situazione attuale, spostati sullo psicoanalista
C un meccanismo di difesa che consiste nel negare i propri conflitti
D un meccanismo di difesa che consiste nel proiettare all'esterno i vissuti inaccettabili
E esteriorizzazione dei conflitti interiori
135. In quali sintomi della schizofrenia sono presumibilmente coinvolti i gangli della base?
A iperaggressività
B* disturbi del movimento
C disturbi delle pulsioni istintuali
D disturbi delle facoltà associative
E disturbi dell'affettività
136. Cos'è la demenza vascolare?
A è una demenza secondaria ad un processo encefalitico virale
B è una demenza secondaria ad un processo infettivo sifilitico
C è una demenza secondaria ad un processo setticemico
D è una demenza secondaria ad un processo traumatico multiplo
E* è una demenza secondaria ad una progressiva alterazione dell'albero arterioso cerebrale
137. La legge psichiatrica del 1904 stabilisce che il ricovero coatto deve essere effettuato:
A solo per i pazienti che a causa della patologia mentale risultino di pubblico scandalo
B solo a pazienti pericolosi a se ed agli altri
C a pazienti schizofrenici privi dei genitori
D* per i pazienti che a causa della patologia mentale risultino pericolosi a se o agli altri o di pubblico scandalo
E a pazienti schizofrenici disoccupati
138. Quale/i dei seguenti farmaci può/possono accrescere i livelli plasmatici del litio?
A penicillina
B aminofillina
C mannitolo
D acetazolamide
E* diuretici tiazidici
139. La sindrome di Korsakoff è causata da:
A carenza di alcol
B carenza di acido folico
C carenza di vitamina C
D* carenza di vitamina B1
E carenza di vitamina B12
140. Tutti i seguenti sono effetti anticolinergici che possono essere indotti dagli antidepressivi triciclici, tranne:
A glaucoma
B* artrosi

- C ileo paralitico
D ritenzione urinaria
E confusione
141. La presenza di allucinazioni olfattive in un paziente:
A* deve far sospettare una causa organica seppure possano essere presenti in corso di schizofrenia
B devono far porre la diagnosi di causa organica in quanto incompatibili con la diagnosi di schizofrenia
C sono un fattore predittivo di farmacoresistenza
D obbligano all'immediato ricovero
E sono sempre presenti in corso di schizofrenia
142. Cos'è un'intuizione delirante?
A improvvise percezioni visive sotto forma di luci colorate, lampi, ecc.
B convinzione che le proprie intuizioni abbiano una provenienza divina
C* convinzione delirante che insorge improvvisamente
D convinzione che il proprio pensiero possa essere sentito dagli altri
E convinzione erronea che il comportamento degli altri abbia riferimenti a se stessi
143. Gli antipsicotici "ad alta potenza" (aloperidolo) rispetto a quelli "a bassa potenza" (clorpromazina):
A* comportano un accresciuto rischio di effetti collaterali neurologici
B comportano un accresciuto rischio di effetti collaterali anticolinergici e antiadrenergici
C comportano un accresciuto rischio di cardiotoxicità
D hanno un effetto sedativo più intenso
E tutte le risposte sono esatte
144. La clozapina:
A è un potente antagonista sul recettore dopaminergico D4
B è indicata in pazienti con discinesia tardiva
C nell'1-2% dei casi trattati può determinare agranulocitosi
D è un farmaco antipsicotico atipico
E* tutte le risposte sono esatte
145. Il test di Wechsler-Bellevue:
A serve a misurare il livello di serotonina nel sangue
B serve a misurare rapidamente il tasso ematico di alcool
C è un test proiettivo
D* è un test psicometrico
E è un test psicodinamico
146. Quale di questi farmaci viene utilizzato come stabilizzante del tono dell'umore:
A acido valproico
B litio
C carbamazepina
D lamotrigina
E* tutte le risposte sono corrette
147. Quale delle seguenti non è un'attività delle benzodiazepine?
A anticonvulsivante
B ipnoinducente
C ansiolitica
D miorilassante
E* antidepressiva
148. Il naloxone è il trattamento elettivo dell'intossicazione acuta da:
A alcol
B* eroina
C amfetamine
D fenilciclidina
E cocaina
149. Chi può ricorrere contro l'ordinanza di Trattamento Sanitario Obbligatorio?
A il solo paziente
B* chiunque
C i familiari del paziente
D il paziente e i familiari
E un avvocato nominato dal paziente
150. I sintomi da sospensione brusca da benzodiazepine sono più frequenti e evidenti con le:
A BDZ a emivita lunga
B BDZ pronordiazepam-simili
C BDZ oxazepam-simili
D* BDZ a emivita breve
E BDZ ansiolitiche
151. Nel delirium:
A le allucinazioni uditive sono più frequenti di quelle visive
B* vi sono fluttuazioni nell'orientamento temporo-spaziale
C la memoria di fissazione rimane intatta
D l'EEG è solitamente normale
E i sintomi migliorano di notte
152. Il primo disturbo mentale per il quale fu dimostrata una base organica fu la:
A malattia di Alzheimer
B sindrome di Kleine Lewin
C* paralisi progressiva
D Demenza di Levy
E malattia di Pick
153. La "confabulazione" è un sintomo caratteristico di:
A* la sindrome di Korsakov
B la nevrosi ossessiva
C la sindrome afasica
D il delirio mistico
E lo stato maniacale
154. La fuga delle idee consiste in:
A idee prevalenti che eliminano tutte le altre
B uno stato crepuscolare della coscienza
C* contenuti ideativi che si succedono con molta celerità
D uno stato di depersonalizzazione
E un atto compulsivo con significato di controllo
155. Gli effetti collaterali anticolinergici centrali dei farmaci antipsicotici:
A sono molto rari nell'anziano
B* sono particolarmente dannosi nell'anziano con demenza
C sono ugualmente dannosi a tutte le età
D sono particolarmente dannosi nelle donne
E nessuna risposta è corretta
156. Una persona affetta da schizofrenia che commette un reato viene:
A* dichiarata non imputabile se incapace di intendere o di volere al momento del fatto
B dichiarata non imputabile solo se interdetta
C dichiarata imputabile se in stato di ebbrezza alcolica
D dichiarata non imputabile se priva di terapia al momento del fatto
E dichiarata sempre e comunque imputabile
157. Riguardo la prognosi della schizofrenia:
A è paragonabile a quella delle gravi forme di disturbo ossessivo compulsivo
B è paragonabile a quella di qualunque altro disturbo psicotico
C è migliore di quella del disturbo psicotico breve
D è migliore di quella del disturbo da attacchi di panico
E* è peggiore di quella dei disturbi dell'umore
158. Come è l'amenorrea nell'anoressia mentale femminile?
A sempre assente
B* di regola secondaria e conseguente al dimagrimento
C più spesso primaria che secondaria
D secondaria ma precedente al dimagrimento
E una conseguenza diretta del vomito autoindotto
159. La proiezione è un meccanismo di difesa a cui ricorrono con particolare frequenza i pazienti sofferenti di:
A isteria di conversione
B isteria d'angoscia
C oligofrenia
D neurastenia
E* paranoia
160. Qual è la principale indicazione per l'impiego dei sali di litio:
A* disturbo bipolare
B nevrasenia
C intossicazione da antipsicotici
D schizofrenia
E depressione endogena
161. Il disturbo delirante di tipo somatico si può articolare in tematiche di vario tipo fra le quali:

- A* tutte le seguenti
 B la convinzione di avere la pelle infestata da parassiti o un parassita interno
 C la convinzione di avere parti del corpo deformati
 D la convinzione di avere organi non funzionanti
 E la convinzione di emanare odore cattivo da qualche parte del corpo
162. Tra i disturbi endocrini prodotti dai sali di litio compaiono:
 A aumento dell'attività sessuale
 B aumento del glicogeno epatico
 C* aumento della produzione ipofisaria di T.S.H.
 D aumento della produzione di testosterone
 E amenorrea-galattorrea
163. L'esordio dell'anoressia nervosa:
 A è più frequente nella terza età
 B è indipendente dall'età
 C* è più frequente nell'adolescenza
 D è più frequente nel sesso femminile nella quarta decade di età
 E è preponderante nel sesso maschile
164. Il delirium tremens è:
 A una psicosi endogena
 B* una sindrome di origine tossica
 C una forma di schizofrenia
 D una reazione allo stress
 E una sindrome melanconica
165. Il disturbo delirante paranoide:
 A compare in genere in età giovanile
 B compare in genere entro i 3 anni di età
 C compare solo in seguito a trauma cranico
 D è causato da un'infezione virale
 E* compare in genere in età media o avanzata
166. Le benzodiazepine:
 A si legano al recettore specifico del GABA
 B agiscono solo sul sistema extrapiramidale
 C* hanno recettori specifici nel sistema nervoso centrale
 D non hanno recettori specifici nel sistema nervoso centrale
 E agiscono solo sul sistema nervoso periferico
167. Gli ansiolitici:
 A danno effetti extrapiramidali
 B* a dosi elevate producono atassia e disartria
 C non abbassano la soglia convulsiva
 D provocano ulcera gastrica
 E provocano frequentemente febbre
168. Il termine melancolia deriva da:
 A dal nome di una località dell'Anatolia
 B* dal greco antico ("bile nera")
 C dal nome di un famoso santuario dedicato al dio Esculapio
 D dal latino ("tristezza")
 E dall'antico ebraico ("disperazione")
169. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio in regime extraospedaliero:
 A riguarda tutti i casi di trattamento obbligatorio, anche nel caso di malattie non di interesse psichiatrico
 B viene considerato un atto sanitario, non un provvedimento di ordine pubblico
 C non ha una durata definita, ma può essere prorogato secondo necessità
 D viene disposto dal Sindaco su proposta motivata di un medico
 E* tutte le risposte sono corrette
170. La depressione nell'anziano:
 A raramente è complicata dal suicidio
 B raramente si manifesta con sintomi somatici
 C* spesso è complicata dal suicidio
 D raramente si associa a patologie fisiche
 E è un evento molto raro
171. Si intende per suicidio mancato quello:
 A non effettuato per non eccessiva gravità di uno stato depressivo
 B effettuato a scopo dimostrativo
 C non attuato nonostante la presenza dell'intenzione
 D* adeguatamente effettuato ma non riuscito per motivi casuali
 E condotto a termine secondo modalità volutamente non adeguate
172. Maxwell Jones introdusse il concetto di:
 A psicodramma
 B terapia di gruppo
 C psicoterapia
 D* comunità terapeutica
 E riabilitazione psichiatrica
173. Un paziente in terapia con disulfiram deve assolutamente evitare:
 A di bere bevande contenenti caffeina
 B* di assumere alcol, anche in quantità minime
 C di assumere la terapia durante i pasti
 D di assumere cibi con elevata quantità di carboidrati
 E di assumere cibi a base di cioccolato
174. Che cosa è il D.S.M.?
 A* L'acronimo di Dipartimento di Salute Mentale
 B Un farmaco antidepressivo
 C Il Dipartimento di Sanità Militare
 D Un farmaco antipsicotico
 E Un metodo di indagine cerebrale
175. L'ansia e la paura:
 A sono la stessa cosa
 B sono diverse perché la paura è tipica dell'uomo giovane mentre l'ansia è tipica dell'uomo anziano
 C sono la stessa cosa perché entrambe compaiono in occasione di aumento della temperatura corporea
 D* differiscono perché la paura è una reazione normale ad un pericolo obiettivo ed attuale mentre l'ansia è l'attesa di un pericolo non definibile
 E sono sintomi tipici della sindrome di Korsakov
176. L'idea di essere segretamente amati da un personaggio famoso riflette:
 A un delirio di grandezza
 B un'ideazione isterica
 C un disturbo narcisistico
 D* un delirio erotomanico
 E una parafilia
177. Cos'è la coprolalia?
 A la soddisfazione sessuale ottenuta con la manipolazione di feci
 B il timore ossessivo di non riuscire a controllare gli sfinteri
 C* l'emissione compulsiva di parole oscene
 D la compulsione a conservare le proprie feci
 E il timore ossessivo di dire oscenità
178. La teoria del "doppio legame" è dovuta a:
 A Ronald Laing
 B Pierre Janet
 C* Gregory Bateson
 D Adolf Meyer
 E Sigmund Freud
179. Con delirio di persecuzione si intende la convinzione di:
 A* essere oggetto di oscure trame, complotti, angherie
 B essere figli di una persona molto importante
 C avere qualche difetto o malattia fisica
 D possedere esagerato valore e conoscenze
 E nessuna delle risposte precedenti è corretta
180. Se un soggetto avverte come estraneo il suo Io psichico, si tratta di:
 A depersonalizzazione somatopsichica
 B depersonalizzazione allopsichica
 C* depersonalizzazione autopsichica
 D derealizzazione
 E dissociazione psicotica
181. I livelli plasmatici del litio consigliabili per l'uso profilattico della sindrome affettiva bipolare nell'anziano sono compresi tra:
 A* 0.4-0.6 mEq/l
 B 1.5-1.7 mEq/l
 C 1.8-2.0 mEq/l
 D 2.1-2.3 mEq/l
 E 2.4-2.6 mEq/l
182. La verbigerazione è:
 A un tic
 B* una ripetizione senza senso e stereotipata di parole e frasi
 C un'alterazione dello stato di coscienza

- D la tendenza a parlare eccessivamente
E un sintomo della balbuzie
183. La convinzione che un'altra persona possa leggere il proprio pensiero è definita come:
A fobia
B ossessione
C depersonalizzazione
D* delirio
E amnesia
184. Secondo l'attuale legislazione, l'ordinanza di TSO disposta dal sindaco deve essere ratificata dal:
A prefetto
B magistrato di sorveglianza
C questore
D difensore civico
E* giudice tutelare
185. L'accertamento sanitario obbligatorio previsto dalla legge 833:
A* è uno strumento legislativo che permette di entrare in contatto con un paziente probabilmente affetto da patologia mentale e che rifiuta ogni contatto o non è reperibile
B l'ordinanza dell'accertamento sanitario obbligatorio è emessa dal direttore generale della AUSL
C è una misura obbligatoria della alcolemia per i guidatori
D è eguale al trattamento sanitario obbligatorio
E deve essere effettuato entro 3 settimane
186. Una risposta psichica patologica il cui contenuto sta in rapporto comprensibile con l'avvenimento scatenante è riferibile al concetto di:
A* reazione
B processo
C sviluppo
D endogeno
E paradosso
187. I seguenti sono tutti sintomi da sospensione brusca da benzodiazepine, tranne:
A intolleranza alle luci intense
B* osteoporosi
C ansia
D depressione
E tremori
188. Oltre che nella depressione, numerosi antidepressivi si sono dimostrati utili nel trattamento di tutte le seguenti condizioni eccetto:
A disturbo di panico
B disturbo ossessivo-compulsivo
C* bradiaritmie
D enuresi infantile
E emicrania
189. Quali dei seguenti sintomi è incompatibile con il disturbo distimico?
A* deliri
B cambiamento di peso
C difficoltà di sonno
D diminuita performance sessuale
E idee suicidarie
190. Cosa sono le idee di riferimento?
A convinzione che le proprie sensazioni possano riferirsi agli altri
B* sensazione che coincidenze ed eventi esterni casuali abbiano un significato particolare ed insolito, specifico per la persona che la prova
C percezione o interpretazione erronea di uno stimolo esterno reale
D convinzione che le proprie idee possano essere trasferite agli altri con mezzi fisici (computer, microspie, ecc.)
E idee percepite come estranee all'Io che sembrano inserite dall'esterno
191. La concordanza tra gemelli monozigoti è più elevata:
A* nel disturbo bipolare
B nel disturbo ossessivo-compulsivo
C nel disturbo delirante
D nella depressione maggiore
E nel disturbo di panico
192. Gli impulsi pantoclastici sono:
A impulsi masturbatori
B reazioni ansiose con tendenza all'evitamento
C* impulsi aggressivi volti alla distruzione di tutti gli oggetti circostanti
D impulsi di tipo ossessivo contraddittorio
E impulsi a sfondo mistico tesi alla comunione con le divinità
193. La definizione più corretta di tic è:
A* un movimento involontario e ricorrente non ritmico
B un movimento coreiforme
C un movimento volontario
D un movimento mioclonico
E un movimento distonico
194. Il picco d'insorgenza della schizofrenia:
A è tra 50 e 60 anni nelle donne
B è più precoce nelle donne
C* è tra 15 e 25 anni negli uomini
D è uguale negli uomini e nelle donne
E nessuna delle risposte è corretta
195. Gli aspetti clinici comuni nei disturbi del comportamento alimentare in età adolescenziale, sono:
A* la abnorme preoccupazione per l'alimentazione e quella per la forma del corpo
B la depersonalizzazione somatopsichica
C la patomimia
D le allucinazioni uditive
E le allucinazioni cenestesiche
196. Una prognosi favorevole nel paziente schizofrenico è predetta da:
A maggiore prevalenza di sintomi negativi
B* maggiore prevalenza di sintomi positivi
C esordio precoce
D assenza di fattori precipitanti
E nessuna delle risposte risulta esatta
197. Sintomi depressivi in corso di schizofrenia:
A* possono essere presenti sia durante la fase acuta che esserne le sequele
B sono sempre assenti
C sono sempre assenti durante la fase acuta di un disturbo psicotico
D sono presenti solo durante la fase acuta di un disturbo psicotico
E nessuna delle precedenti risposte risulta esatta
198. Il dato prognostico quod validudinem principale che differenzia la schizofrenia dai disturbi dell'umore è:
A non esistono differenze sostanziali
B esistono solo differenze prognostiche quod validudinem
C dipende sostanzialmente dal sottotipo di schizofrenia
D* il mancato ritorno al livello di funzionamento precedente dopo ogni ricaduta
E nessuna delle precedenti risposte risulta esatta
199. I disturbi del sonno nell'anziano sono:
A meno spesso correlati al respiro ed a disturbi del movimento indotti da farmaci rispetto a soggetti più giovani
B sempre assenti
C caratterizzati da panico notturno
D* più spesso correlati al respiro ed a disturbi del movimento indotti da farmaci rispetto a soggetti più giovani
E poco frequenti
200. Le "tecniche avversative" fanno parte del bagaglio terapeutico:
A della psicoanalisi
B della terapia cognitiva
C delle terapie psicoanalitiche di gruppo
D della terapia razionale-emozionale
E* della terapia del comportamento
201. L'astinenza alcolica:
A* può comportare insonnia
B non comporta mai insonnia
C è più frequente nei pazienti schizofrenici
D è legata al contemporaneo abuso di oppiacei
E si cura con neurolettici depot
202. Una nevrosi iatrogenica è:
A una nevrosi del medico
B* una nevrosi provocata dall'intervento del medico
C una nevrosi che richiede l'intervento del medico
D una nevrosi che non richiede l'intervento del medico

- E una nevrosi che rappresenta per il medico una esperienza formativa del suo carattere
203. Cos'è l'autoscopia?
 A vedere la propria figura modificata nelle sue proporzioni
 B vedere attraverso gli altri come se fossero trasparenti
 C fenomeno caratterizzato da una permanenza degli stimoli visivi che lasciano una specie di "eco" percettivo
 D la mancata percezione di alcuni stimoli visivi di particolare pregnanza affettiva
 E* vedere allucinatoriamente la propria figura come se si trattasse di un "doppio"
204. Il trattamento sanitario obbligatorio in regime di degenza necessita:
 A del certificato di un medico che ne attesti la necessità
 B* dei certificati di due medici diversi che ne attestino la necessità
 C di una richiesta del magistrato di sorveglianza
 D di una richiesta del prefetto
 E di una richiesta della polizia
205. La "sindrome delle gambe senza riposo" è:
 A un effetto collaterale dei biofeedback
 B un effetto collaterale delle benzodiazepine
 C una resistenza alla psicoterapia che determina l'interruzione della stessa
 D la definizione Jacksoniana dell'ansia notturna
 E* l'insorgere di mioclonie, parestesie e movimenti involontari degli arti inferiori che determina insonnia
206. I sintomi della mania sono quasi interamente il contrario di quelli della depressione eccetto per:
 A aumentato interesse nella attività sessuale
 B* insonnia
 C tolleranza alla fatica
 D deliri di grandezza
 E spinta a parlare
207. I trials clinici dimostrano che i pazienti schizofrenici che ricevono antipsicotici nel primo anno di malattia:
 A hanno ottime probabilità di non ricadere (>95%)
 B hanno un rischio di ricadute pari rispetto a quelli trattati più tardivamente
 C* hanno un decorso migliore rispetto a quelli trattati più tardivamente
 D nessuna delle risposte è corretta
 E tutte le risposte sono esatte
208. La perpetrazione di un reato in stato di ebbrezza alcolica ha di norma come conseguenza:
 A* un incremento della pena
 B una riduzione della pena
 C l'affermazione di incapacità di intendere e di volere
 D il ricovero in osservazione presso un SPDC
 E il ricovero in osservazione presso un OPG
209. Nell'anziano:
 A* la trasmissione colinergica è ridotta
 B la trasmissione colinergica è aumentata
 C la trasmissione colinergica non si modifica
 D la trasmissione dopaminergica è aumentata
 E non si verifica alcun cambiamento rispetto ai soggetti giovani
210. Il decorso tipico del disturbo bipolare è caratterizzato da:
 A alternanza di fasi depressive con stati di tipo schizofrenico
 B alternanza di fasi di depressione con fasi di catatonìa
 C alternanza di fasi di eccitamento con stati di tipo schizofrenico, con periodi di remissione
 D* alternanza di fasi di eccitamento e di depressione
 E una condizione di depressione delirante cronica ed irreversibile
211. Quali tra le sottoelencate è stata presa in considerazione come ipotetica causa della patologia schizofrenica?
 A episodi ischemici ripetuti
 B degenerazione gliotica di sottotipi neuronali
 C degenerazione assonale con formazione di placche neurofibrillari
 D* alterazione del neurosviluppo
 E lesione traumatica di peculiari nuclei cerebrali cortico-sottocorticali
212. Quale delle seguenti non è una causa di delirium?:
 A encefalopatia epatica
 B disfunzioni endocrine
 C traumi cranici
 D* eccitamento maniacale
 E stati infettivi sistemici
213. E' tipico della psicosi alcolica:
 A il delirio di Cotard
 B le tematiche ipocondriache
 C il fenomeno della conversione isterica
 D la fuga delle idee
 E* il delirio di gelosia
214. Un infermo di mente perde la capacità di gestire i suoi beni:
 A se ha superato i 70 anni di età
 B se dichiarato invalido civile al 100%
 C se inabilitato
 D* solo se interdetto
 E se pensionato a causa della sua infermità
215. Le allucinazioni ipnagogiche:
 A sono tipiche della sindrome di Ganser
 B si verificano durante intossicazioni da tabacco
 C sono un sintomo infrequente della schizofrenia
 D* si verificano nel trapasso dalla veglia al sonno
 E sono sempre espressione di una grave malattia mentale
216. Il pensiero dissociato è tipico:
 A del disturbo borderline di personalità
 B dell'episodio maniacale
 C della fobia sociale
 D del disturbo di panico
 E* della schizofrenia
217. La sindrome xenopatica è:
 A un insieme di disturbi emotivi tipici dell'immigrato recente
 B una perversione sessuale
 C un rifiuto patologico del diverso
 D un complesso quadro caratterizzato da senso di estraniamento dall'ambiente, delirio di immortalità, sensazione di avere delle persone sconosciute nell'addome
 E* un disturbo della coscienza dell'io nel quale la soggettività non si sente più agente, ma passiva preda di forze esterne
218. Il disturbo ossessivo-compulsivo è caratterizzato da:
 A vivaci preoccupazioni sulla propria salute e convinzione di avere un malattia incurabile
 B* persistenza nella coscienza di idee o paure ritenute assurde ed estranee al paziente che le vive come incoercibili
 C decadimento mentale su base arteriosclerotica con paure di danneggiamento e furto
 D preoccupazioni attuali che assillano il paziente e lo rendono ansioso
 E paura persecutoria di veneficio e torture
219. A quale categoria di farmaci appartiene la mirtazapina?
 A antimastinico
 B anoressizzante
 C neurolettico
 D* antidepressivo
 E antibiotico
220. Quale di queste indagini, anche se non specifica, può essere utile nella diagnostica delle sindromi depressive?
 A* test di soppressione al desametasone
 B prove di funzionalità renale
 C bilirubinemia
 D TA
 E T3, T4
221. Le psicosi puerperali:
 A hanno alta tendenza a trasformarsi in un quadro schizofrenico
 B* si manifestano in gravidanza o durante il puerperio
 C non comprendono mai sintomi affettivi
 D spesso esitano in gravi forme difettuali
 E sono quasi sempre dovute a shock tossico
222. Nella demenza vascolare:
 A* tutte le seguenti
 B si ha deterioramento delle funzioni intellettive a causa di microinfarti multipli
 C c'è anamnesi di ictus

- D ci sono sintomi e segni neurologici focali
E c'è deterioramento a scalini
223. Quali sono le allucinazioni più frequenti nel delirium tremens:
A ipnagogiche
B autoscopiche
C ipnopompiche
D* microzooptiche
E tutte le precedenti
224. Quale è il principale catabolita della dopamina?
A la melanina
B la tirosina
C* l'acido omovanillico
D l'acido fenilpiruvico
E l'acido idrossi-indolacetico
225. L'alogia:
A è un sintomo sia negativo che positivo della schizofrenia
B* è un sintomo negativo della schizofrenia
C non è un sintomo negativo della schizofrenia
D non è un sintomo della schizofrenia
E nessuna delle risposte è corretta
226. Nel delirium:
A* si ha alterazione della coscienza e modificazione cognitiva
B non c'è mai bisogno di terapia perché il quadro regredisce spontaneamente in poche ore
C il paziente è vigile e collaborante
D l'attenzione è normale
E il tracciato EEG è sempre normale
227. Il delirio di rovina è più frequente:
A nel disturbo schizo-affettivo
B nel disturbo delirante
C* nella depressione psicotica
D nella schizofrenia paranoidea
E nella schizofrenia ebefrenica
228. Segnare l'affermazione corretta:
A la depressione non è mai presente nella malattia di Alzheimer
B* la depressione è spesso presente nella malattia di Alzheimer
C la depressione non deve mai essere valutata nella malattia di Alzheimer
D tutte le risposte sono corrette
E tutte le risposte sono errate
229. Negli adulti, la stima della prevalenza del disturbo depressivo maggiore, durante l'intero arco di vita, è:
A 0-9%
B* 10-19%
C 20-29%
D 30-39%
E 40-49%
230. In quale funzione cognitiva superiore è fortemente coinvolto il sistema limbico?
A pensiero simbolico
B calcolo aritmetico
C* controllo delle emozioni
D memoria operativa
E risposte di ipervigilanza
231. La ripetizione automatica di parole dette da un altro è:
A un fenomeno di suggestionamento
B un disturbo del contenuto del pensiero
C un plagio
D* un'ecolalia
E un segno di insicurezza che rientra nel disturbo d'ansia generalizzato
232. La legge 833 vieta:
A servizi territoriali di psichiatria
B reparti psichiatrici in ospedale generale
C* i manicomi
D accertamenti sanitari obbligatori per malattia mentale
E trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale
233. Il delirium:
A non è mai dovuto a condizione medica generale
B non è mai accompagnato da sintomi neurovegetativi
C non comprende mai alterazioni dello stato di coscienza
D* può condurre all'exitus
E ha sempre decorso cronico
234. Nei deliri di colpa, la falsa convinzione riguarda:
A colpe degli altri nei confronti del paziente
B* colpe del paziente
C presunta immunità del paziente al giudizio morale
D colpe delle autorità politiche
E colpe delle autorità religiose
235. La dipendenza da alcol è caratterizzata da tutte le seguenti eccetto:
A* assenza di sintomi da sospensione
B tolleranza all'alcol
C tentativi infruttuosi di ridurre o controllare l'uso di alcol
D astinenza
E craving verso l'alcol
236. I disturbi psichiatrici che possono insorgere nei pazienti affetti da sclerosi multipla:
A* possono essere dovuti alla terapia steroidea
B appartengono per lo più allo spettro schizofrenico
C determinano sempre un deterioramento cognitivo precoce
D sono infrequenti
E sono caratterizzati per lo più da un delirium progressivo
237. Che cos'è la down regulation?
A il passaggio dalla fase maniacale a quella depressiva nel disturbo bipolare
B la fase di svalutazione del sé nel paziente borderline
C* una diminuzione della sensibilità e della densità dei recettori sinaptici per l'aumento della concentrazione del neurotrasmettitore nello spazio intersinaptico
D uno stato di riduzione del livello di coscienza associato a deficit cognitivi
E il processo di sensibilizzazione progressiva neuronale che determina alterazioni del comportamento
238. La depersonalizzazione:
A è la sensazione, accompagnata da euforia, di essere tutt'uno con il mondo circostante, che si ottiene in certi stati "mistici"
B* è un disturbo della coscienza caratterizzato da riduzione della capacità di riconoscere come proprie le esperienze soggettive, che può comparire in diverse sindromi, sia nevrotiche che psicotiche
C è un disturbo patognomonico delle psicosi
D è la sensazione di benessere che compare nella fase di guarigione di un delirio
E è una sensazione di mancanza di identità personale dovuta ad una lesione neurologica
239. Nell'anziano l'insonnia è:
A meno frequente che in qualsiasi altro gruppo di età
B altrettanto frequente che in qualsiasi altro gruppo di età
C più frequente che nei giovani ma solo nel sesso maschile
D* più frequente che in qualsiasi altro gruppo di età
E un evento raro
240. Korsakov dette il nome a:
A un disturbo particolare del pensiero
B un disturbo particolare della condotta
C* un disturbo particolare della memoria
D un disturbo particolare della sessualità
E un disturbo particolare della affettività
241. Quale dei seguenti neurotrasmettitori sembra essere maggiormente coinvolto nel meccanismo di azione dei farmaci anti-ossessivi?
A* serotonina
B dopamina
C norepinefrina
D acetilcolina
E istamina
242. Nella Corea di Huntington:
A le capacità cognitive sono mantenute
B è trasmessa con modalità diagenica
C* vi è elevato rischio di depressione e ideazione suicidaria
D si ha un ipertono colinergico centrale
E è presente un'anomalia genetica dovuta a un gene recessivo

243. Di che cosa è caratteristico il fenomeno della coazione?
- A dei TSO
 B* della nevrosi ossessiva
 C delle reazioni depressive
 D del pensiero schizofrenico
 E del normale funzionamento della mente
244. La maggiore causa di giornate di lavoro perse in un anno è fra quelle indicate:
- A le vasculopatie cerebrali
 B le malattie reumatiche
 C l'ipertensione
 D la schizofrenia
 E* la depressione
245. Il delirio di furto del pensiero è caratterizzato da:
- A convinzione di poter sottrarre i pensieri altrui
 B sensazione di riuscire a leggere i pensieri delle persone vicine
 C* sensazione soggettiva che una forza esterna sottragga i propri pensieri
 D convinzione di poter influenzare gli altri tramite il pensiero
 E convinzione che gli altri possano leggere i propri pensieri
246. Sono fattori di rischio per la malattia di Alzheimer:
- A l'età anziana
 B la storia familiare
 C il genotipo Apo E
 D la sindrome di Down
 E* tutte le risposte sono corrette
247. Non è un sintomo negativo della schizofrenia:
- A ritiro sociale
 B* delirio
 C avolizione
 D alogia
 E nessuna delle precedenti
248. Quale dei seguenti deliri può essere considerato il grado estremo della depersonalizzazione somatopsichica?
- A* nichilistico
 B di gelosia
 C mistico
 D di controllo
 E genealogico
249. I tests proiettivi o della personalita' sono:
- A reattivi che consentono di predire la risposta a terapie farmacologiche
 B atteggiamenti particolari che lo psichiatra assume per evocare risposte emotive
 C* reattivi che forniscono informazioni sulla struttura del carattere
 D la lista delle associazioni verbali di Jung
 E un momento particolare della terapia analitica
250. La logorrea generalmente caratterizza:
- A* l'eccitamento maniaco
 B la fobia semplice
 C il disturbo di panico
 D il disturbo somatoforme
 E l'anoressia
251. Quali sono i fattori predittivi dei disturbi psichiatrici del post-partum?
- A le gravidanze precoci
 B precedenti periodi di amenorrea
 C* familiarità o anamnesi positiva per disturbi dell'umore o d'ansia, precedenti episodi di disturbi post-partum
 D l'età avanzata della madre
 E i parti gemellari
252. Una storia di traumi, abusi e violenze nell'infanzia è comune nel:
- A disturbo di panico
 B* disturbo borderline di personalità
 C disturbo bipolare dell'umore
 D disturbo da conversione
 E nessuno di quelli indicati
253. Il delirio erotomanico:
- A* è un tipo di disturbo delirante cronico
 B è una perversione
 C è più comune nel sesso maschile
 D è più frequente nelle popolazioni immigrate
 E è caratteristico degli anziani
254. Il concetto di "emotività espressa" fu introdotto da:
- A Basaglia
 B* Leff e Vaughn
 C Shepherd
 D Andreasen
 E Post
255. L'apparente freddezza di esecuzione è maggiormente tipica del suicidio:
- A del demente arterosclerotico
 B* dello schizofrenico
 C dell'isterico
 D del depresso nevrotico
 E del confuso
256. Secondo i sistemi nosografici in corso, per porre diagnosi di schizofrenia i sintomi debbono perdurare da almeno:
- A 6 settimane
 B* 6 mesi
 C 1 anno
 D 2 mesi
 E 5 anni
257. Quale tra i seguenti è un farmaco antipsicotico di nuova generazione:
- A tioridazina
 B perfenazina
 C aloperidolo
 D flufenazina
 E* olanzapina
258. Il più frequente disturbo dell'umore è:
- A disturbo dell'adattamento con umore depresso
 B distimia
 C disturbo dell'umore dovuto ad altre condizioni mediche
 D disturbo bipolare
 E* depressione unipolare
259. Che cosa è l'ansia libera fluttuante?
- A un'ansia priva di coazioni
 B un'ansia che cambia continuamente oggetto
 C un'ansia con oscillazioni dell'intensità
 D* un'ansia senza motivi specifici né strutturazione fobica
 E un'ansia con deliri
260. L'abuso cronico di alcol può portare alla:
- A parafrenia
 B epilessia
 C schizofrenia
 D nevrosi d'ansia
 E* demenza
261. La depressione involutiva è:
- A uno stato depressivo in via di remissione
 B uno stato depressivo dell'anziano sempre secondario a marcata arteriosclerosi
 C uno stato depressivo con marcata componente autistica
 D* uno stato depressivo del soggetto anziano con solo lieve compromissione organica
 E una patologia depressiva ad esordio precoce
262. Rispetto agli psicofarmaci gli anziani sono:
- A più vulnerabili agli effetti anticolinergici periferici ma non centrali
 B* più vulnerabili agli effetti anticolinergici sia centrali che periferici
 C più vulnerabili agli effetti anticolinergici centrali ma non periferici
 D meno sensibili agli effetti ipotensivi
 E meno vulnerabili agli effetti extrapiramidali
263. Durante la fase REM del sonno:
- A il soggetto è ipertonico
 B* il soggetto è ipototonico
 C nei bambini si osserva sempre enuresi
 D il soggetto si risveglia con facilità
 E le onde cerebrali sono sincronizzate
264. Durante l'adolescenza, il suicidio è più frequente:

- A* nel sesso maschile
 B nel sesso femminile
 C ugualmente in entrambi i sessi
 D in comorbosità con l'epilessia
 E in corso di disturbo ossessivo-compulsivo
265. Pick fu lo scopritore di:
 A una forma di epilessia
 B una forma di ritardo mentale
 C* una forma di demenza
 D una forma di depressione
 E una forma di schizofrenia
266. Quale delle seguenti malattie si può presentare più frequentemente con sintomi depressivi?
 A rene policistico
 B m. di Raynaud
 C m. di Recklinghausen
 D steatosi epatica
 E* m. di Parkinson
267. Quale di questi farmaci può essere causa di depressioni anche gravi?
 A tiroxina
 B* reserpina
 C fenelzina
 D menaprina
 E amineptina
268. Il paziente ricoverato in TSO:
 A* conserva tutti i suoi diritti di cittadino
 B conserva tutti i suoi diritti di cittadino tranne la capacità di fare testamento
 C conserva tutti i suoi diritti di cittadino tranne il voto
 D viene iscritto nel casellario giudiziario
 E la dimissione deve essere decisa dal Giudice
269. Generalmente, la durata complessiva del sonno:
 A diminuisce dalla nascita al terzo anno di età e poi rimane invariata
 B diminuisce dalla nascita al primo anno di età e poi rimane invariata
 C diminuisce dalla nascita al decimo anno di età e poi rimane invariata
 D rimane invariata in tutte le età
 E* diminuisce con l'avanzare dell'età
270. L'amnesia transitoria globale
 A comporta la perdita del senso di identità
 B è un fenomeno dissociativo
 C* comporta deficit mnestici globali
 D è spesso accompagnata da confabulazione
 E è caratterizzata da un normale span mnestico
271. Il rischio di suicidio "allargato" (omicidio+suicidio) è maggiore nei casi di:
 A demenza
 B distimia
 C schizofrenia
 D* depressione maggiore psicotica
 E disturbo borderline di personalità
272. Il Typus Melancholicus è stato originariamente descritto da:
 A Griesinger
 B Kraepelin
 C Galton
 D* Tellenbach
 E Janet
273. Quale/i dei seguenti farmaci determina/no un incremento del rischio depressivo?
 A antiaritmici di classe I
 B* alfa interferone
 C antistaminici
 D antiasmatici
 E nessuno dei farmaci indicati
274. Quale delle seguenti situazioni presenta il maggiore rischio di suicidio?
 A depressione ricorrente
 B disturbo bipolare
 C precedenti di uso di sostanze
 D* precedenti di suicidio
 E schizofrenia
275. Secondo il DSM-IVR, il tipo residuo di schizofrenia nell'anziano è caratterizzato da:
 A basso grado di deterioramento cognitivo
 B* ottundimento emozionale, ritiro dalla vita sociale, comportamento eccentrico e pensiero illogico
 C importanti deliri e allucinazioni
 D allucinazioni visive
 E autonomia e capacità di provvedere ai propri bisogni ben conservate
276. Il transfert viene interpretato:
 A* nelle terapie psicoanalitiche
 B nelle terapie cognitive
 C nelle terapie supportive
 D nelle terapie sistemiche
 E nelle terapie umanistiche
277. La perdita del coordinamento del movimento muscolare volontario viene definita:
 A aprassia
 B distonia
 C* atassia
 D catalessia
 E acinesia
278. Delle sottoelencate sostanze chimiche tutte sono considerate neurotrasmettitori, eccetto:
 A serotonina
 B dopamina
 C gaba
 D noradrenalina
 E* acido 5-idrossi-indolacetico
279. Quale è il significato della masturbazione adulta?
 A entro certi limiti, può essere un accettabile sostitutivo (surrogato) del coito
 B* è un aspetto della fisiologica funzione sessuale adulta
 C è un sintomo di gravi problemi psicologici
 D è un segno indicativo di un processo psicotico in atto
 E si trova frequentemente nelle psicosi cronicizzate
280. Quale di queste capacità è generalmente conservata nella sindrome dell'X fragile?
 A la capacità di fissare l'interlocutore negli occhi
 B la capacità spaziale
 C la capacità di parlare correttamente
 D* la capacità di comprensione del linguaggio
 E la capacità di controllare i propri impulsi
281. Un soggetto che assume per la prima volta una cps da 5 mg. di diazepam:
 A ha una improvvisa sordità
 B* può avere un effetto sedativo molto forte e prolungato
 C lamenta artralgie
 D ha un'improvvisa e importante elevazione della pressione arteriosa
 E manifesta un delirio persecutorio lucido e ben strutturato
282. Quale delle seguenti funzioni endocrine è maggiormente compromessa dal trattamento con litio:
 A surrenalica
 B paratiroidea
 C ipotalamica
 D gonadica
 E* tiroidea
283. Il delirio di querela e' tipico:
 A dell'eccitamento maniacale
 B* della paranoia
 C della depressione endogena
 D della schizofrenia simplex
 E della nevrosi post-traumatica
284. Il trattamento dell'anoressia nervosa adolescenziale è più efficace:
 A quando sono esclusi i familiari
 B quando si attua solo una monoterapia con neurolettici atipici
 C* quando sono coinvolti i familiari
 D quando si attua solo una monoterapia con antidepressivi SSRI
 E quando si attua solo la alimentazione forzata
285. Il sonno REM nella depressione solitamente è:
 A aumentato

- B invariato
 C* diminuito
 D interrotto
 E più prolungato
286. I farmaci antipsicotici classici, rispetto agli antipsicotici "atipici":
 A sono stati completamente soppiantati dall'uso degli atipici
 B sono comunque più efficaci
 C hanno un rischio equivalente di discinesia tardiva
 D sono più indicati nei pazienti giovani
 E* hanno un rischio più elevato di effetti collaterali di tipo extrapiramidale
287. Le psicosi organiche:
 A sono sinonimo di psicosi endogene
 B non sono mai dovute a condizione medica generale
 C* possono essere dovute a prioni / virus / batteri / miceti / protozoi
 D non sono mai dovute a sospensione / assunzione di sostanze
 E non sono mai dovuti a endocrinopatie
288. Sono tipici del comportamento dei soggetti con bulimia nervosa:
 A pratiche masturbatorie
 B comportamenti sessuali a rischio
 C viaggiare di continuo
 D evitare di viaggiare in aereo
 E* abbuffate di cibo
289. La distonia è:
 A la mancanza di sintonia con gli altri
 B* un disturbo della tonicità dei muscoli
 C l'incapacità a discriminare i toni acuti e gravi
 D l'incapacità a rispondere a tono
 E la periodica contrazione e flaccidità dei gruppi muscolari
290. Il Centro di Salute Mentale:
 A è una struttura dei Consultori Familiari delle AUSL
 B è una struttura ospedaliera del Dipartimento di Salute Mentale delle AUSL
 C è una struttura residenziale dei Dipartimenti di Salute Mentale delle AUSL
 D* è una struttura territoriale del Dipartimento di Salute Mentale delle AUSL
 E è una struttura delle AUSL dedicata alle tossicodipendenze
291. Un clima di "iperemotività espressa" intrafamiliare può determinare:
 A* peggior decorso della schizofrenia
 B miglior decorso della schizofrenia
 C peggior decorso dei disturbi d'ansia
 D miglior decorso dei disturbi d'ansia
 E nessuna risposta è corretta
292. Il disturbo da stress post-traumatico è caratterizzato da tutto quanto segue eccetto:
 A rivivere gli eventi traumatici
 B sintomi ansiosi e depressivi
 C* inserzione di pensiero
 D arousal eccessivo
 E difficoltà di concentrazione
293. Il tipo catatonico di schizofrenia è caratterizzato da:
 A presenza di floridi deliri di grandezza e persecuzione
 B comportamento disinibito e primitivo
 C oscillazioni del tono dell'umore
 D* disturbo delle funzioni motorie con rigidità, negativismo, stupor
 E tutte le risposte risultano vere
294. La desensibilizzazione sistematica è:
 A* una tecnica psicoterapeutica utilizzata nella "terapia del comportamento"
 B l'eliminazione di una risposta condizionata provocata dalla cessazione della somministrazione del rinforzo
 C la progressiva scomparsa della risposta a un determinato stimolo quando esso venga presentato ripetutamente a intervalli ravvicinati
 D uno dei processi che entrano in gioco nell'oblio di materiale verbale strutturato
 E la perdita di reattività di un organismo
295. Quale dei seguenti sintomi NON segnala generalmente un rischio di suicidio?
 A idee di morte
 B inibizione dell'aggressività eterodiretta
 C isolamento
 D* fuga delle idee
 E restringimento del campo del pensiero
296. Per effetto rebound si intende:
 A la ricomparsa della sintomatologia depressiva dopo un prolungato periodo asintomatico
 B la comparsa di un episodio maniacale dopo almeno due episodi di tipo depressivo nel disturbo bipolare
 C la progressiva tolleranza agli effetti di un farmaco, che si presenta soprattutto nei soggetti che tendono ad abusare di sostanze
 D* la ricomparsa della sintomatologia per la quale il farmaco era stato impiegato, quando viene sospeso il trattamento
 E il ritorno a comportamenti disfunzionali, dopo un certo periodo dalla sospensione di un trattamento
297. Di solito in fase acuta il paziente schizofrenico:
 A è depresso
 B accetta le terapie solo se affetto dal sottotipo paranoide
 C presenta disturbi della termoregolazione
 D* presenta sintomi produttivi
 E è perfettamente cosciente del proprio stato di malattia
298. Deliri di trasformazione corporea, di immortalità e delirio nihilistico caratterizzano il quadro clinico di:
 A neurosi fobico-ossessiva
 B delirium tremens
 C schizofrenia paranoide
 D* sindrome di Cotard
 E frenastenia
299. Quale dei seguenti tipi di delirio non è compreso tra quelli descritti dal DSM nell'ambito del disturbo delirante (paranoide)?
 A erotomanico
 B* mistico
 C di grandezza
 D di gelosia
 E di persecuzione
300. Il rischio di sviluppare una dipendenza da benzodiazepine è maggiore:
 A in persone ammalate di neoplasia
 B in persone con epatopatia
 C in persone di razza negra
 D* in soggetti che ne assumono dosaggi molto elevati e per lungo tempo
 E in persone di età avanzata
301. Cos'è la discinesia tardiva indotta da neurolettici?
 A lo sviluppo di un'atassia sensoriale a seguito dell'uso di neurolettici
 B l'insorgenza di retro e lateropulsione in seguito all'uso di neurolettici
 C la presenza di alterazioni EEG specifiche in seguito all'uso di neurolettici
 D la comparsa di eritema diffuso a seguito dell'uso di neurolettici.
 E* la comparsa di movimenti involontari di lingua, mandibola, tronco o arti, a seguito dell'uso protratto di neurolettici.
302. Il termine ipocondria deriva:
 A dal nome dell'antico medico greco ipocondrio
 B dalla mitica regione ipocondria
 C* dall'antica convinzione che ci fosse una migrazione di bile nera dall'ipocondrio al cervello
 D dal greco significa delirio
 E dal fatto che i dolori prevalgono in sede ipocondriale
303. Quale dei seguenti autori descrisse la catatonìa?
 A Charchot
 B Chiarugi
 C* Kalbaum
 D Roth
 E Jung
304. Meccanismo di difesa inconscio si definisce:
 A delirio di riferimento
 B eccessiva aggressività
 C* metodo dell'io per difendersi nel conflitto contro i rappresentanti dell'istinto
 D ipervalutazione dei pericoli del mondo esterno
 E difesa nei conflitti contro le difficoltà del mondo esterno
305. La distinzione di schizofrenia di tipo I e tipo II si deve a:
 A Angst
 B Andreasen
 C* Crow
 D Roth

- E Spitzer
306. Quale dei seguenti sintomi NON è un effetto collaterale delle benzodiazepine?
- A amnesia anterograda
 B* discinesia tardiva
 C atassia
 D sedazione eccessiva
 E confusione mentale
307. Di quale delle seguenti patologie sono caratteristici i deliri di influenzamento?
- A delirium tremens
 B demenza
 C ebefrenia
 D paranoia
 E* schizofrenia
308. Ganser descrisse:
- A una forma di anoressia
 B un tipo particolare di effetto secondario agli antidepressivi
 C* una sindrome che può manifestarsi in detenuti
 D una forma di "perversione" sessuale
 E una forma di simulazione di malattia mentale
309. Sublimazione si definisce:
- A* deviazione delle pulsioni verso mete non sessuali ed oggetti socialmente valorizzati
 B valorizzazione dell'Io ideale
 C ipervalutazione delle figure parentali
 D passaggio della fase orale alla fase anale
 E processo neurochimico tipico della schizofrenia
310. La polifarmacoterapia nell'anziano:
- A riduce gli effetti collaterali dei singoli farmaci
 B riduce il rischio di avventi avversi
 C* aumenta il rischio di mancata adesione al trattamento
 D è priva di controindicazioni
 E è sempre auspicabile
311. Quale delle seguenti sintomatologie allucinatorie è particolarmente frequente nella demenza di tipo Lewy Body?
- A allucinazioni cenestesiche
 B allucinazioni olfattive
 C allucinazioni uditive
 D* allucinazioni visive
 E allucinazioni tattili
312. La "depersonalizzazione allopsichica" consiste in una:
- A* percezione dell'ambiente fisico e sociale come estraneo e irreal
 B perdita di consapevolezza del sé
 C inadeguatezza nel vivere la propria persona
 D sensazione di non possedere più una parte del proprio corpo
 E impossibilità di assumere cibo
313. La definitiva chiusura dei manicomi in Italia fu disposta per la prima volta con la legge:
- A 162 del 1980
 B* 180 del 1978
 C 266 del 1982
 D 118 del 1979
 E 833 del 1978
314. Nell'anziano le benzodiazepine:
- A hanno un'emivita più breve e quindi sono poco efficaci
 B hanno la stessa farmacocinetica che negli altri gruppi di età
 C non sono mai metabolizzate per via epatica
 D sono eliminate immodificate per via renale
 E* hanno un'emivita più lunga e quindi possono accumularsi
315. In quali manifestazioni comportamentali sembra prevalentemente implicata la serotonina?
- A adattamento sociale
 B grado di elaborazione dei vissuti
 C memoria a lungo e breve termine
 D integrazione sensoriale
 E* comportamenti impulsivi e suicidio
316. Quale sostanza a prevalente azione serotoninergica ha una spiccata potenzialità psicotogenica?
- A Paroxetina
 B* LSD
 C Sumatriptan
 D Citalopram
 E Ondasetron
317. L'olanzapina è:
- A un ansiolitico non benzodiazepinico
 B un antipsicotico "tipico"
 C un SSRI
 D un antidepressivo triciclico
 E* un antipsicotico "atipico"
318. Cos'è una percezione delirante?
- A* percezione normale cui viene attribuito un significato delirante
 B alterata percezione cenestesica nel delirio di gelosia
 C alterate percezioni visive in corso di delirium
 D convinzione delirante che le proprie percezioni siano false
 E la coesistenza di dispercezioni e delirio
319. La possibilità di realizzare l'atto sessuale solo con la mediazione di un oggetto, si dice:
- A ninfomania
 B onanismo
 C masochismo
 D* feticismo
 E sadismo
320. Quale delle seguenti è causa del quadro di delirium tremens?
- A litiemia > 1,2 mEq/L
 B intossicazione da oppioidi
 C livelli tossici di antidepressivi triciclici
 D* astinenza da alcol
 E intossicazione da amfetamina
321. Nel sonno REM si verificano:
- A ipertono muscolare e sciallorrea
 B* movimenti oculari rapidi e atonia muscolare
 C risveglio ed euforia
 D paralisi transitorie dei muscoli oculari estrinseci
 E dispnea, acufeni, tetraparesi spastica
322. In caso di vizio parziale di mente, l'autore di reato subisce:
- A* una pena ridotta
 B una pena maggiorata
 C la stessa pena di una persona non malata
 D il ricovero per trattamento sanitario obbligatorio
 E il proscioglimento
323. L'ecoprassia è:
- A l'incapacità di portare a compimento un'azione
 B la capacità di rispecchiamento verso l'altro
 C la capacità di ripetere a comando delle istruzioni
 D* la ripetizione imitativa dei movimenti di un'altra persona
 E l'incapacità di discriminare l'origine di un'eco sonora
324. Nella malattia di Alzheimer, la bassa scolarità:
- A è un fattore protettivo
 B non modifica il rischio
 C* è un fattore di rischio
 D non è mai stata valutata
 E tutte le risposte sono errate
325. La schizofrenia residua non comporta:
- A appiattimento affettivo
 B eccentricità di comportamento
 C* aumento del tono dell'umore
 D allentamento dei nessi associativi
 E ritiro sociale
326. Il Super-Io si definisce come:
- A io molto rigido
 B* istanza della personalità il cui ruolo è assimilabile a quello di censore
 C complesso di inferiorità
 D complesso di colpa

- E complesso di superiorità
327. Una caratteristica fondamentale delle ossessioni è:
 A* l'egodistonicità
 B la bizzarria
 C la periodicità circadiana
 D la remissione spontanea
 E il peggioramento serotino
328. Non è un'indicazione dei farmaci antipsicotici:
 A prevenzione di ricadute in pazienti psicotici, in assenza di sintomatologia acuta
 B episodio maniacale
 C disturbo psicotico breve
 D* disturbo di ansia generalizzato
 E esordio schizofrenico in pazienti giovani
329. La compulsione ossessiva è costituita da:
 A azioni svolte in stato di incoscienza
 B azioni di natura strettamente istintuale
 C tendenza a compiere azioni desiderate ma represses
 D azioni involontarie per focalità epilettiche in regione parietale
 E* tendenza a compiere azioni coscientemente non desiderate
330. Per *barrage* si intende:
 A la sensazione di morte imminente
 B una forma di amnesia lacunare isterica
 C un improvviso arresto del movimento
 D una forma di balbuzie
 E* un'interruzione improvvisa del corso del pensiero
331. Nella valutazione clinica della demenza vascolare è rilevante:
 A* tutte le risposte sono corrette
 B l'esordio acuto
 C la progressione a gradini
 D il decorso fluttuante
 E un pregresso infarto cerebrale
332. Quale dei seguenti sintomi NON è provocato da un'intossicazione acuta con sole benzodiazepine?
 A profonda sonnolenza
 B* convulsioni
 C astenia muscolare
 D atassia
 E ipotensione ortostatica
333. Le crisi parziali semplici:
 A caratterizzano la melanconia endogena
 B* possono accompagnarsi a sensazioni di déjà vu
 C sono caratteristiche dell'epilessia frontale
 D sono tipiche della paranoia
 E si associano ad allucinazioni acustiche
334. Il disturbo bipolare di tipo II si differenzia dal disturbo bipolare di tipo I per:
 A* la presenza di episodi ipomaniacali
 B la presenza di episodi depressivi più lievi
 C la presenza di più episodi maniacali non intervallati da episodi depressivi
 D la presenza di più episodi depressivi non intervallati da episodi maniacali
 E la presenza di episodi maniacali a cicli rapidi
335. Il delirio di indegnità è tipico:
 A della paranoia
 B della depressione nevrotica
 C dell'eccitamento maniacale
 D della schizofrenia simplex
 E* della depressione endogena
336. Cos'è la xenofobia?
 A* la paura degli estranei
 B la paura di situazioni nuove e sconosciute
 C la paura degli animali
 D la paura di sentire un idioma straniero
 E la paura dell'altezza
337. La "conversione" sul piano somatico dei conflitti inconsci è alla base:
 A di alcune conversioni religiose
 B dei sintomi neurastenici
 C delle crisi epilettiche
 D* dei sintomi isterici
 E dei sintomi psicosomatici
338. La presenza di glaucoma e/o di ipertrofia prostatica controindica l'uso:
 A degli antidepressivi NARI
 B delle benzodiazepine ipnogene
 C* degli antidepressivi triciclici
 D dei neurolettici atipici
 E dei sali di Litio
339. Quale reperto si osserva frequentemente alla TC cranio di pazienti schizofrenici?
 A alterazione diffusa della struttura cerebrale
 B masse localizzate nei lobi parietali
 C riduzione di volume dei ventricoli laterali
 D* ingrandimento dei ventricoli laterali e del terzo ventricolo
 E asimmetria tra emisfero destro ed emisfero sinistro
340. Secondo Freud, quale è la differenza fondamentale tra nevrosi e psicosi?
 A nelle nevrosi, a differenza delle psicosi, vi è una fissazione pulsionale su oggetti interni
 B le nevrosi sono curabili mediante la psicoanalisi, mentre le psicosi no
 C* nelle nevrosi vi è un conflitto tra Io ed Es, nelle psicosi vi è un conflitto tra Io e mondo esterno
 D le psicosi intervengono solo in individui con genitori schizofrenogeni
 E nelle psicosi lo sviluppo psicosessuale non è completo, mentre lo è nelle nevrosi
341. I disturbi somatoformi comprendono tutti i seguenti, tranne:
 A ipocondria
 B disturbo da dolore somatoforme
 C disturbo da conversione
 D* disturbo di derealizzazione
 E disturbo da somatizzazione
342. Affermare e negare, amare ed odiare, volere e non volere simultaneamente la stessa cosa, è:
 A dubbio ossessivo
 B* ambivalenza
 C perplessità
 D espressione normale del sentimento
 E dubbio esistenziale
343. Quale lesione neuropatologica è patognomonica della schizofrenia?
 A ridotto volume del mesencefalo
 B ipertrofia dell'amigdala
 C aumentato volume delle regioni ippocampali
 D degenerazione gliotica di neuroni corticali
 E* nessuna
344. Nell'attuale legislazione psichiatrica è previsto che il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale in regime di ricovero avvenga:
 A* quando il malato ha bisogno di cure urgenti, le rifiuta e non esistono strutture extraospedaliere idonee a curarlo
 B quando il malato è violento
 C quando il malato dà pubblico scandalo
 D quando il malato è pericoloso a sé o agli altri
 E quando il malato è affetto da mania di persecuzione
345. In presenza di idee deliranti di grandezza, anomalie pupillari, disartria e tremori, la prima ipotesi diagnostica è di:
 A tumore del lobo frontale
 B* paralisi progressiva
 C delirium tremens
 D malattia di Pick
 E malattia di Alzheimer
346. Nel paziente fobico l'angoscia insorge:
 A* esclusivamente davanti alla specifica situazione fobica concreta
 B esclusivamente quando è costretto da terzi ad affrontare la specifica situazione fobica concreta
 C esclusivamente al pensiero di dover affrontare la specifica situazione fobica concreta
 D in situazioni specifiche e aspecifiche
 E in maniera dele tutto casuale
347. La clorpromazina è:

- A un antipsicotico "atipico"
- B* un antipsicotico "tipico"
- C un SSRI
- D un antidepressivo triciclico
- E un ansiolitico non benzodiazepinico

348. Secondo l'attuale legislazione, l'ordinanza di ricovero per un T.S.O. deve essere firmata dal:

- A* sindaco
- B medico provinciale
- C pretore
- D questore
- E prefetto

349. Secondo la teoria dopaminergica, quali aree cerebrali sono maggiormente implicate nella patogenesi della schizofrenia?

- A proiezioni diffuse dalla corteccia ai nuclei sottocorticali
- B tratti nigro-striatali
- C tratti parieto-occipitali
- D proiezioni mesencefalo-talamiche
- E* tratti mesolimbici e mesocorticali

350. Cos'è il craving per l'alcol?

- A la predilezione per i superalcolici
- B l'uso concomitante di diverse sostanze d'abuso
- C l'astinenza da alcol
- D l'abuso di alcol
- E* il marcato desiderio di assumere alcolici