



ANNO ACCADEMICO 2009/2010

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

1. Il ritardo mentale può essere sotteso da differente eziologia; quale tra i seguenti fattori è più frequente?
A fattori endocrini
B fattori che agiscono durante il periodo perinatale
C fattori che agiscono durante il periodo postnatale
D* fattori genetici
E fattori metabolici
2. Le crisi febbrili possono comparire più facilmente quando:
A la temperatura corporea sale lentamente sopra i 38,5°
B la temperatura si mantiene stabile sopra i 39°
C la temperatura raggiunge i 40° lentamente
D la temperatura supera i 37,5°
E* la temperatura si innalza o diminuisce rapidamente
3. Nel prematuro la forma più frequente di Paralisi cerebrale infantile è:
A tetraparesi spastica
B emiplegia spastica
C* diplegia spastica
D triparesi
E monoparesi
4. I farmaci di prima scelta nel trattamento del Disturbo Ossessivo Compulsivo sono:
A* gli antidepressivi serotoninergici
B i cortisonici
C gli antiepilettici
D gli inibitori degli oppioidi endogeni
E la fenfluramina
5. Il comportamento di "hand washing" è caratteristico
A* della sindrome di Rett
B della sindrome di Angelman
C della ADHD
D della sindrome di Gilles de La Tourette
E degli stati fobici
6. La distonia è una manifestazione:
A cerebellare
B piramidale
C* extrapiramidale
D midollare
E cordonale posteriore
7. Cos'è l'ipsaritmia?
A un'alterazione del ritmo sonno veglia
B una particolare forma di movimento
C un segno elettrocardiografico
D un disturbo del ritmo vocale
E* il quadro elettroencefalografico della sindrome di West
8. Nella distrofia muscolare di Duchenne si osserva un'andatura
A Falciante
B Steppante
C Paraplegica
D* Anserina
E Emiplegica
9. Quale delle seguenti caratteristiche non è presente nella malattia di Farh?
A* Neuropatia sensoriale
B Segni extra-piramidali
C Epilessia
D Ritardo mentale
E Calcificazione dei gangli della base
10. Il neurotrasmettitore coinvolto nella genesi dell'ADHD è:
A* dopamina
B noradrenalina
C acetilcolina
D serotonina
E adrenalina
11. La Sindrome di Asperger:
A è una malattia neuromuscolare
B è una sindrome dismorfica associata a ritardo mentale
C è una malattia metabolica
D è una sindrome neurocutanea
E* è un disturbo generalizzato dello sviluppo
12. Il piede cavo è un segno che si associa frequentemente con
A* la malattia di Friedreich
B tetraparesi spastica
C paraparesi spastica
D tetraparesi distonica
E distrofia muscolare
13. Disturbo di personalità:
A* disturbo a prevalente esordio nell'età puberale
B disturbo generalizzato dello sviluppo
C appartiene ai disturbi dell'affettività
D parafilia
E disturbo prevalente della prima infanzia
14. L'utilizzo della tossina botulinica avviene:
A* nella diplegia spastica
B nell'epilessia
C nella corea di Sydenham
D nella malattia di Wilson
E nelle malattie neuromuscolari
15. Quale dei seguenti farmaci può essere utilizzato nei bambini per la terapia dell'attacco emicranico?
A 5 idrossi-triptofano
B amitriptilina
C carbamazepina
D nitrazepam
E* paracetamolo
16. Spasmi in flessione, ipsaritmia, regressione psicomotoria caratterizzano la:
A Sindrome di Cornelia de Lange
B* Sindrome di West
C Sindrome di Lennox
D Sindrome di Rud
E Sindrome di Pick
17. L'anoressia mentale dell'adolescente si presenta con tutte le seguenti caratteristiche, tranne
A amenorrea
B conservazione dell'appetito
C* perdita totale dell'appetito
D marcato calo ponderale
E alterazione dei comportamenti alimentari
18. I riflessi osteo-tendinei nelle paralisi cerebrali infantili sono:
A Assenti

- B Ipoevocabili
C* Iperelicitabili, talora associati al clono
D Normali
E Dissociati
19. La sindrome di Aicardi è caratterizzata da tutte le seguenti, tranne:
A crisi convulsive che non rispondono agli anticonvulsivanti
B agenesia del corpo calloso
C coloboma del disco ottico
D* colpisce quasi esclusivamente i maschi
E ritardo mentale
20. Il conflitto nevrotico è:
A una reazione aggressiva
B l'esperienza vissuta, relativa ad uno stadioparticolare dello sviluppo
C* un conflitto interiorizzato inconscio
D un atteggiamento oppositorio verso l'adulto
E uno stato confusionale
21. Tutti i seguenti sintomi sono caratteristici della schizofrenia, tranne:
A deliri
B allucinazioni
C sentimenti di depersonalizzazione
D profonda ansietà
E* tendono ad avere un carattere molto ordinato
22. Cosa sono le reazioni paracadute:
A* Estensioni protettive di segmenti corporei della parte in cui ci si aspetta di cadere
B Reazioni psicologiche a un trauma
C Un riflesso arcaico
D Una reazione presente nella sindrome piramidale
E Movimenti volontari degli arti inferiori
23. Quale, tra i seguenti sintomi/segni, può ritenersi un precoce indicatore di disturbo d'ansia?
A Ritardo psicomotorio
B Vomito mattutino
C* Modalità di attaccamento insicuro-evitante nella relazione madre-figlio
D Aggressività verso i coetanei
E Insonnia
24. Durante uno stato di male epilettico si inietta e.v. allo scopo di arrestare le crisi:
A teofillina
B clorpromazina
C* diazepam
D aloperidolo
E clorimipramina
25. Gli spasmi affettivi esordiscono tipicamente a quale delle seguenti età?
A primi 3 mesi
B* 6-16 mesi
C 2-5 anni
D 5-6 anni
E 8-10 anni
26. Il Test di Rorschach è:
A* un test proiettivo
B una prova di efficienza
C un test intellettuale
D un test tematico
E un questionario a risposta multipla
27. Il riflesso di Moro si osserva:
A* nel neonato
B nel morbo di Parkinson
C nelle malattie neuromuscolari
D nell'intossicazione da CO
E nel trauma cranico infantile
28. Quali tra i farmaci seguenti è un timolettrico tricyclico:
A clorpromazina
B* amitriptilina
C paroxetina
D haloperidolo
E tranilcipromina
29. Sono tutti sintomi dell'autismo tranne:
A stereotipie di movimento
B ecolalia
C mancanza di interazione sociale
D* disturbi motori
E alterazioni del linguaggio
30. Una crisi jacksoniana può essere il primo sintomo di
A una schizofrenia
B un episodio maniacale acuto
C una radicolonevrite
D una sindrome di Reye
E* un tumore cerebrale
31. Cosa significa la sigla SMA?
A Sindrome da Marcata Anemia
B* Atrofia Muscolare Spinale
C Sindrome da Mal Assorbimento
D Anoressia maschile secondaria
E Nessuna delle precedenti
32. Il disturbo da deficit dell'attenzione con iperattività non comprende:
A difficoltà a concentrarsi
B* movimenti bizzarri
C impulsività
D difficoltà dell'attenzione
E iperattività
33. Si può pensare che un bambino presenti un ritardo del linguaggio quando:
A* Non pronuncia nessuna parolina a 18 mesi e/o nessuna frase a 30 mesi
B Non presenta lallazione a 1 mese
C Non pronuncia le prime parole a 6 mesi
D Non pronuncia le prime parole a 10 mesi
E Non pronuncia nessuna parola a 12 mesi
34. Nell'epilessia le crisi sono facilitate soprattutto da:
A* deprivazione di sonno
B ansia
C febbre
D alimentazione irregolare
E assunzione di pasti
35. Quale delle seguenti manifestazioni non rientra tra i disturbi psicosomatici?
A coliche gassose
B asma
C spasmi affettivi
D* fobie
E emicrania
36. L'ipotesi genetica del disturbo autistico si basa soprattutto
A Sul riscontro di autismo in varie sindromi malformative
B Sul riscontro di disfunzioni neurotrasmettitoriali
C* Su studi di linkage e sui gemelli
D Su modelli sperimentali animali
E Sulla comorbidità psicopatologica
37. Il fenotipo neurocognitivo dell'Autismo infantile può essere attribuito a:
A Dispercezione visiva e uditiva
B Difficoltà di decodificazione del linguaggio
C* Mancata acquisizione dei processi di metarappresentazione
D Disturbo di relazione madre-figlio
E Consanguineità dei genitori
38. Nell'autismo ad alto funzionamento:
A* lo sguardo è peculiare e freddo (distaccato)
B la soglia uditiva è ridotta
C il ritardo mentale è importante
D il linguaggio è assente
E l'epilessia è sempre presente
39. Nella anoressia nervosa o bulimia, quale sintomatologia è più frequentemente associata?
A* Turbe dell'umore
B Turbe della sessualità
C Turbe delle condotte additive
D Difficoltà di apprendimento
E Ossessività

40. Quale definizione ti sembra più appropriata per l'autismo?
A Un disturbo del comportamento dovuto a fattori ambientali
B* Un disturbo precoce di sviluppo secondario ad alterazioni cerebrali
C Un handicap mentale che migliora con la psicoanalisi
D Una malattia mentale dovuta a fattori psicologici
E Una malattia progressiva del SNC
41. Nella psicosi è compromesso il processo di:
A* Realtà
B Intellettivo
C Primario
D Sviluppo psicomotorio
E Funzionamento sensoriale
42. Quale delle seguenti affermazioni riguardante gli spasmi affettivi è corretto?
A Sono un sintomo della sindrome di West
B* Seguono sempre un pianto prolungato
C Comportano alterazioni EEG
D Rispondono al trattamento con ansiolitici
E Si verificano nel sonno
43. L'epilessia generalizzata si distingue da quella focale per:
A* perdita di coscienza
B breve durata
C molteplicità di focolai
D geneticamente determinata
E scosse cloniche a più di un arto
44. Quale tra le seguenti forma di epilessia focale è "benigna" per definizione?
A* epilessia a parossismi rolandici o medio-temporali
B epilessia piccolo male
C epilessia temporale
D convulsioni neonatali banigne
E grande male
45. Che cos'è la follia a due?
A Condizione di dipendenza totale tra due soggetti
B* Sindrome psicotica che insorge in due persone che per lo più convivono
C Forma di dissociazione della personalità
D Disturbo del pensiero
E Esperienza allucinatoria
46. La distrofia di Steinert è:
A Una patologia del nervo periferico
B* Una patologia del muscolo
C Una patologia della giunzione neuro-muscolare
D Una patologia del motoneurone spinale
E Una patologia della radice spinale
47. Quale delle seguenti affermazioni riguardando il "Brunet- Lézine" è corretto?
A è un test di personalità
B* è una scala di sviluppo per soggetti da 1 a 30 mesi
C è un test di efficienza intellettiva per l'età scolare
D è un test proiettivo
E è un test per la determinazione del QI
48. La sindrome di Angelman è caratterizzata da tutte le seguenti, tranne:
A cammino sulla punta dei piedi
B microcefalia
C riso sardonico
D ritardo mentale
E* obesità
49. Il disturbo post-traumatico da stress è:
A* disturbo d'ansia
B disturbo dell'affettività
C disturbo di personalità
D disturbo dell'attaccamento
E disturbo dell'identità di genere
50. La sindrome di Asperger è:
A un disturbo della condotta
B una malformazione cranica
C una malformazione encefalica
D una sindrome infettiva
E* un disturbo pervasivo dello sviluppo
51. La disprassia è
A Un disturbo della forza muscolare
B Un disturbo dell'attenzione
C* Un disturbo del movimento finalizzato a uno scopo
D Un disturbo del sonno
E Un disturbo di percezione visiva
52. La claustrofobia è
A La paura del buio
B* La paura dei luoghi chiusi
C La paura delle malattie
D La paura dell'altezza
E La paura degli spazi aperti
53. Quale dei seguenti non è un criterio diagnostico per episodio depressivo maggiore?
A* aumentato interesse per le attività quotidiane
B sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi o inappropriati
C ridotta capacità di pensare o concentrarsi
D faticabilità o mancanza di energia
E agitazione o rallentamento psicomotorio
54. Lo sviluppo mentale nelle paralisi cerebrali infantili
A è abitualmente compromesso
B* può essere compromesso in modo più o meno grave
C è compromesso solo per quanto le abilità di performance
D è alterato nel caso in cui il bambino appartenga a una condizione sindromica
E è solo eccezionalmente alterato
55. Quale di queste indagini non si rivela utile nella diagnosi precoce di paralisi cerebrale infantile?
A* Ricerca del sito fragile sul cromosoma X
B Risonanza magnetica nucleare cerebrale
C Elettroencefalogramma
D Ecografia cerebrale neonatale
E Tomografia assiale computerizzata
56. Tutte i seguenti segni/sintomi sono presenti nella sindrome oculo-cerebro-renale di Lowe, tranne:
A cataratta
B ritardo intellettivo
C glaucoma
D aminoaciduria
E* angioma retinico
57. La neurite ottica provoca:
A una diminuzione di latenza dei VEP
B una diminuzione di durata dei potenziali evocati visivi (VEP)
C* un aumento di latenza dei VEP
D un aumento di ampiezza dei VEP
E nessuna alterazione dei VEP
58. Il cosiddetto periodo di latenza riguarda:
A i bambini ipodotati
B* la fase evolutiva dai 6 ai 10/11 anni
C i bambini inclini alla menzogna
D i bambini con fobia della scuola
E i bambini epilettici
59. Quale tra i seguenti sintomi è di origine cerebellare?
A ipertonìa
B sincinesie
C* adiadocinesia
D distonia
E corea
60. Tutti i seguenti sono sintomi negativi delle schizofrenie, tranne?
A apatia
B diminuzione di energia
C astenia
D* allucinazioni e deliri
E ritiro dal mondo sociale
61. Nella malattia di Friedreich è presente:
A Piede piatto
B* Piede cavo
C Piede valgo

- D Piede varo
E Piede torto

62. Le convulsioni febbrili semplici sono caratterizzate da tutti i seguenti elementi, tranne:

- A familiarità positiva
B convulsioni generalizzate
C esordio entro il 5° anno
D* alterazioni EEG persistenti
E coincidenza con rialzo febbrile

63. La dislessia evolutiva è legata a

- A trauma cranico
B infezione del SNC
C ritardo mentale
D miopia
E* nessuna delle risposte riportate

64. Il transessualismo in adolescenza è:

- A un comportamento che si osserva in un adolescente maschio eterosessuale che utilizza uno o più indumenti femminili per eccitarsi sessualmente e masturbarsi da solo o in uno scambio con un partner
B un timore o un pensiero dell'adolescente che pensa di essere attirato da persone dello stesso sesso.
C caratterizzato soprattutto dalla ambiguità degli organi genitali esterni e si possono distinguere due categorie principali. Lo pseudoermafroditismo femminile, più frequente, e quello maschile
D* un comportamento che inizia per lo più nell'infanzia caratterizzato dal sentimento di appartenere al sesso opposto e di un desiderio intenso spesso ossessionante di cambiare la conformazione sessuale
E è una forma di omosessualità che si iscrive nel quadro delle condotte psicopatiche e si accompagna ad altre manifestazioni come la prostituzione la tossicodipendenza

65. La pseudoin sufficienza mentale è dovuta a:

- A* cause molteplici, soprattutto socio-ambientali e pedagogiche
B difetto intellettivo modico con famiglia iperstimolante
C disturbi della sfera motoria
D peculiare inibizione psicogena all'apprendimento
E lesioni microscopiche del parenchima cerebrale

66. L'emergere del bambino di quella che viene chiamata la teoria della mente implica la capacità:

- A di sviluppare un pensiero logico-deduttivo, di tipo teorico, dopo lo sviluppo di abilità pratiche.
B di compiere operazioni mentali su base rappresentativa;
C* di attribuire degli stati mentali a se stesso e agli altri, un sistema che può essere utilizzato per fare delle predizioni in particolare relative ai comportamenti dei simili;
D di identificarsi con le attitudini mentali dei genitori, ed agire di conseguenza, sviluppando così una attitudine mentale astratta.
E di trasformare le emozioni in dati teorici per le conoscenze successive.

67. Indicare quale delle seguenti affermazioni non è esatta:

- A* l'autismo infantile non può essere diagnosticato prima dei 3 anni d'età
B l'autismo rientra tra i disturbi generalizzati dello sviluppo;
C l'autismo si associa spesso a ritardo mentale
D i sintomi dell'autismo infantile insorgono prima dei 3 anni d'età
E l'autismo infantile è un comportamento stereotipato

68. Per abuso sessuale infantile si intende la pratica di atti sessuali su un minore.

- A Vero; si fa riferimento a violenza sessuale
B Falso; si tratta di comportamenti sessuali all'interno del gruppo di minori
C* Falso, non è necessario il contatto fisico;
D Vero, è necessario il contatto fisico;
E Falso, si intende una manipolazione dei genitali.

69. Tutte le seguenti patologie sono possibile causa postnatale di Paralisi Cerebrale Infantile, tranne:

- A meningite batterica
B disidratazione acuta grave
C* infezione da virus rubeolico
D stato di male convulsivo generalizzato
E trauma cranio-cerebrale

70. Un danno ipossico-ischemico della corteccia visiva primaria e/o della via visiva retrochiasmatica comporta:

- A disturbi rifrattivi
B anomalie del segmento anteriore dell'occhio
C* compromissione dell'acuità visiva e/o del campo visivo

- D assenza del riflesso fotomotore
E alterazioni retiniche

71. Si ritiene che il bambino ipercinetico alla pubertà:

- A* continua ad avere la condizione ma esercita più controllo sociale
B diventa più ipercinetico
C scompare la sua condizione
D si trasforma in disturbo d'ansia
E esita in un disturbo depressivo

72. Tutti i seguenti sono disturbi pervasivi dello sviluppo, eccetto:

- A Sindrome di Asperger
B* Sindrome di Landau-Kleffner
C Disturbo disintegrativo della fanciullezza
D Sindrome di Rett
E Disturbo autistico non altrimenti specificato

73. La valutazione precoce delle competenze linguistiche di un bambino di 12-14 mesi si basa sull'analisi:

- A* delle capacità di comprendere ed eseguire ordini semplici
B delle capacità di imitazione
C delle capacità di manipolare oggetti
D della presenza delle reazioni all'estraneo
E della acquisizione della stazione eretta

74. Con quale dei seguenti si identifica il disturbo ossessivo-compulsivo?

- A disturbo di tipo epilettico con crisi temporali
B disturbo caratterizzato dalla presenza di ossessioni, compulsioni e tics
C* disturbo caratterizzato dalla presenza di pensieri ossessivi e compulsione
D disturbo oppositivo-provocatorio
E disturbo ad esordio perinatale

75. Le paralisi cerebrali infantili di tipo spastico si caratterizzano prevalentemente per la compromissione del seguente sistema:

- A extrapiramidale
B cerebellare
C* piramidale
D neurovegetativo
E nessuno dei precedenti

76. A quale delle seguenti età un bambino riesce a costruire una torre di 2 cubi?

- A Fra i 7 e i 9 mesi
B fra gli 8 e i 10 mesi
C fra i 10 e i 12 mesi
D* fra i 12 e i 15 mesi
E fra i 15 e i 18 mesi

77. Kanner ha descritto:

- A l'iperlipinemia
B* l'autismo infantile
C una malattia psicosomatica
D una sindrome particolare di insufficienza mentale
E una sindrome epilettica

78. Attraverso quale delle seguenti modalità viene effettuata la diagnosi di fenilchetonuria?

- A mediante dosaggio della fenilalanina nelle urine
B mediante RMN cerebrale
C* mediante dosaggio della fenilalanina nel sangue
D mediante EEG
E mediante esame citogenetica

79. Quale delle seguenti affermazioni riguardante le "illusioni" è corretta?

- A comportano una forte componente rappresentativa
B sono percezioni senza oggetto
C* sono interpretazioni distorte di uno stimolo sensoriale
D compaiono in situazioni stressanti
E fanno parte del quadro clinico della schizofrenia

80. Nelle PCI (Paralisi Cerebrali Infantili) i disturbi visivi sono:

- A Determinati da anisocoria
B Associati a malformazioni dell'occhio
C* Disturbi della percezione e dell'integrazione visiva
D Causati da strabismo convergente
E Causati da corioretinite

81. La posizione seduta autonoma è raggiunta dal lattante:

- A* Verso i 7 mesi
B Verso i 5 mesi
C Verso i 12 mesi
D Verso i 3 mesi
E Dopo la comparsa del riflesso di raddrizzamento
82. Il periodo di latenza
A E' caratterizzato dal complesso edipico
B Precede la fase anale
C Si colloca tra i 2 e i 4 anni
D* Precede l'adolescenza
E Corrisponde alla fase orale
83. Una crisi epilettica generalizzata che consiste in una breve perdita di coscienza, della durata di 3-10 sec., pluriquotidiana è caratteristica di:
A* Epilessia piccolo male
B Epilessia grande male
C Epilessia focale temporale
D Epilessia parziale rolandica
E Epilessia mioclonica
84. La balbuzie
A è un disturbo dell'articolazione del linguaggio
B* è un disturbo della fluidità del linguaggio
C è prodotta da disordini gastrointestinali
D è un omonimo della dislalia
E riguarda solo bambini in età pubere
85. Tutte le seguenti sono caratteristiche del Disturbo Specifico del Linguaggio eccetto:
A presenta un tasso di prevalenza del 3-5%
B* è più frequente nelle femmine
C può essere di natura congenita o acquisita
D nei casi più gravi il linguaggio può essere inintelligibile
E la diagnosi è clinica
86. la lissencefalia si sviluppa
A nella seconda metà della gestazione
B* nella prima metà della gestazione
C durante il travaglio di parto
D nell'immediato post parto
E intorno al sesto mese di vita
87. La sclerosi tuberosa
A E' una malattia recessiva
B E' raramente accompagnata da epilessia
C* E' una malattia neurocutanea
D Può avere base genetica o acquisita
E Si può diagnosticare solo con la biopsia cerebrale
88. Quale tra queste condizioni materne causa un'encefalopatia non evolutiva?
A epilessia generalizzata
B* alcolismo
C AIDS
D fumo di sigaretta
E nevrosi fobico-ossessiva
89. Nella distrofia muscolare progressiva di Duchenne viene interessata la muscolatura:
A* Del cingolo pelvico
B Dei cingoli
C Dei muscoli facciali e scapolo omerali
D Dei cingoli scapolo omerali
E Dei muscoli omero peroneali
90. Cosa è un disturbo psicosomatico
A* Una manifestazione fisica di un disagio psicologico.
B Un disturbo su base isterica
C Un modo per attirare l'attenzione
D Un disturbo fisiologico in adolescenza
E Un sintomo depressivo
91. La leucomalacia periventricolare è tipica e più frequentemente riscontrata
A Nel neonato a termine
B* Nel neonato pretermine
C Nel lattante
D Nel paziente in età evolutiva
- E Nel giovane adulto
92. Il figlio di genitori separati
A* può presentare sia disturbi dell'apprendimento che un iperinvestimento sullo studio
B presenta sempre difficoltà di apprendimento
C presenta discalculia
D può divenire dislessico
E entro un anno dal divorzio si rifiuta sempre di andare a scuola
93. Il disturbo di personalità borderline non è caratterizzato da:
A* Deliri e allucinazioni
B Relazioni interpersonali instabili ed intense
C Instabilità affettiva
D Sentimenti cronici di vuoto
E alterazione dell'identità
94. Si intende per mioclonia
A una contrazione muscolare tonica
B* una contrazione muscolare rapida, abitualmente di tipo segmentario
C una forma di epilessia
D una manifestazione ticcosa
E omonimo di fibrillazione
95. La lesione dell'unità motoria può determinare tutti i seguenti sintomi, tranne:
A ipotrofia
B ipotonia
C ipostenia
D* distonia
E iporefflessia
96. Quale dei seguenti disturbi del linguaggio è generalmente presente nelle paralisi cerebrali atassiche?
A Afasia
B Anartria
C Ecolalia immediata
D Prosodia monotona
E* Parola scandita
97. Le lipotimie sono:
A una forma di epilessia
B* manifestazioni critiche di origine non epilettica
C un accumulo di grasso nel timo
D un disordine dell'umore
E un disturbo del sonno
98. La bulimia nervosa con complicanze comporta:
A alcalosi metabolica
B carie dentarie
C lesioni gastroenteriche
D alterazioni elettrolitico-ematiche
E* tutte le risposte riportate
99. La diagnosi differenziale da tenere in considerazione in caso di sospetto autismo è:
A Ansia di separazione
B Dislessia
C* Sindrome di Rett
D Sindrome di Silver-Russel
E Epilessia
100. A quale delle seguenti età un bambino riesce a strutturare una frase soggetto-verbo-oggetto?
A intorno ai 36 mesi
B intorno ai 30 mesi
C* intorno ai 24 mesi
D intorno ai 18 mesi
E intorno ai 15 mesi
101. A che età il bambino è in grado di distinguere i volti familiari da quelli estranei, verso i quali mostra in genere reazioni di sorpresa o di evitamento:
A* tra i 5 ed 8 mesi di vita
B nei primi 3 mesi di vita
C tra i 12 e 15 mesi di vita
D subito dopo la nascita
E a due anni
102. L'emiplegia:

- A* interessa i 2 arti di un lato del corpo
 B interessa i 2 arti inferiori
 C interessa i 2 arti superiori
 D è caratterizzata da movimenti atetoidi
 E è caratterizzata da movimenti ballistici
103. A quale delle seguenti età inizia a svilupparsi, nel bambino normale, la comprensione situazionale di parole e frasi semplici?
 A* 8-12 mesi
 B 3-6 mesi
 C 24-30 mesi
 D 6 anni
 E 7 anni
104. La prensione a pinza superiore di Gesell
 A* Avviene con la partecipazione delle estremità distali dell'indice e del pollice
 B Con prensione a rastrello
 C Verso i 7mesi
 D Verso i 5 mesi
 E Con prensione digito palmare
105. La sindrome di Down è una malattia cromosomica associata a:
 A trisomia del cromosoma 13
 B* trisomia del cromosoma 21
 C monosomia del cromosoma 18
 D duplicazione del cromosoma X
 E duplicazione del cromosoma Y
106. Il litio è indicato in caso di:
 A disturbi d'ansia
 B* disturbi bipolari
 C sindromi depressive
 D enuresi
 E tutte le precedenti
107. Nell'autismo infantile
 A* sono gravemente alterate le capacità di comunicazione e interazione
 B vi è necessità di un costante contatto fisico con il corpo della madre
 C l'oggetto transizionale viene utilizzato eccessivamente
 D il bambino apprende precocemente le autonomie relative al cibo e all'igiene personale
 E il bambino ha un grave ritardo dello sviluppo motorio
108. L'atassia è un disturbo della coordinazione del movimento dipendente da una lesione a carico di:
 A* cervelletto
 B bulbo
 C ponte
 D mesencefalo
 E sostanza nigra
109. Quale delle seguenti meglio caratterizza la disgrafia?
 A è legato ad un disturbo motorio
 B* non è associata a deficit neurologico o intellettivo
 C è legato ad un cattivo insegnamento
 D è tipico di un bambino ipovedente
 E è tipico di un bambino iperattivo
110. Quale fra i farmaci seguenti è maggiormente usato per l'enuresi primaria?
 A ACTH
 B Imipramina
 C* Desmopressina
 D Fluoxetina
 E Amfetamine
111. Per discalculia si intende:
 A* disturbo specifico dell'apprendimento del calcolo
 B disturbo aspecifico dell'apprendimento
 C manifestazione sintomatologia di fobia specifica
 D disturbo secondario a disfasia evolutiva
 E difficoltà di calcolo secondaria a ritardo mentale
112. I disturbi più frequentemente associati all'autismo sono:
 A* epilessia
 B malattie neuromuscolari
 C malattie degenerative del SNC
 D encefalite
- E meningite
113. La miastenia è una patologia di
 A Midollo
 B* Giunzione neuromuscolare
 C Nervo
 D Muscolo
 E Osso
114. Tra i disturbi d'ansia, quale esordisce più frequentemente nell'infanzia
 A Disturbo d'ansia generalizzato
 B Attacchi di panico
 C* Ansia di separazione
 D Fobia della scuola
 E Cefalea tensiva
115. A quale delle seguenti età inizia a svilupparsi la prensione volontaria di un oggetto?
 A* 6 mesi
 B 2 mesi
 C dopo i 12 mesi
 D alla nascita
 E 9 mesi
116. I tic presentano tutte le seguenti caratteristiche, tranne:
 A esecuzione improvvisa
 B esecuzione imperiosa
 C sono involontari
 D sono coscienti
 E* persistono nel sonno
117. Il disturbo di ansia da separazione comporta:
 A* disagio grave all'allontanamento dei genitori
 B linguaggio povero
 C aggressività diretta verso i genitori
 D mancanza di attività motoria
 E frequenti quadri di anoressia
118. L'assunzione sistematica di droghe in adolescenza:
 A è una condotta di dipendenza che non incide sui processi psichici dell'adolescente;
 B* è una condotta di dipendenza indice di una forte problematicità dei processi psichici dell'adolescente;
 C non è una condotta di dipendenza;
 D ha effetti comunque reversibili in futuro;
 E può essere gestito dalla libera iniziativa dell'adolescente.
119. La diagnosi precoce del disturbo autistico:
 A E' indicata da una anamnesi perinatale patologica
 B Non è possibile prima di 5 anni
 C* E' possibile entro i primi 2 anni di vita del bambino
 D Si basa su esami neuroradiologici
 E E' denunciata da anomalie epilettiche precoci
120. Lo sviluppo intellettuale del bambino epilettico è soprattutto condizionato da:
 A vissuto di malattia
 B atteggiamento iperprotettivo della famiglia
 C* tipo e frequenza delle crisi
 D inserimento all'asilo nido
 E una corretta alimentazione
121. Disturbi pervasivi dello sviluppo comprendono:
 A disturbo di personalità
 B* autismo
 C ritardo mentale
 D dislessia
 E nessuno dei precedenti
122. La distrofia muscolare di Duchenne presenta una trasmissione ereditaria di quale tipo?
 A autosomica dominante
 B autosomica recessiva
 C* X-linked
 D mitocondriale
 E nessuna ereditarietà
123. I test di personalità sono:

- A Reattivi che consentono di predire la risposta alla terapia farmacologica
 B* Reattivi che forniscono informazioni sulla struttura del carattere
 C Un momento particolare della terapia psicoanalitica
 D Atteggiamenti particolari del paziente nei confronti del terapeuta
 E nessuna delle risposte riportate
124. Cos'è la lallazione?
 A una forma di balbuzie
 B una manifestazione ticcosa
 C un disturbo cinetico
 D un sintomo della Corea minor
 E* una fase dello sviluppo del linguaggio
125. Il mericismo è una malattia della sfera digestiva caratterizzata:
 A dal manifestarsi, dopo un intervallo libero di 8-10 giorni, spesso dopo il pasto, di crisi di pianto irrefrenabili durante le quali il bambino è difficilmente consolabile.
 B da una anoressia che sopravviene, per lo più, tra i 5 e gli 8 mesi e che compare sia progressivamente che bruscamente, talvolta in occasione di un cambiamento nel regime alimentare.
 C da una anoressia che compare nella seconda infanzia e che è contraddistinta da un vivo atteggiamento oppositivo e dalla frequente esistenza di capricci alimentati più o meno variabili.
 D da una anoressia che compare senza un intervallo libero in un neonato inizialmente passivo che sembra non avere alcun interesse per il biberon. L'attitudine oppositiva appare in un secondo momento.
 E* da un rigurgito provocato a volte da sforzi manifesti a volte con facilità. Questo vomito provocato conduce ad una ruminazione.
126. La sindrome di Rett è:
 A una malformazione del cervelletto
 B una aberrazione cromosomica
 C una encefalopatia acquisita prenatale
 D una encefalopatia perinatale
 E* una sindrome genetica
127. Quale meccanismo psicopatologico è sempre presente nei disturbi di personalità?
 A* Scissione
 B Spostamento
 C Negazione
 D Isolamento
 E Alterazione dell'identità
128. Nelle convulsioni febbrili l'EEG in genere presenta:
 A punte-onda a 3 Hz
 B* segni aspecifici
 C punte-onda lente
 D polipunte-onda
 E pattern periodico
129. Quale delle seguenti affermazioni identifica La Sindrome di Martin-Bell
 A è una forma di paralisi del facciale acquisita, acuta, idiopatica
 B è una sindrome plurimalformativa che esita nella morte del bambino entro i primi 10 anni di vita
 C è una malattia neurodegenerativa che esordisce dopo i 10 anni di vita
 D è una forma di Ritardo Mentale dovuta ad un'alterazione genica a trasmissione autosomica recessiva
 E* è una sindrome genetica caratterizzata da un'anomalia strutturale a carico del cromosoma X
130. Il disturbo della fonazione:
 A riguarda il linguaggio di espressione
 B riguarda l'espressione e la comprensione del linguaggio
 C* riguarda l'articolazione dei suoni
 D riguarda la comprensione del linguaggio
 E riguarda la fluenza dell'eloquio
131. Gli spasmi affettivi nella prima infanzia sono:
 A convulsioni febbrili
 B una forma grave di epilessia
 C una crisi isterica
 D* una perdita di coscienza breve, su base organicofunzionale, di natura psicorelazionale
 E gli esiti di una malattia infettiva
132. Quale delle seguenti caratteristiche non è tipica del disturbo da deficit di attenzione con iperattività (ADHD)?
 A* Maggior frequenza nel sesso femminile
 B Facile distraibilità
- C Aspetto sognante
 D Impulsività
 E Associazione con disturbi del linguaggio
133. Tra le seguenti condizioni quale viene più frequentemente osservata in comorbidità con il disturbo d'ansia
 A Ritardo mentale lieve
 B Convulsioni febbrili plus
 C* Deficit di attenzione-iperattività
 D Sindrome di Asperger
 E Dislessia
134. La comparsa di reazioni di equilibrio permette che:
 A* Il baricentro cada sempre nella base di appoggio
 B Scompaiano definitivamente le reazioni paracadute
 C Inizi la fase di aggrappamento
 D Finisca la fase di aggrappamento
 E Inizi la deambulazione autonoma
135. Che cosa si intende per breakdown evolutivo in un adolescente
 A l'ingresso in una schizofrenia precoce
 B* un'alterazione dello stato psichico coincidente con la crisi adolescenziale con perdita del senso di continuità temporale crollo delle difese dell'Io e talvolta frattura con il mondo esterno
 C il periodo di viraggio dalla fase depressiva a quella maniacale nel disturbo bipolare dell'adolescenza
 D la fase discendente di fatica e triste che fa seguito all'effetto ascendente dopo assunzione di amfetamine
 E nessuna delle risposte riportate
136. La sede più frequente dei tumori cerebrali nell'infanzia è
 A Tronco
 B* Cervelletto
 C Midollo
 D Angolo ponto-cerebellare
 E Emisferi cerebrali
137. Il fallimento scolastico
 A è sempre dovuto ad un disturbo specifico dell'apprendimento
 B è sempre legato a un difetto socioculturale
 C è espressione di una psicopatologia relativa ad inibizione dell'impulso di conoscenza
 D è legato ad un ritardo cognitivo
 E* può dipendere da aspetti multifattoriali di vario tipo, compresi tutti i precedenti
138. Quale dei seguenti sintomi è caratteristico della malattia di Gilles de la Tourette
 A Iperfagia
 B Stereotipie
 C* Coprolalia
 D Ipersonnia
 E Ecolalia
139. Quale dei seguenti disturbi è più frequente nei maschi rispetto alle femmine?
 A Mutismo selettivo
 B Depressione post puberale
 C Disturbo della condotta
 D* Rifiuto scolastico
 E Fobia degli animali
140. La produzione delle prime parole inizia nel bambino normale a:
 A* 12-18 mesi
 B 2-3 mesi
 C 6 mesi
 D 3 anni
 E 2 anni
141. Il riflesso tonico asimmetrico del collo è caratterizzato da quale delle seguenti posizioni?
 A Capo flesso, arti superiori flessi, arti inferiori estesi
 B* Capo ruotato, arti nicali flessi, arti faciali estesi
 C Capo flesso, arti superiori estesi, arti inferiori flessi
 D Capo esteso, arti superiori estesi, arti inferiori estesi
 E Capo esteso, arti superiori estesi, arti inferiori flessi
142. L'ipoplasia cerebellare
 A E' una malformazione senza conseguenze cliniche

- B Si accompagna sempre ad idrocefalo
 C* Si accompagna spesso a ritardo mentale
 D E' individuabile sulla base di alterazioni elettroencefalografiche
 E Va corretta chirurgicamente
143. In quale delle seguenti patologie è ridotta la velocità di conduzione nervosa motoria?
 A malattia di Werdnig Hoffmann
 B paralisi cerebrali infantili
 C* sindrome di Guillain Barré
 D miastenia grave
 E malattia di Becker
144. I movimenti atetoidi sono:
 A* Movimenti aritmici, lenti, accentuati dall'attività volontaria. Essi interessano in maniera erratica vari distretti corporei con prevalenza del viso e delle estremità degli arti.
 B Movimenti rapidi, aritmici, che si verificano in maniera erratica in vari segmenti corporei: estremità degli arti, volto lingua e tronco
 C Movimenti ritmici, rapidi, che possono interessare diversi distretti corporei.
 D Movimenti parassiti che accompagnano il movimento volontario
 E Movimenti ritmici, lenti, accentuati dall'attività volontaria.
145. Quale dei seguenti dati non depone per una diagnosi di epilessia idiopatica:
 A assenza di sofferenza da parto
 B* alterazioni neurologiche di lato
 C normalità psichica prima dell'inizio delle crisi
 D anamnesi familiare positiva per epilessia
 E sviluppo neuromotorio normale
146. Tutte le seguenti condizioni si accompagnano ad ipotonia nel lattante, tranne:
 A atrofia muscolare spinale (M. di Werdnig Hoffmann)
 B ipotiroidismo congenito
 C* distrofia muscolare progressiva (Duchenne)
 D sindrome di Down
 E ipotonia congenita benigna
147. La malattia di Menkes è dovuta al difetto intracellulare del trasporto di quale delle seguenti sostanze?
 A* rame
 B magnesio
 C ferro
 D zinco
 E iodio
148. Il cervelletto è importante per:
 A* mantenere l'equilibrio e la regolazione del tono muscolare
 B la forza muscolare
 C il funzionamento degli organi interni
 D attività volontaria
 E regolazione neurovegetativa
149. Il morbo di Parkinson comporta:
 A* acinesia-bradicinesia
 B distonia
 C atetosi
 D ipotonia
 E atassia
150. Attualmente il trattamento preferibile della spasticità nelle P.C.I (Paralisi Cerebrale Infantili) è:
 A chirurgico
 B* infiltrazione di tossina botulinica e fisiochinesiterapia
 C somministrazione di farmaci antispastici per via generale
 D trattamento in situ con fenolo o alcool etilico
 E baclofen intratecale
151. Le convulsioni febbrili sono generalmente:
 A* generalizzate
 B parziali
 C crisi di assenza
 D con temperatura inferiore ai 38 gradi
 E con EEG alterato
152. Il periodo delle operazioni formali o ipotetico-deduttivo va da:
 A 0-24 mesi
 B 2-4 anni
 C 5-7 anni
 D 8-10 anni
 E* 11-13 anni
153. Quali di queste patologie possono essere presenti nel morbo di Wilson:
 A anemia emolitica
 B cataratta
 C sindrome nefrosica
 D* cirrosi epatica
 E narcolessia
154. La dismorfofobia è:
 A Paura dei mostri
 B* Paura di deformazioni corporee
 C Paura delle malattie
 D Paura del buio
 E Paura dei luoghi chiusi
155. Cosa si intende per processo di differenziazione neuronale:
 A* Il raggiungimento delle caratteristiche morfologiche e biochimiche proprie di ciascun neurone
 B La formazione del cono di crescita
 C La crescita della cellula nervosa
 D La migrazione cellulare gliale
 E La comparsa di sinapsi
156. Nell'episodio maniaco tutti i seguenti sintomi sono diagnostici, tranne
 A* aumentato bisogno di sonno
 B maggiore loquacità
 C fuga delle idee
 D distraibilità
 E autostima ipertrofica
157. Le matrici progressive di Raven (PM 38 e PM47) sono un test che valuta:
 A il linguaggio
 B* l'intelligenza
 C le funzioni grafomotorie
 D le funzioni esecutive
 E la personalità
158. La psicoterapia di gruppo:
 A* è una delle proposte di psicoterapia utili per l'adolescente;
 B è la forma elettiva di psicoterapia utile per l'adolescente;
 C non è praticabile in adolescenza;
 D è praticabile soltanto nelle crisi lievi di sviluppo;
 E è più praticabile nei casi di grave psicopatologia.
159. La microcefalia vera è indicata da:
 A anamnesi positiva per infezione prenatale
 B assenza del corpo calloso
 C* Una circonferenza cranica < 3 DS in rapporto all'età
 D Crisi convulsive neonatali
 E Una circonferenza cranica alla nascita di cm.34
160. La corea:
 A è un disturbo del tono muscolare
 B è un movimento volontario
 C è un disturbo di origine cerebellare
 D è una sincinesia
 E* è una manifestazione legata a patologie dei gangli della base
161. Cosa è la rimozione?
 A uno spostamento di energia
 B odio verso i genitori
 C l'asportazione di un organo
 D un' emissione cerebrale
 E* un meccanismo psichico di difesa
162. La malattia di Becker è una:
 A Aminoacidopatia
 B* Distrofia muscolare progressiva
 C Amiotrofia spinale
 D Mucopolisaccaridosi
 E Gangliosidosi
163. La fobia della scuola si può presentare con:
 A fughe

- B cefalea
 C dolori addominali, vomito
 D ansia da prestazione
 E* tutti i disturbi citati
164. Il ritardo semplice del linguaggio si caratterizza per solo uno dei seguenti fattori. Quale?
 A presenza di insufficienza mentale
 B grave ipoacusia
 C organizzazione di tipo psicotico
 D* alterata costruzione della frase e organizzazione sintattica
 E esordio entro il 1° anno
165. La cardiomiopatia dilatativa è un segno comune di quale delle seguenti patologie?
 A atrofia muscolare spinale
 B* distrofia di Becker
 C miastenia grave
 D neuropatie periferiche
 E osteopatie multiple
166. La sindrome di West è:
 A una sindrome infettiva
 B una sindrome neuromuscolare
 C una malformazione del cervelletto
 D una sindrome del midollo spinale
 E* una encefalopatia epilettica
167. Quale fattore nell'autismo è prognosticamente sfavorevole?
 A Il sesso maschile
 B Le stereotipie gestuali
 C* Avere un QI minore di 60
 D Avere genitori anziani
 E Goffaggine motoria
168. Il meccanismo psicodinamico presente nella isteria è:
 A* Rimozione e conversione
 B Rimozione e spostamento
 C Rimozione e isolamento
 D Diniego
 E Negazione
169. Una stabile dedifinizione dell'identità sessuale:
 A* si realizza con la conclusione dell'adolescenza;
 B si realizza con la conclusione della pubertà;
 C si realizza esclusivamente nei primi anni dello sviluppo;
 D si realizza dopo il primo rapporto sessuale;
 E si realizza con uno stabile rapporto di coppia.
170. Tutte le seguenti caratteristiche cliniche sono tipiche della sindrome di Turner, tranne
 A bassa statura
 B linfedema in epoca neonatale
 C gomito valgo
 D peluria pubica
 E* ritardo mentale
171. La emiplegia infantile spastica è associata a tutte le seguenti manifestazioni, tranne
 A* deambulare sui talloni
 B segni di coinvolgimento delle vie piramidali
 C ipertono adduttori della coscia
 D possibile riduzione della lunghezza delle estremità coinvolte
 E l'astereognosia della mano coinvolta
172. Cosa significa Onicofagia?
 A* atto del rosicchiare le unghie
 B tendenza a mangiare onice
 C persistenza dell'uso del ciucciotto
 D mangiare poco
 E suzione avida del seno
173. Quale delle seguenti affermazioni è corretta per ciò che riguardano le crisi nell'epilessia parziale benigna a parossismi rolandici?
 A sono attivate da stimoli luminosi
 B* si verificano spesso nelle prime fasi del sonno non REM
 C sono sempre generalizzate
 D sono guaribili solo con il trattamento farmacologico
- E sono scatenate dall'iperpnea
174. Quale dei seguenti reperti è diagnostico nella poliganglioradicolonevrite?
 A Elettromiogramma alterato
 B Disturbi della pallestesia
 C* Dissociazione albumino-citologica nel liquor
 D Potenziali evocati uditivi alterati
 E Pleiocitosi liquorale
175. La depressione infantile:
 A* si caratterizza per un quadro clinico eterogeneo e variabile in funzione dell'età
 B si manifesta con la sintomatologia tipica dell'età adulta
 C è esclusivamente reattiva a problematiche affettivo-relazionali e/o a disadattamento scolastico
 D è sempre mascherata
 E comporta un alto tasso di suicidio
176. IL DSM IV è:
 A Un organismo internazionale preposto allo studio dei disturbi psichiatrici
 B Un sistema di classificazione dei disturbi neurologici del bambino
 C Un sistema di classificazione dei Disturbi e delle Sindromi in Medicina
 D Una malattia virale
 E* Un sistema di classificazione dei disturbi psichiatrici
177. Tutte le seguenti possono causare le psicosi esogene, tranne:
 A alcool
 B droghe leggere
 C farmaci
 D malattie somatiche, spesso di tipo infettivo
 E* fumo
178. A quale delle seguenti condizioni può essere legata l'ipotonia neonatale generalizzata grave?
 A Fenilchetonuria
 B Paralisi del plesso brachiale
 C* SMA di tipo I
 D Galattosemia
 E Idrocefalo congenito
179. Una fobia è:
 A un sintomo d'ansia che si manifesta a partire dall'adolescenza
 B un movimento ripetitivo che si accompagna ad ansia
 C l'impulso a scappare per evitare un oggetto che produce ansia
 D la convinzione ingiustificata di avere contratto una malattia
 E* l'ansia clinicamente significativa provocata dall'esposizione ad un oggetto o situazione temuti
180. Nelle neuropatie demielinizzanti la velocità di conduzione è
 A Normale
 B* Ridotta o assente
 C Aumentata
 D Variabile
 E Aumentata solo nella fase avanzata della malattia
181. Le dismorfofobie in adolescenza sono legate a:
 A* Perturbazioni dell'immagine corporea
 B Deliri sul corpo
 C Fobie di oggetto o di situazione
 D Difetti corporei reali
 E Le trasformazioni della pubertà
182. Tutti i seguenti sintomi/segni sono caratteristici della psicosi, tranne:
 A* Balbuzie
 B Scarsa sensibilità al dolore
 C Stereotipie gestuali
 D Ecolalie
 E Alterato giudizio di realtà
183. In tutti i seguenti quadri malfornativi è presente una malformazione del cervelletto, tranne:
 A Sindrome di Joubert
 B Sindrome di Dandy-Walker
 C Disrafia tetto-cerebellare
 D Malformazione di Arnold-Chiari
 E* Sindrome di Aicardi
184. Si definiscono classicamente percezioni senza oggetto

- A Le allucinosi
 B* Le allucinazioni
 C I falsi riconoscimenti
 D Le illusioni
 E Le confabulazioni
185. I più frequenti effetti collaterali del valproato sono:
 A dermatologici
 B neuropsichici
 C* gastrointestinali
 D ematologici
 E respiratori
186. Quale dei seguenti sintomi psicopatologici non si può verificare in un bambino di età inferiore a tre anni?
 A fobia
 B ansia
 C depressione
 D* delirio
 E disturbi alimentari
187. In quale delle seguenti condizioni l'EEG non è utile:
 A* disturbi dell'apprendimento
 B epilessie generalizzate
 C epilessie parziali
 D encefaliti
 E traumi cranici
188. La terapia dell'ADHD consiste:
 A trattamento con farmaci sedativi.
 B* intervento psicoeducativo con associato, se occorre, un trattamento farmacologico
 C terapia familiare per correggere gli errori educativi
 D restrizioni dietetiche
 E sedute di ipnosi.
189. La sindrome autistica si contraddistingue per la presenza di 3 condizioni sintomatologiche fondamentali per la sua diagnosi:
 A* disturbo della comunicazione, disturbo della socializzazione, disturbo del comportamento
 B disturbo della comunicazione, disturbo della personalità, disturbo della socializzazione
 C disturbo della comunicazione, disturbo della personalità, disturbo del comportamento
 D disturbo del linguaggio, disturbo della personalità, disturbo della socializzazione
 E ritardo mentale, disturbo del linguaggio, disturbo della personalità
190. Le paralisi cerebrali infantili sono:
 A* patologie caratterizzate da invalidità motorie e posturali permanenti dovute a lesioni cerebrali non evolutive
 B patologie caratterizzate da disfunzioni motorie ereditarie
 C patologie caratterizzate da invalidità motorie dovute ad accidenti vascolari giovanili
 D patologie in cui il quadro neuromotorio esordisce tardivamente con regressione di competenze precedentemente acquisite
 E processi patologici degenerativi dovuti a lesioni cerebrali evolutive
191. Nell'ambito delle Paralisi Cerebrali Infantili in quale condizione è meno frequente l'associazione con epilessia?
 A forma distonico-ateosica
 B emiparesi spastica
 C tetraparesi spastica
 D* diplegia spastica
 E forme associate a ritardo mentale grave
192. Quale dei seguenti disturbi si associano alla sindrome di West?
 A spasmi affettivi
 B* spasmi infantili
 C crisi gran male
 D crisi isteriche
 E cefalea
193. Con il termine prassia si intende:
 A Capacità di compiere un movimento
 B* Capacità di compiere un atto finalizzato
 C Capacità di riconoscere la realtà
 D Disturbo dell'attività motoria
 E Disturbo dell'attività cognitiva
194. Alla dislessia evolutiva spesso è associato
 A disturbo di attenzione
 B disturbo nella discriminazione dei colori
 C disturbo della marcia
 D* disturbo del calcolo
 E disturbo della coordinazione
195. Tutti i seguenti fattori giocano un ruolo determinante nella depressione analetica, tranne:
 A la separazione completa dalla madre
 B* l'eccessivo investimento paterno
 C l'età del bambino
 D l'assenza di figure vicarianti
 E il precedente rapporto madre-bambino
196. Secondo la teoria di R. Spitz, il secondo organizzatore dello psichismo nel bambino è caratterizzato da:
 A il processo di separazione-individuazione;
 B la scoperta dell'oggetto transizionale
 C* la comparsa della reazione d'angoscia di fronte ad un viso estraneo verso gli otto mesi;
 D dall'eroticismo uretrale;
 E la capacità di mantenere relazioni strette, gioiose e felici con il suo buono stato affettivo di base, con una costellazione di piacere, di benessere e di sentimenti di sicurezza.
197. Indicare quale tra i sintomi seguenti è un sintomo psicotico
 A* Dissociazione della personalità
 B Enuresi
 C Fobie
 D Manifestazioni ossessive
 E Tics
198. Che cosa si intende per ritardo mentale?
 A Un inadeguato livello intellettuale in presenza di normali capacità adattive
 B Una significativa limitazione del funzionamento adattivo in presenza di un adeguato livello intellettuale
 C Un disturbo psichico ad insorgenza in età scolare
 D* Un funzionamento intellettuale generale al di sotto della media associato a carenze nel comportamento adattivo
 E Una significativa riduzione del livello intellettuale ad insorgenza in età adulta
199. Cosa si intende per sollecitudine materna primaria?
 A la preoccupazione della madre
 B* lo stato affettivo materno immediatamente precedente la nascita e subito successivo
 C la razione di angoscia materna
 D la depressione post-partum
 E l'iperprotezione materna
200. La fenilchetonuria è una malattia del metabolismo
 A Degli acidi nucleici
 B Degli acidi grassi a catena lunga
 C* Degli aminoacidi
 D Del ciclo dell'urea
 E Delle purine
201. Il disturbo specifico del linguaggio
 A* è un disturbo che interessa selettivamente la competenza linguistica
 B è secondario a sordità
 C è secondario a encefalite
 D è legato a ritardo mentale
 E è un disturbo relazionale
202. Definizione di paralisi cerebrale infantile:
 A* Complesso sintomatologico con disturbo motorio causato da un danno non evolutivo del Sistema Nervoso Centrale, occorso nel periodo pre-perinatale
 B Encefalopatia che ha determinato una epilessia
 C Danno congenito a carico di un qualsiasi componente del Sistema Nervoso Centrale o Periferico
 D Paralisi infantile dovuta ad una malattia metabolica congenita del neonato
 E Paresi transitoria di un distretto, causata da fattori ipossico ischemici
203. Le false denunce sono un fenomeno estremamente raro in casi di abuso sessuale infantile.
 A* Falso, la frequenza è elevata, soprattutto nei casi di separazioni conflittuali tra i genitori;
 B Falso, la frequenza è elevata, soprattutto nei casi di ipotetico abuso sessuale istituzionale;

- C Vero, i bambini su questi temi non sono in grado di mentire o di affermare una cosa per un'altra;
 D Non sono un fenomeno raro;
 E Vero, ma dipende dall'età del bambino.
204. La Sindrome di Guillain-Barré:
 A* E' una poliradicolonevrite post-infettiva.
 B Ha caratteristiche di cronocità.
 C Coinvolge il Sistema Nervoso Centrale.
 D L'etiopatogenesi è legata ad una infezione batterica.
 E Coinvolge frequentemente la muscolatura respiratoria.
205. Il segno di Babinski è indice di alterazione:
 A del sistema cerebellare
 B della via extrapiramidale
 C dei nervi cranici
 D delle vie sensitive
 E* della via piramidale
206. Le manifestazioni critiche che caratterizzano l'epilessia piccolo male sono:
 A crisi tonico-cloniche
 B* crisi di assenza
 C crisi motorie emisimiche
 D crisi di pianto
 E spasmi in flessione
207. Tutti i seguenti segni/sintomi sono caratteristici della sindrome di Rett, tranne:
 A* Retinite pigmentosa
 B Demenza
 C Aprassia della marcia
 D Autismo
 E Crisi convulsive
208. La neurofibromatosi tipo 1 si caratterizza per tutte le seguenti manifestazioni eccetto una. Quale?
 A noduli di Lisch
 B macchie caffè-latte
 C aumentata incidenza di gliomi delle vie ottiche
 D* teleangectasie oculari
 E ereditarietà dominante
209. I reati compiuti dai minori sono, perlopiù, contro la persona.
 A Falso,
 B Vero;
 C* Falso, i più frequenti sono i reati contro la proprietà;
 D La distinzione fondamentale è tra reati compiuti da giovani nati nel paese o provenienti dall'estero. Cambia il tipo di reato.
 E Non c'è più alcuna differenza tra i reati compiuti da minori o da maggiorenni.
210. La sclerosi tuberosa è
 A una malattia dovuta ad una infezione prenatale
 B un processo sclerotico che esordisce in adolescenza
 C* una malattia multisistemica geneticamente determinata
 D una malattia dovuta ad intossicazione da metalli pesanti
 E una malattia legata al complesso TORCH
211. La dislessia si manifesta:
 A nel primo anno di vita
 B nel secondo anno di vita
 C nel terzo anno di vita
 D all'inizio della scuola media
 E* all'inizio della scuola elementare
212. La sindrome di Gilles de la Tourette può essere osservata in comorbidità con quale delle seguenti condizioni?
 A Il ritardo del linguaggio
 B Le crisi epilettiche generalizzate
 C* Il disturbo autistico
 D Il ritardo mentale
 E La bulimia nervosa
213. Tutti le seguenti caratteristiche sono tipiche della sclerosi tuberosa, tranne:
 A epilessia precoce (S. di West)
 B nevi acromici
 C eredità dominante
 D adenoma sebaceo
- E* angioma facciale
214. Quale delle seguenti affermazioni per ciò che riguarda gli Spasmi affettivi è esatta?
 A sono una causa comune di morte improvvisa
 B rappresentano una forma di epilessia
 C* si risolvono spontaneamente entro i primi anni
 D sono più frequenti tra i 4 e i 6 anni
 E sono un fattore di rischio per epilessia
215. La schizencefalia è:
 A un disturbo della proliferazione neuronale
 B* un disturbo della migrazione neuronale
 C un disturbo della mielinizzazione
 D un disturbo dell'organizzazione neuronale
 E un disturbo della differenziazione neuronale
216. Tutti i seguenti segni/sintomi possono essere caratteristici della sindrome di Martin-Bell (X-fragile), tranne:
 A deficit cognitivo moderato
 B macroorchidismo
 C* atassia
 D turbe comportamentali
 E disturbi del linguaggio
217. Quale dei seguenti test valuta le funzioni cognitive?
 A MMPI
 B Favole di Duss
 C* WISC
 D CAT
 E TAT
218. A che età, nel bambino normale, inizia la produzione delle prime frasi di 3 parole?
 A* 24 mesi
 B 12 mesi
 C 2 anni
 D 6 anni
 E 3 anni
219. Il ritardo semplice del linguaggio
 A* generalmente è familiare
 B non è mai familiare
 C è una forma di balbuzie compensata.
 D è un disturbo secondario ad un trauma cranico
 E è un disturbo secondario ad un trauma psichico
220. Cosa è la paraplegia?
 A paralisi ai quattro arti
 B affezione del plesso solare
 C un disturbo oculare
 D deficit di un riflesso arcaico
 E* paralisi agli arti inferiori
221. La manovra di Gowers è caratteristica
 A Dell'emiparesi congenita
 B* Della distrofia muscolare di Duchenne
 C Della corea di Sydenham
 D Della miastenia gravis
 E Della miotonia di Steinert
222. Tutte le seguenti affermazioni su la distrofia muscolare di Duchenne sono corrette, tranne:
 A modo di trasmissione X-linked recessivo
 B dovuta ad una mutazione "nonsense"
 C* vi è un spiccato ritardo nella deambulazione
 D aumentati livelli di creatina fosfochinasi
 E Il segno di Gowers di solito si manifesta a circa 3 anni di vita
223. Tutti i seguenti segni sono indice di un danno del tratto piramidale, tranne:
 A La spasticità
 B Il segno di Babinski
 C L'iperreflessia
 D* La fascicolazione muscolare
 E L'atrofia muscolare
224. Quali delle seguenti caratterizza la Sindrome di Landau-Kneffer:
 A* disturbo del linguaggio di tipo afasico con crisi parziali

- B disturbo specifico del linguaggio
 C disprassia evolutiva
 D disturbo del comportamento con ritardo dell'intelligenza
 E variante meno grave della Lennox-Gastaut
225. Quali dei seguenti meglio definisce la malattia di Gilles de la Tourette?
 A un disturbo del comportamento caratterizzato da iperattività.
 B* una sindrome ticcosa con tics motori e fonemici.
 C una sindrome epilettica.
 D un disturbo del comportamento caratterizzato da comportamenti aggressivi.
 E un tipo di balbuzie.
226. L'ipotiroidismo congenito si diagnostica con:
 A test di sviluppo neuromotorio
 B* prelievo ematico
 C RMN
 D EEG
 E ecografia cerebrale
227. Un quadro di emiplegia congenita si rende precocemente manifesto come:
 A* asimmetria nell'utilizzo dell'arto superiore
 B ipotonia muscolare
 C riflessi osteotendinei simmetrici
 D ritardo nell'acquisizione della stazione eretta
 E andatura falciante
228. Quale tra i seguenti farmaci è considerato un neurolettico?
 A metilfenidato
 B imipramina
 C* clorpromazina
 D tranilcipromina
 E citalopram
229. Quale segno è caratteristico dell'autismo infantile?
 A Fobie
 B Circonferenza cranica maggiore del 90° centile
 C* Comportamenti ripetitivi e ritualistici
 D Autoaggressività
 E Depressione
230. Il ritardo psicomotorio semplice può essere causato:
 A da fattori genetici
 B da fattori lesionali
 C da fattori ambientali
 D* da tutte e tre le risposte riportate
 E da nessuno delle tre risposte riportate
231. I segni di allarme precoci per un disturbo pervasivo dello sviluppo sono tutti i seguenti, tranne:
 A alterazioni della capacità di comunicazione
 B alterazioni della interazione sociale
 C repertorio ristretto ripetitivo e stereotipato dei comportamenti
 D* allucinazioni e deliri
 E assenza dei comuni interessi
232. Nel linguaggio lo sviluppo fonologico riguarda
 A la capacità di discriminare le figure geometriche
 B la capacità di coordinazione oculo-manuale
 C* la capacità di riconoscere e di produrre suoni della propria comunità linguistica
 D la capacità di rappresentazione spaziale
 E la capacità di riconoscere le persone
233. In un'epilessia idiopatica frequentemente:
 A* è presente una familiarità positiva per epilessia
 B non è presente una familiarità positiva per epilessia
 C è presente il dato anamnestico di normalità psichica prima dell'esordio dell'epilessia
 D è possibile individuare un fattore scatenante
 E l'evoluzione è maligna
234. Per R.A. Spitz la depressione anaclitica è:
 A il deficit dell'immagine del Sé
 B* la risposta del bambino a cure ambientali carenti e a privazione affettiva
 C lo stato psichico che induce al suicidio
 D la risposta ad un rimprovero
 E il risultato di un falso Sé
235. Il bambino con sviluppo psicomotorio regolare normalmente a settemesi è in grado di fare tutte le seguenti, tranne:
 A sedersi da solo
 B* cerca un oggetto nascosto
 C trasferisce oggetti da una mano all'altra
 D allunga l'uno o l'altro braccio per afferrare oggetti
 E mantiene da solo il biberon
236. L'approccio psicogenetico alle psicosi dell'infanzia considera:
 A* il distacco dalla realtà, conseguenza di un deficit dei confini dell'Io
 B l'anomalia relativa ad un'ipertrofia dell'Io
 C l'assenza di meccanismi di difesa
 D l'organizzazione di un falso Sé
 E l'assenza di un oggetto transizionale
237. Quali dei seguenti riflessi non è presente alla nascita nel neonato a termine?
 A riflesso di Moro
 B riflesso tonico asimmetrico del collo
 C* riflesso del paracadute
 D riflesso di prensione plantare
 E riflesso di prensione palmare
238. I disturbi del sonno più frequenti nella prima infanzia sono:
 A Le crisi miocloniche
 B Il sonnambulismo
 C* Il pavor nocturnus
 D Le alterazioni della fase REM
 E Le apnee in sonno
239. A quale delle seguenti età inizia a svilupparsi il gioco simbolico?
 A* tra i 14 e 18 mesi
 B dopo i 6 anni
 C tra i 6 e 10 mesi
 D tra i 3 e 4 anni
 E tra i 2 e 3 anni
240. La comprensione del linguaggio verbale nel bambino di 2 anni :
 A* è maggiore delle sue capacità di espressione verbale
 B è minore delle sue capacità di espressione verbale
 C è analoga alle sue capacità di espressione verbale
 D è direttamente proporzionale alle sue competenze motorie
 E è inversamente proporzionale alle sue competenze motorie
241. Tutti i seguenti sintomi/segni sono generalmente associati ad una lesione del cervelletto, tranne
 A Adiadococinesia
 B Ipotonia muscolare
 C Dismetria del gesto
 D* Tremore a riposo
 E Atassia del tronco
242. Quale è la caratteristica principale del disturbo d'ansia da separazione?
 A l'incapacità del bambino a star solo.
 B* l'estrema incapacità a separarsi dalle figure di riferimento.
 C l'estrema difficoltà a separarsi dai propri oggetti.
 D la difficoltà dei genitori a permettere al figlio di fare esperienze senza di loro.
 E l'ansia reattiva alla separazione dei genitori.
243. Quale delle seguenti meglio caratterizza la sindrome di Asperger:
 A è un sottotipo della schizofrenia
 B* è un disturbo generalizzato dello sviluppo in assenza di ritardo del linguaggio clinicamente significativo
 C è un disturbo specifico del linguaggio
 D è un disturbo di personalità
 E è un disturbo della condotta
244. Tutti i seguenti sintomi/segni sono presenti nella sindrome di Prader-Willy, tranne:
 A bassa statura
 B* idrocefalo
 C ipogonadismo
 D obesità
 E ritardo mentale
245. Quale tra i seguenti fattori familiari aumenta il rischio di disturbo della condotta?
 A Benessere economico

- B Aspettative dei genitori troppo elevate
 C* Litigi intensi tra genitori
 D Madre lavoratrice
 E Essere unicogenito
246. I disturbi specifici di apprendimento:
 A* compaiono in soggetti con livello intellettivo nei limiti di norma
 B si associano all'insufficienza mentale
 C sono specificatamente correlati ad altre patologie
 D riguardano specificatamente certe popolazioni, es. gli extracomunitari
 E sono specificatamente collegati alla classe frequentata
247. Quale tra i seguenti fattori aumenta il rischio di disturbo della condotta?
 A QI maggiore di 100
 B Depressione
 C* Iperattività
 D Divezzamento dopo i 12 mesi
 E Disturbi specifici dell'apprendimento
248. Quali di questi riflessi non è un riflesso arcaico:
 A* Rotuleo
 B Riflesso di Moro
 C Prensione palmare
 D Marcia automatica
 E Suzione
249. Cos'è la depressione anaclitica?
 A depressione della puerpera
 B depressione da intossicazione
 C depressione da privazione sensoriale
 D depressione reattiva alla bocciatura
 E* una forma di depressione precoce dopo separazione dalla madre
250. Il Disturbo PostTraumatico da Stress non compare se non in soggetti debilitati e predisposti.
 A Vero;
 B Vero, ma non riguarda i minori di diciotto anni di età;
 C Falso;
 D* Falso, dipende soprattutto dalla gravità dell'evento stressante;
 E Vero, è di solito conseguente a malattie fisiche.
251. La causa più frequente di paralisi cerebrale infantile è:
 A* Prematurità con anossia
 B Infezione materna prenatale
 C Processo infiammatorio postnatale
 D Parto distocico
 E Parto prolungato
252. La paralisi osterica del plesso brachiale superiore comporta un deficit prevalente del muscolo:
 A* deltoide
 B tricipite
 C trapezio
 D gran pettorale
 E pronatore rotondo
253. Quale delle seguenti anomalie è provocata dalla saldatura precoce della sutura sagittale?
 A Turricefalia
 B Platicefalia
 C* Scafocefalia
 D Brachicefalia
 E Macrocefalia
254. Tutte le seguenti affermazioni sulla Panencefalite sclerosante subacuta sono errate, eccetto:
 A compare durante la fase acuta della rosolia
 B è una tipica complicanza della varicella
 C esordisce classicamente con prevalenza di sintomi motori
 D ha una prognosi benigna
 E* nel liquor si riscontrano elevati livelli di anticorpi antimorbillo
255. Il Valproato di Na è un farmaco:
 A antienuretico
 B antidiarroico
 C antiipertensivo
 D* antiepilettico
 E non è un farmaco
256. I tests di screening attualmente più impiegati per la diagnosi del disturbo autistico sono:
 A I potenziali evocati
 B L'esame audiometrico
 C* I tests neurocomportamentali
 D I tests di personalità
 E L'e.e.g
257. La sclerosi a placche
 A è una malattia che interessa solo l'età adulta
 B* è un'affezione degenerativa del SNC, in particolare della sostanza bianca
 C è un indurimento cutaneo a guisa di placche
 D è una malattia acquisita da puntura di zecca
 E è un irrigidimento muscolare segmentario
258. Quale affermazione è vera nel disturbo della condotta?
 A L'esordio tardivo è un fattore prognostico negativo
 B È più spesso associato all'ansia che alla depressione
 C* Vi è tendenza ad interpretare le azioni dei pari come ostili
 D È più comune nelle femmine sotto i 7 anni.
 E I genitori sono iperprotettivi
259. Tutti i seguenti farmaci fanno parte della categoria degli antidepressivi, tranne:
 A* risperidone
 B triciclici
 C SSRI
 D anti-MAO
 E moclobemide
260. E' una tecnica di attivazione dell'elettroencefalogramma
 A* l'iperpnea
 B La somministrazione di neurolettici
 C L'infusione ev di benzodiazepine
 D Il calcolo mentale
 E La manovra di Valsalva
261. Alle scale Wechsler un QI verbale molto basso rispetto al QI di performance suggerisce un
 A Ritardo mentale
 B* Disturbo del linguaggio
 C Disturbo grafico-spaziale
 D Deficit funzioni frontali
 E Deficit mnesico
262. Il disturbo bipolare da cosa è caratterizzato?
 A da una particolare difficoltà a gestire i rapporti con le figure genitoriali.
 B* da un'alternanza di episodi maniacali ed episodi depressivi.
 C da una sindrome con cefalea pulsante preceduta da scotomi.
 D da un'alternanza di episodi anoressici e bulimici.
 E da un disturbo percettivo.
263. Che cos'è l'encopresi?
 A Incontinenza urinaria
 B* Incontinenza fecale
 C Manipolazione ludica delle feci
 D Minzione involontaria
 E Stipsi psicogenetica
264. Quale caratteristica è comune nella sindrome di Asperger?
 A Assenza del linguaggio in età prescolare
 B Enuresi notturna
 C* Interessi circoscritti
 D Condotte iperfagiche
 E Balbuzie
265. L'andatura falciante è riscontrabile nei pazienti
 A* emiplegici
 B miopatici
 C isterici
 D distonici
 E psicotici
266. Il deficit dei muscoli del cingolo pelvico è messo in evidenza da:
 A* andatura anserina
 B difficoltà nell'andatura sui calcagni

- C difficoltà a scendere le scale
D lordosi lombare
E difficoltà nell'andatura in punta di piedi
267. L'ansia è:
A una paura legata ad un oggetto o situazione precisi
B* un sentimento penoso legato all'attesa di una minaccia imprevedibile
C un atteggiamento ipocondriaco
D un atteggiamento narcisistico
E un disturbo dell'identità
268. Il termine borderline indica:
A un quadro di insufficienza mentale grave
B* un'affezione psicopatologica limite
C un comportamento limite
D un quadro psicotico
E un quadro nevrotico
269. La malattia di Kugelberg Welander è causata da
A* Degenerazione delle corna anteriori del midollo spinale
B Lesione tossica del II motoneurone
C Degenerazione assonale
D Patologia infettiva del midollo
E Lesione traumatica radicolare
270. La Sindrome di Rett:
A* Rientra tra i Disturbi Generalizzati dello Sviluppo.
B Interessa maschi e femmine con un rapporto di 4:1.
C È presente, fin dai primi mesi di vita, ritardo dello sviluppo psicomotorio.
D È trasmessa con modalità AD
E I soggetti affetti, presentano microcefalia alla nascita.
271. Quali sono i gruppi di fattori associati alla dislessiadisgrafia:
A* ritardo del linguaggio, alterazioni della lateralizzazione, alterazione dell'organizzazione spaziotemporale;
B sofferenza cerebrale, alterazioni percettive, equilibrio psicoaffettivo;
C personalità del bambino, ambiente familiare, ritardo del linguaggio;
D impaccio nella motricità volontaria, sincinesie, paratonie;
E insufficienza mentale, psicosi, nevrosi
272. Il periodo di latenza dello sviluppo psicosessuale coincide con:
A Primo anno di vita
B* Periodo tra 6 e 10 anni
C Climaterio
D Adolescenza
E Periodo tra 11 e 14 anni
273. La tendenza ad idealizzare dell'adolescente:
A è frutto del bisogno di opposizione all'adulto;
B* è una tappa obbligata nella trasformazione degli ideali e dei valori;
C è espressione comunque di disagio psichico;
D è una reazione specifica a certe forme di frustrazione;
E non riguarda l'adolescente.
274. La dislessia evolutiva è:
A una difficoltà di lettura in un soggetto con ritardo mentale
B* una difficoltà di lettura in un soggetto con intelligenza, vista e udito normali
C una difficoltà di linguaggio
D una difficoltà di lettura in un soggetto con importanti disturbi visivi
E una difficoltà nell'articolazione della parola
275. Con la sigla ADHD si indica
A L'associazione tra disturbo emicranico e alterazione della coagulazione ematica
B* Quadro clinico caratterizzato da iperattività e disturbo dell'attenzione
C Una particolare forma di emicrisi dx
D Una particolare forma di emicrania familiare
E Una malformazione vascolare cerebrale
276. Nella distrofia di Duchenne è caratteristica la pseudo-ipertrofia:
A dei muscoli dorsali
B* dei muscoli surali
C dei muscoli glutei
D dei muscoli deltoidi
E dei muscoli pettorali
277. Il delirio è:
A* un disturbo del contenuto del pensiero
B sempre frammentato e bizzarro
C un disturbo della forma del pensiero
D sempre organizzato e ben strutturato
E un disturbo della percezione
278. Le cause dei disturbi specifici dell'apprendimento sono:
A* familiari-idiopatiche
B correlate al ritardo mentale
C da privazione culturale
D da danno cerebrale
E da disordine psicopatologico
279. Quale dei seguenti riflessi non è considerato un riflesso arcaico?
A Riflesso di Moro
B Riflesso di Branco-Lefèvre
C Riflesso dei punti cardinali
D* Riflesso laterale di difesa
E Riflesso di incurvamento del tronco
280. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il mutismo selettivo, è corretta?
A È più frequente nei maschi
B Riguarda solo i bambini piccoli
C* È spesso associato ad ansia sociale
D Riguarda bambini con svantaggio socioculturale
E Ha una prognosi positiva
281. Nel disturbo schizofrenico si possono riscontrare tutte le seguenti manifestazioni, tranne:
A presenza di allucinazioni
B fuga delle idee
C presenza di deliri
D alogia
E* "assenze"
282. Non fanno parte delle parasonnie:
A* Difficoltà di addormentamento
B Sonnambulismo
C Bruxismo
D Incubi notturni
E Enuresi
283. Qual'è l'essenziale differenza tra nevrosi e psicosi?
A La minore gravità delle seconde
B* La buona integrazione dell'Io nelle prime
C La buona integrazione dell'Io nelle seconde
D La notevole presenza di ansia nelle prime
E La compresenza di sintomi psichici e somatici nelle seconde
284. La fobia della scuola è dovuta:
A a rifiuto delle figure genitoriali
B a rapporti conflittuali con gli insegnanti
C ad iperattività del bambino
D* ad ansia o angoscia di separazione
E a deficit intellettivi
285. L'abuso all'infanzia è un fenomeno che interessa trasversalmente tutte le classi sociali.
A Vero, non vi è alcuna correlazione;
B Falso, è frequente solo in alcune popolazioni;
C* Vero, anche se le determinanti socioambientali sono importanti;
D Falso, riguarda essenzialmente le classi sociali più svantaggiate;
E Falso, riguarda di più i ceti privilegiati.
286. Tutte le seguenti affermazioni sono corrette, tranne:
A L'anoressia insorge anche nel lattante
B L'anoressia insorge anche nel bambino
C L'anoressia insorge anche nel maschio
D L'anoressia può manifestarsi anche con abbuffate
E* L'anoressia insorge solo nelle femmine
287. Nella distrofia muscolare di Duchenne, il valore della CPK:
A non è correlato al decorso clinico della malattia
B è approssimativamente costante lungo il decorso della malattia
C è aumentato quando l'ipostenia diventa grave

- D* è notevolmente elevato prima che l'ipostenia sia clinicamente manifesta
 E è notevolmente elevato solo negli stadi più avanzati della malattia
288. L'epilessia Piccolo Male è caratterizzata da:
 A crisi con dolori addominali e fastidio epigastrico
 B crisi di caduta a terra
 C* crisi generalizzate con arresto dell'attività e sguardo fisso
 D crisi di perdita del contatto con l'ambiente e mioclonie brusche
 E crisi motorie focali secondariamente generalizzate
289. L'infezione rubeolica durante la gravidanza può provocare
 A* sordità
 B analgesia
 C disturbi gastrici
 D piede equino
 E macrocrania
290. Quale delle seguenti forme di epilessia generalizzata non è idiopatica?
 A* Sindrome di West
 B Epilessia con crisi grande male al risveglio
 C Epilessia tipo assenza
 D Epilessia temporale secondariamente generalizzata
 E Epilessia mioclonica benigna dell'infanzia
291. Le Facomatosi sono:
 A affezioni coinvolgenti il sistema nervoso centrale e altri organi e tessuti di origine mesodermica
 B* affezioni coinvolgenti il sistema nervoso centrale e altri organi e tessuti di origine ectodermica
 C affezioni coinvolgenti il sistema nervoso centrale e altri organi e tessuti di origine endodermica
 D affezioni coinvolgenti il sistema nervoso centrale e altri organi e tessuti di origine ecto e mesodermica
 E affezioni coinvolgenti il sistema nervoso centrale e altri organi e tessuti di origine endo e mesodermica
292. Nel sonno REM si verificano
 A Risveglio ed euforia
 B Ipertono muscolare e scialorrea
 C* Movimenti oculari rapidi e atonia muscolare
 D Paralisi transitorie dei muscoli oculari estrinseci
 E Dispnea e acufeni
293. L'epilessia mioclonica progressiva può essere dovuta a quale delle seguenti condizioni?
 A schizencefalia
 B sclerosi tuberosa
 C encefalite acuta
 D* ceroidolipofuscinosi
 E encefalopatia anossico-ischemica
294. L'atteggiamento normale del neonato in posizione supina è caratterizzato da:
 A* atteggiamento in flessione degli arti e capo sulla linea mediana o con appoggio occipito-parietale
 B completo rilasciamento muscolare con aspetto a rana rovesciata
 C atteggiamento in flessione degli arti superiori e in estensione degli arti inferiori
 D atteggiamento in estensione dei 4 arti
 E atteggiamento in flessione degli arti inferiori ed in estensione degli arti superiori
295. La manovra del foulard valuta:
 A il tono muscolare attivo degli arti superiori
 B il tono muscolare passivo degli arti inferiori
 C* il tono muscolare passivo degli arti superiori
 D la persistenza patologica di riflessi arcaici
 E la competenza alla postura seduta
296. Tutte le seguenti affermazioni sulla nevrosi sono corrette, tranne:
 A* non coscienza della patologicità dei disturbi
 B presenza di disturbi del comportamento non associati a deterioramento della personalità nel suo complesso
 C ruolo determinante di fattori psicologici nella patogenesi
 D mantenimento del contatto con la realtà esterna
 E presenza di sofferenza psichica per lo più sotto forma di angoscia
297. Il rischio di suicidio è maggiore nella:
 A Epilessia
- B* Psicosi maniaco-depressiva
 C Schizofrenia
 D Neurosi ossessiva
 E Isteria
298. Quale tra le seguenti manifestazioni si annovera tra le sindromi periodiche?
 A lipotimia
 B spasmi affettivi
 C* cefalea
 D epilessia
 E torcicollo congenito
299. La prova indice-naso ci permette di valutare:
 A forza
 B tono
 C* coordinazione
 D equilibrio
 E sensibilità
300. Tra quale delle seguenti range di età, nel bambino nato a termine, compare l'anticipazione del capo nella manovra di trazione?
 A 1 e 2 mesi
 B 2 e 3 mesi
 C* 4 e 6 mesi
 D 6 e 8 mesi
 E 8 e 10 mesi
301. Tutti i seguenti sintomi sono considerati tipici dell'ipertensione endocranica, tranne
 A cefalea
 B bradicardia
 C vomito
 D* parestesie al volto
 E turbe della vigilanza
302. Il disturbo di ansia di separazione:
 A Spesso evolve in un disturbo da conversione
 B Spesso è associata a mutismo selettivo
 C* E' una causa comune di rifiuto scolastico
 D E' principalmente un disturbo dell'età prescolare
 E Non si associa mai a depressione
303. Quale tra i seguenti sintomi non si riscontra nelle neuropatie:
 A ipotonia muscolare
 B ipotrofia muscolare
 C riduzione dei riflessi osteotendinei
 D* ipertonìa muscolare
 E deficit di forza
304. Quale dei seguenti agenti infettivi può essere responsabile di una condizione di encefalopatia infantile non evolutiva?
 A* toxoplasma
 B virus del morbillo
 C rotavirus
 D streptococco B emolitico
 E candida albicans
305. Una ipotonia muscolare generalmente consegue ad un danno di tutte queste strutture, tranne
 A Il cervelletto
 B Le corna anteriori del midollo
 C Il nervo periferico
 D* Il talamo
 E Il secondo motoneurone
306. Il maltrattamento nell'infanzia comporta:
 A frequenti somatizzazioni
 B ritardi di sviluppo
 C passività
 D ipervigilanza
 E* tutte le risposte riportate
307. Nella malattia di Werdnig-Hoffmann la deambulazione
 A* non viene mai acquisita
 B viene acquisita in epoca normale
 C viene acquisita dopo i 18 mesi
 D viene acquisita dopo i 2 anni
 E viene acquisita dopo i 4 anni

308. L'autismo infantile fa parte:
- A delle nevrosi
 - B* dei disturbi generalizzati dello sviluppo
 - C dei disturbi dell'umore
 - D dei disturbi dell'apprendimento
 - E dei deficit intellettivi
309. Il processo dell'apprendimento, si attua mediante:
- A La costruzione di nuove strutture di conoscenza.
 - B Selezione ed accumulo di informazioni ambientali.
 - C Selezione ed immagazzinamento di informazioni ambientali.
 - D Generazione di nuove connessioni sinaptiche in rapporto alle nuove esperienze.
 - E* Tutte le risposte riportate
310. L'enuresi viene definita primaria :
- A* se il bambino non è mai stato completamente continente
 - B se il bambino ha presentato un periodo di almeno 6 mesi in cui è stato continente
 - C quando non è stata identificata una causa
 - D quando non è associata ad altre patologie
 - E quando si manifesta nel primo anno di vita
311. Quale delle seguenti fa parte delle facomatosi?
- A malformazioni di Arnold-Chiari
 - B* sclerosi tuberosa
 - C sindrome di Dandy-Walker
 - D sindrome di Prader-Willi
 - E amaurosi di Leber
312. Il test al Tensilon è diagnostico per
- A Distrofia muscolare di Becker
 - B Amiotrofia spinale
 - C* Miastenia gravis
 - D nessuna di queste patologie
 - E Malattia di Emery-Dreyfuss
313. Nel ritardo psicomotorio di tipo disarmonico:
- A tutte le aree di sviluppo sono interessate in maniera equilibrata
 - B il ritardo interessa solo l'area del linguaggio
 - C il ritardo interessa solo l'area della socialità
 - D* una o più aree dello sviluppo sono meno evolute rispetto alle altre
 - E il ritardo interessa solo l'area motoria
314. Il disturbo neurologico più rilevante della spina bifida è:
- A l'emiparesi
 - B* la paraplegia flaccida
 - C la distonia
 - D la miotonia
 - E il tremore intenzionale
315. Tra i meccanismi neurobiologici del disturbo autistico, quali dei seguenti costituiscono fattori di rischio?
- A Le convulsioni neonatali
 - B La toxoplasmosi congenita
 - C* Le sindromi malformative o metaboliche congenite
 - D La microcefalia familiare
 - E Le sordità
316. Quale dei seguenti tipi di epilessia è considerata benigna?
- A* Epilessia rolandica con punte centro - temporali
 - B Sindrome di Lennox-Gastaut
 - C Epilessia parziale continua progressiva dell'infanzia
 - D Epilessia con crisi mioclonico-astatiche
 - E Sindrome di West
317. La fobia scolare è spesso associata a:
- A* Depressione più o meno mascherata
 - B Assenza di aggressività
 - C Buon processo di separazione-identificazione
 - D Patologia genetica
 - E Psicosi materna
318. Quale dei seguenti disturbi è più comune nelle femmine rispetto ai maschi?
- A Sindrome da deficit di attenzione e iperattività
 - B Suicidio realizzato
 - C* Anoressia nervosa
 - D Delinquenza giovanile
 - E Ritardo del linguaggio
319. La Distrofia Muscolare di Duchenne inizia ad evidenziarsi clinicamente:
- A alla nascita
 - B* in età prescolare
 - C in età scolare
 - D in pubertà
 - E in adolescenza
320. A che età sono evocabili la fissazione e l'inseguimento visivo in un bambino con normale sviluppo psico-motorio?
- A* dai primi giorni di vita
 - B dopo il primo mese di vita
 - C dopo i tre mesi di vita
 - D dopo i sei mesi di vita
 - E dopo il primo anno
321. La vittima di abuso sessuale è sempre reattiva e spaventata dal suo persecutore.
- A Vero, è uno degli elementi importanti per la diagnosi;
 - B E' quasi sempre vero;
 - C Non è mai così;
 - D* Non sempre è vero, soprattutto nei casi di abuso intrafamigliare;
 - E Non è un elemento utile per la valutazione.
322. Quale delle seguenti è la comorbidità che si associa più frequentemente al Disturbo Antisociale di Personalità?
- A La schizofrenia;
 - B La psicosi maniaco-depressiva;
 - C L'oligofrenia;
 - D* Il Disturbo dell'umore di gravità variabile;
 - E L'abuso di sostanze.
323. Quale tra i seguenti disturbi non rientra tra le manifestazioni nevrotiche?
- A fobie
 - B ossessioni
 - C compulsioni
 - D* mericismo
 - E ansia
324. Quali sono i rischi evolutivi della sindrome da iperattività/impulsività e deficit attentivo ?
- A un ritardo mentale
 - B* aumentata incidenza di disturbi della condotta e di farmacodipendenza
 - C demenza di Alzheimer
 - D il disturbo si risolve spontaneamente senza conseguenze
 - E una sindrome di incontinenza
325. L'utilizzazione su Internet di immagini pornografiche che coinvolgono bambini può essere definita come una forma di abuso sessuale.
- A Falso, una cosa è l'immagine e una cosa diversa è l'abuso;
 - B Falso, la pornografia non è reato se diffusa tra adulti;
 - C* Vero, è comunque uno sfruttamento indebito dell'infanzia;
 - D E' un reato, ma non rientra nella definizione di abuso;
 - E Non è un reato, ma ciononostante è un abuso.
326. Quale di queste alterazioni del comportamento impone un approfondimento per la diagnosi di disturbo autistico:
- A Disturbo dell'apprendimento
 - B Disturbo del sonno
 - C* L'isolamento e il gioco stereotipato e ripetitivo
 - D Aggressività
 - E L'attaccamento materno
327. Il disturbo oppositivo-provocatorio comporta:
- A* ostinazione ed opposività al convincimento
 - B persistente sensazione di pericolo per i parenti
 - C difficoltà del sonno di notevole entità
 - D allucinazioni
 - E deliri
328. La sigla D.P.S. indica:
- A Deficit di Prolattina Secondario
 - B* Disturbi Pervasivi di Sviluppo
 - C Disturbi Primitivi del Sistema nervoso centrale
 - D Deficit Primario Serotoninergico

- E Sindrome da Deficit Proteico
329. Il riflesso tonico asimmetrico del collo in un lattante di 8 mesi è indice di
 A* lesione cerebrale
 B malattia muscolare
 C torcicollo parossistico benigno del lattante
 D un disturbo ortopedico
 E una postura antalgica
330. Qual'è la triade che caratterizza la sindrome di Lennox-Gastaut?
 A crisi epilettiche, ipsaritmia all'EEG e afasia
 B crisi epilettiche, ipsaritmia all'EEG e ritardo mentale
 C crisi epilettiche, punta-onda lenta all'EEG e atassia
 D* crisi epilettiche, punta-onda lenta all'EEG e ritardo mentale
 E crisi miocloniche, polipunte all'EEG e spasticità
331. La neurofibromatosi tipo 1 è caratterizzata da:
 A Ipopigmentazione cutanea
 B Convulsioni parziali
 C* Associazione di neurofibromi e anomalie pigmentarie
 D Ritardo mentale
 E Sindrome paraneoplastica
332. Quale di questi disturbi è tipico di una sindrome extrapiramidale (da lesione delle vie extrapiramidali)?
 A* Coreoatetosi
 B spasticità
 C Convulsioni epilettiche
 D Cecità
 E Insufficienza mentale
333. Nella sclerosi tuberosa, quale delle seguenti manifestazioni caratterizza il fenotipo epilettico più frequente all'esordio della malattia?
 A spasmi infantili ed ipsaritmia
 B* crisi parziali ed anomalie elettroencefalografiche focali/multifocali
 C crisi generalizzate ed anomalie elettroencefalografiche generalizzate
 D assenze
 E nessuna delle risposte riportate
334. Quale delle seguenti affezioni può determinare ipotonia del lattante?
 A Corea di Sydenham
 B Malattia di Friedreich
 C* Malattia di Werdnig-Hoffmann
 D Distrofia di Duchenne
 E Morbo di Wilson
335. Quale delle seguenti caratterizza l'anoressia nervosa?
 A Inappetenza con astenia
 B* Paura intensa di acquistare peso o di essere grassi anche se sottopeso
 C Sensazione di malessere fisico e umore depresso
 D l'incidenza corrisponde a 1 su 5000 femmine tra i 16 e 18 anni
 E tachicardia
336. Quale è la lesione più frequentemente associata alla diplegia spastica?
 A Emorragia periventricolare
 B* Leucomalacia periventricolare
 C Infarto dell'arteria cerebrale media
 D Emorragia cerebellare
 E Infarto parasagittale
337. Quale dei seguenti non è un segno di spasticità?
 A Clono del piede o della rotula
 B Babinsky
 C Paralisi o paresi
 D* Tremori
 E Iperono
338. Durante il sonno REM, quale dei seguenti fenomeni si verificano?
 A Ipotonia
 B I parametri vitali diventano irregolari
 C Il soggetto è facilmente risvegliabile
 D* Tutte e 3 le risposte riportate
 E Nessuna delle 3 risposte riportate
339. Il "piccolo male" (assenza) è una forma di epilessia:
 A* generalizzata idiopatica
 B parziale idiopatica
 C generalizzata sintomatica
 D parziale criptogenetica
 E parziale sintomatica
340. In quale delle seguenti sindromi epilettiche è maggiormente indicata la terapia ormonale con ACTH?
 A epilessia con punta-onda continue durante il sonno lento
 B epilessie miocloniche
 C* sindrome di West
 D epilessie con crisi generalizzate tonico-cloniche
 E epilessia a punte centro-temporali
341. Una emisezione trasversa midollare a livello di C5-C8 comporterà:
 A emiplegia spastica omolaterale
 B* paralisi flaccida all'arto superiore omolaterale e spastica a quello inferiore omolaterale
 C disturbi sfinterici
 D paraplegia spastica
 E emiplegia flaccida omolaterale
342. La sindrome dell'X-fragile comporta:
 A* ritardo mentale
 B deficit neuromuscolare
 C grave ipotonia alla nascita
 D ipotiroidismo
 E cariotipo xxy
343. Il tentativo di suicidio in adolescenza:
 A* è sempre un atto impulsivo che esprime un sottostante disagio psichico;
 B è una delle tante forme di agire tipiche dell'adolescenza;
 C è soltanto un atto dimostrativo volto a suscitare l'attenzione dell'ambiente;
 D è una tipica forma di esibizionismo dell'età;
 E è una forma di reazione di fronte ai fallimenti amorosi.
344. Nella diagnosi di miastenia è importante il:
 A Test con metilfenidato
 B Test con ergotamina
 C Test con clorpromazina
 D* Test con neostigmina
 E Test con piridossina
345. Indicare quale tra i seguenti è un sintomo nevrotico:
 A* Fobia
 B Tics
 C Enuresi
 D Delirio
 E Balbuzie
346. Qual'è il primo organizzatore secondo R.A. Spitz?
 A la lallazione
 B* il sorriso
 C il pianto
 D l'insonnia
 E la voracità
347. La marcia automatica
 A è un riflesso indicativo di patologia del motoneurone spinale
 B è un riflesso indicativo di patologia del lobo frontale
 C è un riflesso indicativo di patologia del sistema cerebellare
 D è una manifestazione epilettica
 E* è un riflesso arcaico che tende a scomparire già nel primo mese di vita
348. La risposta al riflesso dei punti cardinali è rappresentata da:
 A Suzione
 B* Rotazione del capo verso il lato stimolato
 C Estensione arto sup. controlaterale
 D Riflesso di aggrappamento
 E Preensione bilaterale
349. Quale delle seguenti affermazioni per ciò che riguarda le forme spastiche di PCI (Paralisi Cerebrali Infantili) è corretta?
 A* presentano un aumento del tono muscolare dei distretti interessati (ipertonici)
 B presentano riduzione del tono nei distretti interessati (ipotonici)
 C presentano frequenti movimenti involontari parassitici, con bruschi cambiamenti del tono muscolare
 D sono associate alla s. di West (spasmi in flessione)
 E sono legate ad una riabilitazione tardiva

350. Quale delle seguenti meglio definisce il significato di enuresi?

- A una continua perdita involontaria di urine
- B* la mancanza del controllo dello sfintere urinario dopo i quattro anni
- C la mancanza del controllo urinario prima del secondo anno di vita
- D un disturbo per cui i bambini perdono le urine in occasione di un'emozione
- E un disturbo della minzione legato ad un'infezione