



ANNO ACCADEMICO 2010/2011

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN

## GERIATRIA

1. Un fecaloma può essere associato alle seguenti condizioni tranne:
  - A Incontinenza urinaria
  - B Incontinenza fecale
  - C Confusione mentale
  - D\* Alcalosi metabolica
  - E Disidratazione
2. Quale delle seguenti condizioni può essere associata ad incontinenza urinaria da urgenza?
  - A Ictus
  - B Morbo di parkinson
  - C Demenza di Alzheimer
  - D\* Tutte le condizioni indicate
  - E Nessuna delle condizioni indicate
3. Quale dei seguenti parametri deve essere preso in considerazione nella valutazione della malnutrizione:
  - A La perdita di peso corporeo
  - B La concentrazione della albumina sierica
  - C La colesterolemia
  - D\* Tutti i parametri indicati
  - E Nessuno dei parametri indicati
4. Nella arterite a cellule giganti la VES è generalmente:
  - A Normale
  - B Aumentata tra 20 e 30 mm alla prima ora
  - C Aumentata tra 30 e 40 mm alla prima ora
  - D\* Aumentata fino a 80-100 mm alla prima ora
  - E Ridotta
5. Nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) vengono generalmente ricoverati soggetti:
  - A\* Gravemente disabili ed in condizioni di svantaggio sociale
  - B Lievemente disabili e con buon supporto familiare
  - C Autonomi
  - D Solo con grave demenza di Alzheimer
  - E Con problemi di povertà
6. La causa più frequente di delirium nel paziente anziano ospedalizzato è:
  - A Infarto cerebro-vascolare acuto
  - B Crisi ipertensiva
  - C Tumore del sistema nervoso centrale
  - D Insufficienza cardiaca
  - E\* Tossicità da farmaci
7. La forma di ipertensione arteriosa più caratteristica dell'anziano è:
  - A Ipertensione borderline
  - B Ipertensione maligna
  - C Ipertensione diastolica
  - D\* Ipertensione sistolica isolata
  - E Ipertensione sistolica associata
8. Una ortesi è:
  - A\* Un apparecchio applicato al corpo come correttivo funzionale
  - B Un sostituto di parti esterne mancanti del corpo
  - C Un sostegno utilizzabile nel cammino su percorsi difficoltosi
  - D Una protesi di organi interni
  - E Un tipo di protesi dentaria specifica per anziani
9. Rispetto al giovane, nell'anziano la risposta cardiaca all'esercizio fisico è caratterizzata da:
  - A Un maggiore aumento della frequenza cardiaca
  - B Un maggiore aumento della frazione di eiezione ventricolare sinistra
  - C Nessuna variazione del volume ventricolare sinistro
  - D Un minore aumento del volume del ventricolo sinistro
  - E\* Un maggiore incremento del volume del ventricolo sinistro (riserva di precarico)
10. Lo scompenso cardiaco nell'anziano:
  - A È più frequentemente da disfunzione ventricolare diastolica che sistolica
  - B Non risponde ai beta-bloccanti
  - C\* Può associarsi a deterioramento dello stato cognitivo
  - D È più frequente nel sesso maschile che nel femminile
  - E Non è causa di disabilità
11. In presenza di un picco monoclonale, che alla immunofissazione delle proteine sieriche risulti costituito da IgG, la diagnosi di certezza di mieloma richiede che:
  - A Le plasmacellule siano almeno il 5% della cellularità midollare
  - B\* Le plasmacellule siano almeno il 15% della cellularità midollare
  - C La plasmacellule midollari siano assenti
  - D La VES sia superiore a 40 mm alla prima ora
  - E Coesista anemia con Hb <10 gr/dl
12. Quale dei seguenti tipi di incontinenza urinaria persistente è nettamente più frequente nel sesso femminile?
  - A Da urgenza
  - B\* Da stress
  - C Da rigurgito
  - D Funzionale
  - E Mista
13. Un punteggio <21 al Mini Mental State Examination di Folstein fa porre diagnosi di:
  - A Normale livello cognitivo
  - B\* Decadimento cognitivo
  - C Demenza di Alzheimer
  - D Demenza multi-infartuale
  - E Sindrome depressiva maggiore
14. L'anemia da malattie croniche dell'anziano è generalmente:
  - A\* Normocromica normocitica
  - B Ipocromica microcitica
  - C Ipocromica macrocitica
  - D Può presentarsi in tutti e tre i modi citati
  - E Nessuna delle anemie citate
15. Quale dei seguenti test viene utilizzato nello screening dei disturbi dell'umore nell'anziano?
  - A Scala di Tinetti
  - B Scala di Hamilton
  - C Test di Rorshac
  - D Mini Mental State Examination
  - E\* Geriatric Depression Scale
16. Fattori di rischio per il suicidio sono tutti i seguenti, eccetto:
  - A età superiore ai 55 anni
  - B sesso maschile
  - C solitudine
  - D anamnesi familiare di suicidio
  - E\* anziani che vivono con i loro figli
17. Quale malattia oculare è più comune nella vecchiaia?
  - A\* cataratta
  - B glaucoma
  - C degenerazione maculare senile

- D retinopatia diabetica  
E retinopatia ipertensiva
18. Per l'afasia motoria valgono tutte le seguenti affermazioni tranne:  
A\* è compromessa la comprensione  
B è una afasia non fluente  
C è causata da una lesione dell'area di Broca  
D è caratterizzata dall'uso di frasi di una o due parole  
E può essere dovuta ad emorragia, infarto, neoplasia
19. Negli anziani con anemia sideropenica la somministrazione terapeutica di ferro per os provoca la normalizzazione dei valori emoglobinici in:  
A\* circa 6 settimane di terapia  
B circa 4 settimane di terapia  
C circa 15 giorni di terapia  
D già dopo 10 giorni di terapia  
E subito dopo l'inizio della terapia
20. Che cosa si intende per "Valutazione Multidimensionale" dell'anziano?  
A anamnesi accurata  
B anamnesi ed esame clinico  
C esame clinico con valutazione della vista e dell'udito  
D non è un procedimento utilizzato in geriatria  
E\* metodologia diagnostica che considera i diversi determinanti dello stato di salute
21. La terapia estrogenica postmenopausale si associa ad una frequenza aumentata di:  
A malattie della colecisti  
B carcinoma della mammella  
C carcinoma dell'endometrio  
D\* tutte le precedenti  
E nessuna delle precedenti
22. Sono sintomi ostruttivi di ipertrofia prostatica benigna tutti, tranne:  
A difficoltà nell'iniziare la minzione  
B riduzione della forza del flusso urinario  
C\* incontinenza da urgenza  
D gocciolio prolungato dopo minzione  
E ritenzione urinaria
23. Il dolore neuropatico può essere:  
A urente  
B associato a formicolio  
C associato a disestesie  
D cronico-parossistico  
E\* tutte
24. L'insorgenza della fibrillazione atriale in una stenosi mitralica può determinare:  
A schiocco di apertura della valvola  
B infarto miocardico  
C\* embolia arteriosa periferica ed ictus  
D endocardite batterica  
E soffio presistolico
25. Quale fra queste può essere causa di iponutrizione proteico-energetica nell'anziano?  
A xerostomia  
B disfagia  
C morbo di Addison  
D nessuna delle precedenti  
E\* tutte le precedenti
26. Nella malattia di Alzheimer l'acetilcolina è:  
A prodotta attraverso una via alternativa  
B aumentata  
C normale  
D\* ridotta  
E degradata dall'acetilcolinesterasi
27. Tra i sintomi e/o segni più frequenti dell'ipertiroidismo nell'anziano non vi è:  
A tachicardia  
B perdita di peso  
C astenia  
D diminuzione dell'appetito  
E\* sudorazione
28. Il dolore dell'ulcera gastrica va in diagnosi differenziale con il dolore:  
A di origine biliare  
B cardiaco  
C da cancro allo stomaco  
D da colecistite  
E\* tutti
29. Nell'anziano il rischio di cadute è dovuto a:  
A alterazioni vestibolari  
B alterazioni visive  
C alterazioni della propriocezione  
D fattori di situazione  
E\* tutte le precedenti
30. Tra le seguenti, qual'è l'anomalia elettrocardiografica di maggior riscontro negli anziani?  
A ipertrofia ventricolare sinistra  
B fibrillazione atriale  
C isolata anomalia di ST-T  
D blocco atrioventricolare di I grado  
E\* disturbi di conduzione intraventricolare
31. Nell'anziano il Morbo di Hodgkin ha prognosi più sfavorevole che nel giovane. Quale ne è la causa?  
A istotipo più aggressivo  
B età avanzata  
C presenza di patologie concomitanti  
D intolleranza a radio-chemioterapia  
E\* tutte le precedenti
32. Modificazioni della visione correlate all'età sono:  
A alterata discriminazione dei colori  
B diminuzione di ampiezza del campo visivo  
C cambiamenti dell'umor vitreo  
D sensazione di corpo estraneo  
E\* tutti i precedenti
33. I deficit neurologici a focolaio, in caso di TIA, debbono risolversi, per definizione, entro:  
A 2 settimane  
B 1 settimana  
C 12 ore  
D\* 24 ore  
E 1 mese
34. L'assorbimento intestinale del calcio nell'anziano è:  
A\* generalmente ridotto  
B normale  
C aumentato  
D assente  
E ridotto solo in caso di infiammazione intestinale
35. Con l'invecchiamento la massa magra:  
A\* si riduce  
B aumenta  
C resta invariata  
D si altera  
E aumenta solo nei soggetti sedentari
36. Farmaci che contribuiscono al rischio di caduta sono:  
A farmaci psicotropi  
B anti-ipertensivi vasodilatatori  
C diuretici  
D antiaritmici  
E\* tutti
37. Con l'avanzare dell'età, nel soggetto non cardiopatico la frequenza cardiaca tende a:  
A diminuire a riposo  
B aumentare a riposo  
C aumentare durante il sonno  
D diminuire sotto sforzo  
E\* rimanere invariata a riposo
38. Quali disturbi sono indice di una ridotta perfusione cerebrale?  
A vertigini  
B episodi sincopali  
C sintomi neurologici focali

- D nessuno dei precedenti  
E\* tutti i precedenti
39. Qual'è fra le seguenti la più comune alterazione elettrocardiografica riscontrabile nell'anziano?  
A\* PR lungo  
B PR corto  
C QT lungo  
D ST sottoslivellato  
E T invertite
40. I germi responsabili di ulcere da pressione infette sono:  
A cocchi gram-positivi  
B aerobi gram-negativi  
C anaerobi  
D anaerobi gram-negativi  
E\* tutti
41. Sono tutti fattori di rischio abituali per le infezioni delle vie urinarie nell'anziano, eccetto  
A uretrite atrofica  
B prostatite batterica cronica  
C uso di cateteri  
D\* sesso maschile  
E calcoli genitourinari
42. Quali tra i seguenti sono sintomi e/o segni precoci di ictus?  
A improvviso intorpidimento e/o astenia di un lato del corpo  
B riduzione improvvisa della vista  
C difficoltà del linguaggio  
D nessuna delle precedenti  
E\* tutte le precedenti
43. Nella prevenzione delle ulcere da pressione, le ciambelle:  
A dovrebbero essere usate sempre  
B\* riducono il flusso di sangue destinato alla cute in corrispondenza della parte centrale  
C non hanno effetti negativi sulle lesioni  
D aumentano il flusso di sangue  
E nessuna
44. Nell'anziano iperteso ed epatopatico è sconsigliato l'uso di :  
A beta-bloccanti  
B\* alfa-metil-dopa  
C clonidina  
D indapamide  
E nifedipina
45. Artralgie migranti possono essere determinate da:  
A metastasi ossee  
B\* sindrome paraneoplastica  
C artrite gottosa  
D artrosi  
E artrite reumatoide
46. Nell'anziano l'ipotiroidismo è più spesso di origine:  
A infiammatoria  
B malformativa  
C post-chirurgica  
D\* autoimmune  
E neoplastica
47. Nelle malattie diarroiche è importante evitare:  
A liquidi  
B\* nutrienti ad elevata osmolarità  
C proteine  
D amido  
E nessuno
48. Nelle fasi iniziali della demenza iniziale si osserva:  
A deficit di memoria di fissazione  
B deficit di memoria di evocazione  
C falsi riconoscimenti  
D\* deficit di memoria a breve termine  
E nessuna delle precedenti
49. Tipico segno clinico del morbo di Parkinson è:  
A\* la rigidità "a ruota dentata"  
B l'ipertono spastico  
C il segno di Lasegue  
D il segno di Bell  
E il segno di Romberg
50. Con quale farmaco antiepilettico la tossicità neurologica è meno frequente che con gli altri?  
A barbiturici  
B fenitoina  
C carbamazepina  
D\* valproato  
E nessuno
51. Le ulcere venose si manifestano con predilezione a livello del:  
A lato laterale dell'estremità distale degli arti inferiori  
B\* lato mediale dell'estremità distale degli arti inferiori  
C polpaccio  
D porzione antero-laterale degli arti inferiori  
E estremità distale degli arti inferiori
52. Sono cause possibili di parkinsonismo secondario:  
A encefalite virale  
B uso di antipsicotici  
C ipoparatiroidismo  
D\* tutte le precedenti  
E nessuna delle precedenti
53. L'attività sessuale nell'età avanzata è influenzata da:  
A diminuzione del desiderio sessuale  
B\* disponibilità di un partner sessualmente attivo  
C astinenza in gioventù  
D tutte le precedenti  
E nessuna delle precedenti
54. Qual'è la mortalità ad un anno da frattura del femore in soggetti anziani?  
A\* 12-20%  
B 20-25%  
C maggiore del 25%  
D inferiore al 5%  
E 5-10%
55. Quale delle seguenti è causa di incontinenza da urgenza nell'anziano?  
A\* iperattività del detrusore  
B incontinenza sfinterica  
C ostruzione dello sbocco vescicale  
D ipoattività del detrusore  
E tutte le precedenti
56. Quali tra queste sono le più importanti complicanze del diabete nell'anziano?  
A aterosclerosi  
B microangiopatia renale  
C microangiopatia retinica  
D neuropatia periferica  
E\* tutte le precedenti
57. Quale non rappresenta una complicanza dell'allettamento nell'anziano ?  
A piaghe da decubito  
B riassorbimento della matrice ossea  
C incontinenza urinaria  
D\* ipocalcemia  
E fecalomi
58. Le linee guida per lo screening del carcinoma mammario nelle donne anziane prevedono una mammografia:  
A mensile  
B ogni 5 anni  
C\* ogni 1-2 anni  
D ogni 6 mesi  
E ogni 10 anni
59. La terapia della BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva) degli anziani prevede:  
A astensione dal fumo  
B vaccinazione antiinfluenzale  
C broncodilatatori  
D ossigenoterapia a lungo termine

- E\* tutte le precedenti
60. Le neoplasie primitive del parenchima cerebrale nell'anziano sono prevalentemente costituite da:  
 A\* glioblastoma multiforme  
 B metastasi  
 C neurinoma  
 D angioma  
 E nessuno dei precedenti
61. L'astenia muscolare, quando si presenta nei pazienti anziani ipertiroidei, si manifesta soprattutto:  
 A\* alla muscolatura prossimale  
 B alla muscolatura distale  
 C a tutto il corpo  
 D al tronco  
 E agli arti inferiori
62. Quale dei seguenti farmaci può causare ginecomastia nell'anziano?  
 A spironolattone  
 B aloperidolo  
 C isoniazide  
 D cimetidina  
 E\* tutte le precedenti
63. Il dolore di origine muscolo-scheletrico può essere trattato con tutti i seguenti rimedi, tranne:  
 A FANS  
 B calore  
 C massaggi  
 D\* antidepressivi triciclici  
 E ultrasuoni
64. Quale condizione contribuisce allo sviluppo delle piaghe da decubito?  
 A compressione  
 B attrito  
 C frizione  
 D\* tutte le citate  
 E nessuna delle citate
65. Quale farmaco può interferire con la termodispersione nell'anziano?  
 A anticolinergici  
 B antiistaminici  
 C antiparkinsoniani  
 D antidepressivi  
 E\* tutte le precedenti
66. Qual'è la principale causa di malattia degli ultrasessantacinquenni?  
 A malattie cerebrovascolari  
 B neoplasie maligne  
 C malattia polmonare cronica  
 D\* cardiopatia  
 E diabete
67. Le immunoglobuline (IgG) sieriche nell'anziano sono:  
 A molto aumentate  
 B\* aumentate  
 C invariate  
 D diminuite  
 E molto diminuite
68. Qual'è l'osteopatia dell'anziano che può associarsi ad insufficienza cardiaca ad alta portata?  
 A\* malattia di Paget  
 B osteoporosi  
 C osteomalacia  
 D osteoartrosi  
 E osteosarcoma
69. L'intervento di aneurisma aortico dovrebbe essere proposto in base ad uno di questi criteri:  
 A diametro di 4-6 cm e aspettativa di vita superiore e/o uguale a 10 anni  
 B diametro maggiore di 6 cm  
 C aneurisma sintomatico  
 D aneurisma con diametro in rapido aumento  
 E\* tutte
70. Quale dei seguenti è un parametro diagnostico di disidratazione in età geriatrica?  
 A scarso turgore della cute  
 B occhi infossati  
 C lingua secca  
 D riduzione della pressione arteriosa in ortostatismo  
 E\* tutte le precedenti
71. L'ageusia è:  
 A mancanza di un organo  
 B\* mancanza del senso gustativo  
 C perdita dell'udito  
 D mancanza del coniuge  
 E perdita di un gene
72. L'aspettativa di vita alla nascita per gli uomini in Italia nel 1996 era:  
 A 70 anni  
 B 81 anni  
 C\* 76 anni  
 D 74 anni  
 E 72 anni
73. Quale tra i seguenti tumori del SNC è più frequente nell'età media e avanzata?  
 A intramidollari  
 B extramidollari  
 C intradurali  
 D extradurali  
 E\* metastatici
74. Qual'è la più frequente causa reversibile di calo ponderale nell'anziano?  
 A\* depressione del tono dell'umore  
 B povertà  
 C anoressia nervosa  
 D assunzione di farmaci  
 E alcolismo
75. Qual'è il reperto che consente di fare diagnosi di paralisi progressiva sopranucleare e non di Parkinson?  
 A bradicinesia  
 B rigidità  
 C\* alterazione dei movimenti oculari  
 D tremore  
 E risposta alla terapia con levodopa
76. Il morbo di Creutzfeldt-Jacob è una:  
 A mielopatia  
 B encefalopatia metabolica  
 C malattia cerebellare  
 D\* demenza ad eziologia infettiva  
 E malattia cerebrovascolare
77. L'eparina è una sostanza:  
 A mucopolisaccaridica, che agisce bloccando l'antitrombina III  
 B proteica che agisce legandosi all'antitrombina VI attivandola  
 C che agisce legandosi alla trombina disattivandola  
 D che blocca l'entrata del calcio, impedendo l'attivazione delle sostanze coagulanti calcio-dipendenti  
 E\* mucopolisaccaridica che attiva l'antitrombina III bloccando la trombina
78. Qual'è il farmaco di prima scelta nel ridurre l'incidenza di ictus, infarto miocardico e morte in pazienti con Attacco Ischemico Transitorio?  
 A dipiridamolo  
 B ticlopidina  
 C\* acido acetilsalicilico  
 D eperidina  
 E tutti
79. Individuare l'affermazione esatta:  
 A\* l'ulcera gastrica è una patologia soprattutto geriatrica  
 B l'ulcera duodenale è una patologia soprattutto geriatrica  
 C 2/3 di tutti i decessi per ulcera negli anziani è dovuto ad ulcera duodenale  
 D l'ulcera duodenale ha una sintomatologia grave negli anziani  
 E l'ulcera gastrica è quasi sempre sintomatica negli anziani
80. Rallentano il processo di riparazione delle ulcere da pressione:  
 A antibiotici per uso topico  
 B soluzioni ipoclorito  
 C acido acetico

- D acqua ossigenata  
E\* tutte le precedenti
81. La diarrea infiammatoria fra le persone anziane è più frequentemente causata da:  
A shigella  
B salmonella  
C\* clostridium difficile  
D staphylococcus aureus  
E escherichia coli
82. Nella popolazione anziana la malattia sistemica che può provocare una polineuropatia è:  
A diabete  
B disfunzione tiroidea  
C uremia  
D\* tutte  
E nessuna
83. Quale tra i seguenti farmaci non trova indicazione nell'asma acuto del paziente anziano aritmico?  
A ossigeno  
B broncodilatatori  
C cortisone  
D\* teofillina  
E anticolinergico
84. La "Malattia di Binswanger" si riferisce a:  
A riduzione settoriale del flusso ematico cerebrale (senza infarto)  
B\* lesioni ischemiche diffuse della sostanza bianca cerebrale periventricolare  
C infarto bilaterale degli ippocampi  
D infarti multipli  
E paralisi pseudo-bulbare
85. Nelle donne anziane il tipo di ernia più frequente è:  
A ombelicale  
B crurale  
C inguinale  
D\* inguinale e/o crurale  
E nessuna delle precedenti
86. La sindrome parkinsoniana può avere eziologia:  
A idiopatica  
B arteriosclerotica  
C post-infettiva  
D metabolica  
E\* tutte
87. L'ipertensione nell'anziano è di solito associata a:  
A normale funzionalità adrenergica  
B portata cardiaca normale o ridotta  
C ridotto volume plasmatico  
D grave aterosclerosi  
E\* tutte le precedenti
88. L'agente eziologico più frequentemente responsabile di vulvovaginite nella donna anziana diabetica è:  
A Trichomonas vaginalis  
B Staphylococcus epidermidis  
C\* Candida albicans  
D Lactobacillus  
E Neisseria gonorrhoeae
89. Quale dei seguenti trattamenti NON agisce aumentando la neoformazione ossea?  
A fluoruro di sodio  
B testosterone  
C steroidi anabolizzanti  
D\* bifosfonati  
E esercizio fisico
90. L'angioplastica coronarica transluminale percutanea:  
A non è efficace nella settima e ottava decade di vita  
B negli ultra-ottantenni non è causa di mortalità e morbilità  
C negli ultra-ottantenni è sempre un intervento di elezione  
D\* è una valida alternativa alla chirurgia in anziani opportunamente selezionati  
E è considerata completamente sostitutiva della chirurgia coronarica
91. Il carcinoma della prostata:  
A è più frequente nella razza caucasica rispetto alla nera  
B\* ha eziologia sconosciuta  
C ha eziologia ormonale  
D colpisce i castrati prima della pubertà  
E tutte
92. Qual è la più frequente sede di frattura ossea nell'anziano:  
A estremo distale del femore  
B estremo distale del radio  
C\* estremo prossimale del femore  
D estremo prossimale dell'omero  
E vertebre
93. Quale tra i seguenti patogeni può causare, nei diabetici anziani, una grave otite esterna?  
A Neisseriae Meningitidis  
B\* Pseudomonas  
C E.Coli  
D Staphylococcus aureus  
E Haemophilus
94. Negli anziani, quale delle seguenti è una frequente eziologia dell'epatite?  
A autoimmune  
B micotica  
C\* da farmaci  
D virale  
E batterica
95. In quale età della vita sono relativamente più frequenti i carcinomi?  
A quarta decade  
B quinta decade  
C sesta decade  
D\* settima decade  
E ottava decade
96. La classica triade sintomatologica dell'idrocefalo normoteso è:  
A\* disturbi dell'andatura + incontinenza urinaria + demenza  
B tremore + demenza + incontinenza urinaria  
C bradicinesia + tremori + festinazione  
D nessuna delle precedenti  
E ipertensione arteriosa + deficit visivi + vomito
97. La depressione maggiore può entrare in diagnosi differenziale con:  
A disturbo idiopatico primitivo del sonno  
B demenza  
C pseudodemenza  
D ipocondria  
E\* tutte le precedenti
98. E' fattore predittivo di mortalità peri-operatoria nei pazienti anziani operati di by-pass aorto-coronarico:  
A frazione di eiezione <50%  
B pregresso infarto miocardico  
C ipertensione  
D nessuna delle precedenti  
E\* tutte le precedenti
99. La malnutrizione nell'anziano provoca generalmente una anemia:  
A\* normocromica e normocitica  
B ipocromica e normocitica  
C ipocromica e macrocitica  
D ipercromica e normocitica  
E normocromica e macrocitica
100. Quale tra i seguenti farmaci non è dotato di attività antiaggregante piastrinica?  
A Aspirina  
B Ticlopidina  
C Cimetidina  
D Nifedipina  
E\* risposte C e D
101. La complicanza più comune dell'ipertiroidismo nell'anziano è:  
A\* fibrillazione atriale  
B iperreflessia  
C sudorazione

- D diarrea  
E nessuna delle precedenti
102. Quale struttura encefalica è atrofica nella demenza di Alzheimer?  
A corteccia frontale  
B\* aree multiple del cervello  
C nuclei dell'amigdala  
D corteccia temporale  
E corteccia cerebellare
103. Quale tra i seguenti è un fattore predisponente all'insorgenza del prolasso uterino nella donna anziana?  
A traumi da parto  
B obesità  
C stipsi  
D carenza estrogenica  
E\* tutte le precedenti
104. L'aneurisma dell'aorta addominale nell'anziano è causato, generalmente, da :  
A sifilide  
B necrosi mediocistica di Erdheim  
C\* aterosclerosi  
D trauma  
E edema polmonare
105. La prevalenza di sintomatologia depressiva nell'anziano nella comunità è del:  
A\* 15%  
B 30%  
C 40%  
D 50%  
E 60%
106. Sono segni e sintomi di presentazione nell'arterite a cellule giganti:  
A febbre  
B calo ponderale  
C claudicatio della masticazione  
D rigidità e dolore a carico di cingoli scapolo-omerale e pelvico  
E\* tutte le precedenti
107. Quale delle seguenti affermazioni a proposito della claudicatio intermittens agli arti inferiori è falsa?  
A compare durante il cammino  
B la soglia si può ridurre durante la digestione  
C\* è sensibile ai cambiamenti di posizione degli arti  
D di solito compare al polpaccio  
E il ciclo deambulazione-dolore-riposo è relativamente costante e ripetibile nel tempo
108. Quale tra i seguenti tumori intracranici è quello maggiormente riscontrato nella popolazione anziana?  
A astrocitoma  
B oligodendroglioma  
C\* glioblastoma  
D meningioma  
E neurinoma dell'acustico
109. Sono causa di prurito generalizzato nell'anziano:  
A policitemia vera  
B linfomi  
C patologie epatiche  
D parassitosi intestinale  
E\* tutte le precedenti
110. Il fabbisogno energetico a riposo del soggetto anziano è:  
A\* 25-30 Kcal/Kg  
B 30-35 Kcal/Kg  
C 35-40 Kcal/Kg  
D 40-45 Kcal/kg  
E 45-50Kcal/Kg
111. Quali scale, tra quelle elencate, sono utilizzate per indagare le funzioni cognitive nell'anziano?  
A ADL(Activity Dayling Living)  
B IADL(Instrumental Activity Dayling Living)  
C GDS(Geriatric Depression Scale)  
D\* MMSE(Mini Mental State Examination)
- E nessuna delle elencate
112. Le arterie vertebrali originano da:  
A aorta  
B carotidi comuni  
C carotidi interne  
D carotidi esterne  
E\* succlavie
113. E' una possibile indicazione all'intervento di by-pass aorto-coronarico nelle persone anziane una:  
A stenosi del tronco comune <=30%  
B stenosi delle altre coronarie <50%  
C\* stenosi del tronco comune >75%  
D tutte le precedenti  
E nessuna delle precedenti
114. La terapia dei tumori cerebrali negli anziani comprende:  
A corticosteroidi  
B anticonvulsivanti  
C radioterapia  
D\* tutti i precedenti  
E nessuno dei precedenti
115. Nella Sclerosi Laterale Amiotrofica si ha una compromissione di:  
A vie corticospinali  
B nuclei motori dei nervi cranici  
C corna anteriori del midollo spinale  
D secondo motoneurone  
E\* tutte
116. Nei pazienti anziani il trattamento dell'epatite cronica autoimmune è preferibilmente basato su:  
A prednisone  
B azatioprina  
C\* prednisone e azatioprina  
D interferone  
E tutte le precedenti
117. La valutazione diagnostica dell'anziano iperteso dovrebbe comprendere tutti tranne:  
A ematocrito  
B potassemia  
C creatininemia  
D proteinuria  
E\* livello plasmatico delle transaminasi
118. Quali sono le alterazioni elettrocardiografiche che compaiono in corso di ipotiroidismo nell'anziano?  
A bradicardia sinusale  
B onde T invertite  
C disturbi di conduzione intraventricolare  
D basso voltaggio diffuso  
E\* tutte le precedenti
119. L'ordine di importanza delle principali cause di decesso nel 1995 negli ultrasessantacinquenni è :  
A\* Cardiopatie; tumori maligni; malattie cerebrovascolari; BPCO e condizione affine; polmoniti e influenze;  
B Malattie cerebrovascolari;cardiopatie;tumori maligni;BPCO e condizioni affini; polmoniti e influenze;  
C Tumori maligni;cardiopatie; malattie cerebrovascolari;BPCO;polmoniti;  
D Malattie cerebrovascolari;tumori maligni;cardiopatie;BPCO,polmoniti;  
E BPCO;polmoniti;cardiopatie;tumori maligni;malattie cerebrovascolari.
120. Nelle persone anziane la perdita di liquidi è sicuramente compensata da:  
A urine più concentrate  
B aumento della sete  
C aumentata assunzione di liquidi  
D tutte  
E\* nessuna
121. Con l'invecchiamento la capacità vitale forzata  
A aumenta  
B\* si riduce  
C si esaurisce  
D resta invariata  
E si altera

122. Quale proteina è geneticamente correlata alla Demenza di Alzheimer?
- A\* Apo E  
 B Apo B  
 C Lp(a)  
 D Apo C  
 E Leptina
123. Quale, tra i seguenti farmaci utilizzati nella terapia del Parkinson, è un inibitore della monoamino-ossidasi B?
- A difenidramina  
 B\* selegilina  
 C orfenadrina  
 D biperidina  
 E tutti
124. Il cosiddetto "Centro Diurno" è un servizio indirizzato a:
- A\* persone anziane con disabilità lieve-moderata e discreto supporto familiare  
 B persone con grave deficit di autonomia e scarso supporto familiare  
 C persone con deficit cognitivi gravi e scarso supporto familiare  
 D tutte le precedenti  
 E nessuna delle precedenti
125. Quale delle seguenti caratteristiche NON è tipica del tremore nella malattia di Parkinson?
- A esordio in genere agli arti superiori  
 B frequenza elevata, ritmo regolare  
 C incremento in presenza di stato d'ansia  
 D presenza a riposo  
 E\* esordio bilaterale
126. L'anziano fragile si identifica in colui che ha:
- A età non molto avanzata  
 B massa ossea ridotta ma conservazione della massa muscolare  
 C massa muscolare ridotta ma conservazione della massa ossea  
 D\* grave decondizionamento  
 E una sola patologia grave
127. Qual'è l'istotipo più frequente del cancro polmonare dopo i 65 anni?
- A\* carcinoma epidermoidale  
 B carcinoma a piccole cellule indifferenziate  
 C carcinoma a grandi cellule indifferenziate  
 D adenocarcinoma  
 E carcinoma bronchiolo-alveolare
128. Dal punto di vista clinico la malattia di Parkinson viene spesso confusa con:
- A malattia di Alzheimer  
 B idrocefalo  
 C demenza multininfartuale  
 D\* tremore indotto da farmaci  
 E ictus
129. Nel Parkinson la perdita di neuroni dopaminergici della sostanza nigra è:
- A superiore al 20%  
 B superiore al 30%  
 C superiore al 40%  
 D superiore al 60%  
 E\* superiore all'80%
130. La terapia dietetica prescritta in caso di iperuricemia comporta l'eliminazione dalla dieta di:
- A carne  
 B piselli  
 C fagioli  
 D\* tutte  
 E nessuna
131. Nell'ipertrofia prostatica benigna cosa resta invariato nella ghiandola prostatica rispetto al normale?
- A dimensione della ghiandola  
 B\* consistenza  
 C limiti  
 D rapporti  
 E nessuna
132. Nell'anziano la polmonite:
- A si manifesta esclusivamente con febbre, tosse, produzione di escreato  
 B\* esordisce spesso con confusione mentale acuta
- C determina di regola la comparsa di forme leucocitarie immature  
 D nessuna delle precedenti  
 E tutte le precedenti
133. E' una complicanza dell'immobilizzazione:
- A ipotensione ortostatica  
 B trombosi venosa, embolia  
 C atelettasia polmonare  
 D litiasi vescicale  
 E\* tutte
134. La "vampata di calore" della donna in post-menopausa:
- A inizia a livello del tronco  
 B non è accompagnata da sudorazione  
 C dura sempre più di un'ora  
 D\* è una sensazione di calore o bruciore  
 E è accompagnata sempre da palpitazioni
135. Con il termine demenza si intende una patologia caratterizzata da:
- A deterioramento transitorio della memoria e di altre capacità cognitive  
 B deterioramento permanente della memoria e dello stato di vigilanza  
 C disturbo neurologico focale associato a turbe comportamentali  
 D\* deterioramento permanente della memoria e di altre capacità cognitive, con perdita progressiva dell'autonomia funzionale  
 E nessuna delle precedenti
136. Quale delle seguenti non è una causa di prurito nell'anziano?
- A xerosi  
 B uremia  
 C\* metastasi ossee  
 D linfomi  
 E patologie epatiche
137. Qual è l'andamento dei valori della VES nell'età avanzata?
- A tende a diminuire  
 B non differisce dalle altre età  
 C\* tende ad aumentare  
 D varia a seconda della malattia  
 E ha un andamento imprevedibile
138. Durante l'ospedalizzazione, rischi primari potenziali per l'anziano sono:
- A delirio  
 B ulcere da pressione  
 C aumentato rischio di frattura  
 D sincope  
 E\* tutte le precedenti
139. I livelli sierici di albumina nell'anziano sono:
- A aumentati rispetto al giovane  
 B aumentati solo nelle donne  
 C invariati  
 D\* diminuiti, particolarmente in presenza di comorbidità multiple e/o disabilità  
 E molto diminuiti, indipendentemente dal sesso
140. La polmonite rappresenta negli anziani la principale causa:
- A di morte  
 B\* di morte da malattie infettive  
 C di morte nelle donne  
 D di inabilità  
 E di disabilità
141. La valutazione della funzione piastrinica può essere effettuata attraverso:
- A tempo di sanguinamento  
 B dosaggio del fattore di von Willebrand  
 C aggregometria piastrinica  
 D glicoproteine di membrana e granulazioni piastriniche  
 E\* tutte le precedenti
142. L'amnesia globale transitoria può essere causata da:
- A epilessia  
 B ischemia transitoria bilaterale  
 C emicrania  
 D a + b  
 E\* tutte
143. Sono fattori che incrementano il rischio di osteoporosi:
- A razza

- B basso peso corporeo  
C caffè  
D ipoestrogenismo  
E\* tutti i precedenti
144. Quale delle seguenti affermazioni a proposito del tinnito nell'anziano è falsa?  
A è bilaterale  
B è soggettivo  
C\* è una manifestazione psicotica  
D è accompagnato a sordità neurosensoriale  
E è continuo
145. Le ulcere da pressione allo stadio 3 e 4 sono più facilmente infettate da:  
A aerobi gram-negativi  
B cocchi gram-positivi  
C aerobi  
D\* anaerobi  
E tutte le precedenti
146. I reni dell'individuo anziano sano rispetto a quelli dei soggetti più giovani presentano:  
A dimensioni inferiori  
B minore flusso ematico  
C minore filtrazione glomerulare  
D nessuna delle precedenti  
E\* tutte le precedenti
147. Sono farmaci utilizzati nella terapia dell'ipertrofia prostatica benigna:  
A\* alfa-bloccanti  
B calcio-antagonisti  
C nitrati  
D beta-bloccanti  
E nessuno
148. Nell'anziano a livello cerebrale sono più frequenti:  
A\* tumori metastatici  
B tumori del parenchima  
C tumori endocranici  
D tutti i precedenti  
E nessuno dei precedenti
149. Nell'anziano con disfunzione renale la digossina deve essere:  
A\* usata in dosi minori  
B usata in dosi maggiori  
C usata in dosi terapeutiche normali  
D evitata  
E sostituita con beta-bloccanti
150. La frattura di Colles è localizzata a livello di:  
A\* estremità distale del radio  
B estremità prossimale del femore  
C piede  
D bacino  
E nessuna delle precedenti
151. La valutazione della sintomatologia depressiva nell'anziano viene effettuata tramite:  
A\* GDS di Brink e Yesavage  
B MMSE di Folstein  
C Barthel Index  
D ADL di Katz  
E IADL di Lawton
152. In un paziente demente, un punteggio di Hachinski modificato superiore a 4 è indicativo di :  
A probabile demenza degenerativa primaria  
B\* demenza multifattoriale  
C demenza a corpi di Lewy  
D forme miste  
E depressione
153. La diagnosi di certezza di neoplasia cerebrale si basa su:  
A TAC  
B PET  
C esame del liquido cerebrospinale  
D arteriografia  
E\* biopsia
154. Nell'anziano il principale fattore di rischio per vasculopatia cerebrale è:  
A Ipercolesterolemia  
B fumo  
C\* ipertensione  
D tutti  
E nessuno
155. Quale genotipo dell'Apo E è associata ad un maggior rischio di sviluppare malattie di Alzheimer?  
A omozigosi epsilon3/epsilon 3 dell'Apo E  
B eterozigosi epsilon3/epsilon 4 dell'Apo E  
C\* omozigosi epsilon4/epsilon 4 dell'Apo E  
D omozigosi epsilon2/epsilon 2 dell'Apo E  
E eterozigosi epsilon2/epsilon 3 dell'Apo E
156. La sincope nell'anziano può essere determinata da:  
A aritmie cardiache  
B ischemia transitoria  
C ipotensione ortostatica  
D assunzione di farmaci anticolinergici  
E\* tutte le precedenti
157. Una delle seguenti non è una statina:  
A atorvastatina  
B lovastatina  
C fluvastatina  
D\* colestiramina  
E simvastatina
158. Quale fra i seguenti farmaci non è un antipsicotico?  
A risperidone  
B olanzapina  
C tioridazina  
D aloperidolo  
E\* paroxetina
159. Quale tra i seguenti microrganismi è secondo solo allo pneumococco come agente patogeno delle polmoniti extraospedaliere negli anziani?  
A Staphylococcus aureus  
B Legionella pneumophila  
C\* Haemophilus influenzae  
D Virus influenzale  
E nessuno dei precedenti
160. Nell'anziano è ben conservata la capacità di assorbimento di:  
A\* fattori nutrizionali  
B vitamina A  
C vitamina B12  
D calcio  
E zinco
161. Un'importante differenza tra l'ipertiroidismo del giovane e quello dell'anziano è la mancanza nell'anziano di sintomatologia:  
A\* oculare  
B cardiaca  
C gastroenterica  
D neuromuscolare  
E generale
162. Lo stato nutrizionale nell'anziano viene valutato attraverso:  
A perdita di peso rispetto al normale  
B albumina sierica  
C transferrina sierica  
D conta linfocitaria  
E\* tutte
163. Quali sono le patologie che possono indurre depressione nell'anziano?  
A cancro  
B malattie cardiovascolari  
C tiroiditi  
D morbo di Alzheimer  
E\* tutte le precedenti
164. I farmaci antiparkinsoniani provocano i seguenti effetti collaterali, tranne:  
A allucinazioni  
B confusione mentale  
C stipsi



- D\* pollachiuria  
E delirio
165. La formazione di un'ulcera profonda in presenza di cute sovrastante apparentemente integra è dovuta a:  
A\* colonizzazione batterica nella sede della lesione provocata dalla compressione  
B non è un processo realizzabile  
C umidità  
D pressione  
E nessuna
166. Quali dei seguenti sono sintomi frequenti del morbo di Parkinson?  
A tremori, ipotonia, adiadococinesia  
B\* tremori, ipertonia, scialorrea  
C atassia, afasia, aprassia  
D tremori, spasticità, bradicinesia  
E emiparesi, seborrea, afasia
167. Nella demenza di Alzheimer i deficit cognitivi sono dovuti a:  
A ipotiroidismo  
B carenze vitaminiche  
C ipercalcemia  
D idrocefalo normoteso  
E\* nessuno
168. Sono cause infettive di demenza tutte le seguenti, eccetto:  
A infezione da HIV  
B\* infezione da pseudomonas aeruginosa  
C neurosifilide  
D morbo di Lyme  
E infezione da prioni
169. Quale dei seguenti servizi è il più idoneo ad accogliere anziani con demenza grave dopo un ricovero ospedaliero per patologia acuta?  
A\* Residenza Sanitaria Assistenziale  
B Centro Diurno  
C Centro di Riabilitazione Intensiva  
D Divisione di Medicina Interna  
E Casa Protetta
170. Nelle persone anziane con coronaropatia quale sintomo si verifica meno frequentemente che nel giovane?  
A dispnea  
B sincope da sforzo  
C tosse durante sforzo  
D palpitazioni da sforzo  
E\* dolore toracico tipico
171. L'osteoporosi facilita nell'anziano le fratture di:  
A femore  
B avambraccio  
C omero  
D bacino  
E\* tutte
172. Sono sintomi della malattia di Parkinson tutti i seguenti tranne:  
A tremore ritmico a riposo  
B\* iperreflessia  
C alterazione della mimica facciale  
D ridotte oscillazioni delle braccia durante la marcia  
E tendenza alle cadute
173. Quali tra queste condizioni è causa potenzialmente reversibile di demenza?  
A\* deficit di vitamina B12  
B malattia di Parkinson  
C malattia di Alzheimer  
D morbo di Creutzfeld-Jacob  
E nessuna delle precedenti
174. Nella terapia della BPCO nell'anziano NON è consigliabile:  
A l'uso di antibiotici ad ampio spettro per breve periodo durante le riacutizzazioni  
B\* l'uso cronico di antibiotici  
C la riduzione della terapia corticosteroidica dopo la risoluzione della fase acuta  
D tutte  
E nessuna
175. Prima di un intervento chirurgico di elezione in un paziente geriatrico deve essere necessariamente valutata la funzione:  
A cardiopolmonare  
B renale  
C stato di nutrizione  
D idratazione  
E\* tutte
176. Nel paziente anziano con scompenso cardiaco cronico la frazione di eiezione:  
A è sempre ridotta  
B\* può essere normale o solo lievemente ridotta anche nel 40% dei casi  
C non è mai normale  
D è aumentata  
E nessuna delle precedenti
177. Sono causa di diarrea negli anziani:  
A supplementi dietetici  
B anti-acidi  
C lesioni ostruttive  
D malassorbimento  
E\* tutti i precedenti
178. Quale tra i seguenti farmaci può scatenare delirio nel paziente anziano?  
A Meperidina  
B Scopolamina  
C Amitriptilina  
D\* tutte le precedenti  
E nessuna delle precedenti
179. Il monitoraggio della terapia con tiroxina nel paziente anziano è:  
A\* clinico e di laboratorio  
B esclusivamente ecografico  
C ecografico e di laboratorio  
D esclusivamente di laboratorio  
E scintigrafico e clinico
180. E' una regola clinica generale per una ottimizzazione della prescrizione farmacologica in età geriatrica:  
A iniziare con dosi basse  
B aumentare le dosi lentamente  
C prestare attenzione ad effetti tossici  
D\* tutti  
E nessuna
181. La malattia di Parkinson è associata a:  
A aumento di adrenalina  
B riduzione di acetilcolina  
C aumento di noradrenalina  
D aumento di serotonina  
E\* riduzione di dopamina
182. Gli anziani con ipertiroidismo presentano sempre:  
A aumento di volume della tiroide  
B tiroide palpabile  
C tiroide visibile all'ispezione  
D tiroide visibile alla TAC  
E\* nessuna delle precedenti
183. Nella terapia dell'ipertrofia prostatica benigna si utilizza la terazosina che viene somministrata:  
A la mattina  
B\* in dosi di 2-5 mg  
C senza rischio di ipotensione ortostatica  
D tutte le precedenti  
E nessuna
184. Sono causa di prurito nelle persone anziane:  
A linfoma  
B ipertiroidismo  
C ipotiroidismo  
D pemfigoide bolloso  
E\* tutte le precedenti
185. Quali sono i possibili rischi dell'ospedalizzazione ?  
A infezioni nosocomiali  
B errori di terapia  
C cadute

D disidratazione e malnutrizione  
E\* tutti

D tutti  
E nessuno

186. Quale dei seguenti può essere denominato anche tremore senile?

- A il tremore parkinsoniano
- B\* il tremore essenziale
- C il tremore cerebellare
- D il tremore neuropatico
- E il tremore da assunzione cronica di alcool

196. Qual è la causa di anemia normocitica nell'anziano?

- A malattie infiammatorie croniche
- B insufficienza renale cronica
- C malattie endocrine
- D malnutrizione
- E\* tutte le precedenti

187. Quali sintomi/segni dell'ipertiroidismo sono meno frequenti nell'anziano, rispetto al giovane?

- A tachicardia
- B calo ponderale
- C astenia
- D\* esoftalmo
- E diarrea

197. Quale delle seguenti condizioni può essere causa di iperkaliemia:

- A morbo di Addison
- B acidosi metabolica
- C uso di diuretici risparmiatori di potassio
- D\* tutte le precedenti
- E nessuna delle precedenti

188. L'aumento del T3 è più frequente nei pazienti anziani con ipertiroidismo secondario a:

- A\* adenoma solitario
- B gozzo multinodulare
- C tiroidite di Hashimoto
- D nessuna delle precedenti
- E adenocarcinoma follicolare

198. Quale, tra i seguenti farmaci, ha effetto anti-colinergico?

- A amantadina
- B selegilina
- C\* biperidene
- D bromocriptina
- E imipramina

189. Nella farmacocinetica dell'anziano il volume di distribuzione dei farmaci lipofili è:

- A invariato
- B ridotto
- C\* aumentato
- D aumentato solo negli epatopatici
- E ridotto solo in pazienti con I.R.C.

199. Un appropriato programma di attività fisica per una popolazione di persone anziane dovrebbe comprendere:

- A monitoraggio della frequenza cardiaca
- B periodi di riscaldamento
- C periodi di raffreddamento
- D particolare attenzione nei confronti degli esercizi di stiramento e flessibilità
- E\* tutte

190. Tra queste attività ve ne è una sola che non è compresa tra le ADL, ossia:

- A spostarsi autonomamente
- B vestirsi
- C\* usare il telefono
- D essere continenti
- E mangiare autonomamente

200. I siti più frequenti di insorgenza delle ulcere da pressione sono:

- A avambraccio
- B coscia
- C\* regione trocanterica
- D regione plantare del piede
- E mano

191. Quale tra le seguenti affermazioni è falsa:

- A\* l'invecchiamento di per sè è causa di incontinenza
- B la capacità vescicale generalmente diminuisce con l'età
- C il residuo urinario aumenta con l'età
- D la lassità del pavimento pelvico, nella donna, favorisce l'insorgenza di incontinenza da sforzo
- E nell'uomo l'ipertrofia prostatica può determinare incontinenza da urgenza e/o da rigurgito

201. Sono possibili cause di ipercalcemia nell'anziano tutte le seguenti condizioni:

- A Milk-alkali Syndrome
- B sarcoidosi
- C iperparatiroidismo primitivo
- D\* tutte le precedenti
- E nessuna delle precedenti

192. L'incidenza delle infezioni delle vie urinarie nell'anziano è:

- A invariata rispetto alle altre età
- B aumentata solo nel sesso maschile
- C\* aumentata
- D diminuita
- E diminuita nel sesso maschile

202. I tofi sono:

- A deposito di liquido
- B accumuli di grasso
- C accumuli di cellule
- D\* noduli palpabili
- E noduli esclusivamente superficiali

193. L'anziano non tollera la disidratazione con riduzione della volemia circolante a causa di:

- A più frequente assunzione di farmaci che inducono perdita di sali e potassio
- B presenza di arteriosclerosi
- C ridotta efficienza dei meccanismi omeostatici cardiocircolatori
- D più frequente utilizzo di farmaci che bloccano determinati riflessi cardiocircolatori
- E\* tutte

203. Per depressione si intende:

- A\* un disturbo caratterizzato da sentimenti di tristezza e di disperazione, di gravità variabile da lieve a potenzialmente letale
- B uno stato depressivo dovuto ad evento traumatico
- C un disturbo del soggetto caratterizzato da sentimenti di suicidio correlato a una lieve compromissione organica
- D un disturbo caratterizzato da sentimenti di aggressività secondario a marcata arteriosclerosi
- E uno stato d'animo depresso con marcata componente autistica

194. I tumori endocranici nei pazienti anziani vanno in diagnosi differenziale con:

- A malattie psichiatriche
- B depressione
- C malattia di Alzheimer
- D Attacco Ischemico Transitorio
- E\* tutte le precedenti

204. Nell'anziano la dose giornaliera di digossina è di solito:

- A 0.0625 mg
- B\* 0.125 mg
- C 0.25 mg
- D 0.50 mg
- E 1 mg

195. Riguardo le patologie del colon nell'anziano, quale esame è indicato ogni 3-5 anni?

- A l'esplorazione rettale
- B la ricerca del sangue occulto nelle feci
- C\* la sigmoidoscopia

205. Quale delle seguenti neoplasie maligne tiroidee è più frequente nell'anziano?

- A carcinoma papillare
- B carcinoma midollare
- C\* carcinoma indifferenziato
- D carcinoma follicolare
- E sarcoma

206. Qual'è la sede di più frequente distribuzione delle lesioni da herpes Zoster nell'anziano?
- A\* toracica  
B trigeminale  
C cervicale  
D lombare  
E sacrale
207. Tutte le seguenti sono manifestazioni cliniche della depressione nell'anziano, eccetto:
- A irritabilità  
B scarsa concentrazione  
C deliri di povertà  
D ritiro sociale  
E\* euforia
208. Il sintomo più frequente nel Parkinson dell'anziano è:
- A attacchi ischemici transitori  
B\* rigidità  
C perdita del controllo sfinteriale  
D obnubilamento del sensorio  
E agnosia
209. Quale tra i seguenti farmaci non è un inibitore recettoriale dell'angiotensina II?
- A ibesartan  
B losartan  
C valsartan  
D\* felodipina  
E nessuno dei precedenti
210. Le normali modificazioni cutanee nell'invecchiamento sono:
- A\* appiattimento della giunzione dermo-epidermica  
B aumento del numero di cellule di Langherans  
C aumento del numero dei melanociti  
D ispessimento del derma  
E aumento della vascolarizzazione dermica
211. Nell'anziano l'anemia da carenza di ferro è:
- A più frequente negli uomini che nelle donne  
B rara  
C di frequenza pari a quella dei giovani  
D\* frequente  
E meno frequente di quella da deficit di vit. B12
212. Quale tra le seguenti affermazioni, inerenti l'infezione da herpes zoster nell'anziano, è falsa?
- A l'incidenza di nevralgia posterpetica è maggiore nell'anziano rispetto al giovane  
B l'herpes zoster oftalmico risulta da un interessamento della branca oftalmica del nervo trigemino  
C il rischio di nevralgia posterpetica è maggiore nel caso di interessamento dell'oftalmico piuttosto di altri dermatomeri  
D\* la nevralgia posterpetica è facile da trattare  
E l'aciclovir è uno dei possibili farmaci usati nella terapia dell'herpes zoster
213. Sebbene anomalie cromosomiche possano aversi in molte leucemie, il cromosoma Philadelphia è diagnostico di:
- A leucemia acuta linfocitica  
B leucemia acuta monocitica  
C leucemia acuta mielocitica  
D leucemia cronica linfocitica  
E\* leucemia cronica mielocitica
214. Quali di queste alterazioni endocrine e/o metaboliche può essere causa di stipsi nell'anziano?
- A ipotiroidismo  
B ipercalcemia  
C ipopotassiemia  
D\* tutte le precedenti  
E nessuna delle precedenti
215. La degenerazione neurofibrillare dei neuroni è tipica:
- A della demenza post-traumatica  
B della corea di Huntington  
C della sindrome demenziale post-encefalitica  
D\* della demenza di Alzheimer  
E della demenza micro-multi-infartuale
216. Quale tra i seguenti esami diagnostici può essere praticato in pazienti con demenza al fine di escludere forme vascolari?
- A TAC  
B RMN  
C SPECT  
D PET  
E\* tutti
217. Nella malattia di Parkinson possono risultare alterate:
- A forza muscolare  
B sensibilità  
C funzioni cognitive  
D\* tutte  
E nessuna
218. Quale delle seguenti patologie può essere posta in diagnosi differenziale con il parkinsonismo?
- A mixedema  
B idrocefalo normoteso  
C encefalopatia epatica  
D depressione  
E\* tutte le precedenti
219. In un paziente di 80 anni, l'ipertensione sistolica isolata è definita da quale dei seguenti valori pressori?
- A PAS >159 mmHg, PAD <90 mmHg  
B PAS >159 mmHg, PAD <80 mmHg  
C PAS >139 mmHg, PAD <80 mmHg  
D\* PAS >139 mmHg, PAD <90 mmHg  
E nessuna delle precedenti
220. Comuni cause di immobilizzazione nell'anziano sono tutte tranne:
- A dolore  
B depressione  
C cause ambientali  
D fattori sensoriali  
E\* nessuna delle precedenti
221. L'ipertrofia prostatica benigna:
- A non è una patologia tipica dell'età avanzata  
B viene evidenziata prima dei 40 anni  
C\* inizia a provocare sintomi intorno ai 50 anni  
D non determina sintomi ingravescenti con l'avanzare dell'età  
E ha una incidenza che non aumenta con l'età
222. Quali delle seguenti cardiopatie congenite si può riscontrare più frequentemente in età avanzata?
- A\* difetto interatriale  
B coartazione aortica  
C lieve difetto interventricolare  
D pervietà del dotto arterioso  
E nessuna delle precedenti
223. Possibili cause di corea sono:
- A malattie metaboliche  
B intossicazioni da farmaci  
C infezioni del SNC  
D\* tutte le precedenti  
E nessuna delle precedenti
224. Gli effetti collaterali dei neurolettici comprendono:
- A\* sedazione  
B ipertensione  
C scialorrea  
D diplopia  
E nessuna
225. Il Day Hospital è:
- A un ospedale per acuti  
B\* un reparto ospedaliero a dimissione serale  
C un centro di assistenza territoriale per anziani disabili  
D A + C  
E tutte le precedenti
226. In un anziano, la diagnosi di obesità si basa sul riscontro di un indice di massa corporea:
- A <24  
B\* >29

- C 27-29  
D >32  
E nessuna delle precedenti
227. Nel paziente anziano con ulcera duodenale quale dei seguenti sintomi è più frequente?  
A dolore epigastrico intenso o improvviso  
B rigidità addominale  
C reazione di difesa addominale  
D\* nausea, vomito e vaga dolenzia addominale  
E tutte
228. Tutti i seguenti segni si riferiscono ad un paziente con BPCO, eccetto:  
A tosse  
B presenza di escreato  
C dispnea  
D sibili respiratori  
E\* nessuno dei precedenti
229. Quando tipicamente si accentua il tremore del parkinsoniano?  
A a riposo  
B durante il movimento  
C nel sonno  
D\* in caso di forti emozioni  
E nel compiere sforzi intensi
230. L'ittero ostruttivo viene sospettato nel paziente anziano quando c'è:  
A storia di coliche  
B prurito  
C feci acoliche  
D progressione dell'ittero  
E\* tutte le precedenti
231. L'ostruzione uretrale provocata da una prostata ipertrofica non causa:  
A incompleto svuotamento vescicale  
B stasi urinaria  
C infezione delle vie urinarie  
D calcoli vescicali  
E\* calcoli alla colecisti
232. La capacità funzionale nell'anziano viene valutata mediante :  
A\* ADL e IADL  
B GDS  
C MMSE  
D T-score  
E nessuna delle precedenti
233. Nella cura della cute dei pazienti con ulcera da pressione bisogna evitare:  
A detergenti non irritanti  
B umidificatori per la cute secca  
C agenti topici che agiscano da barriera contro l'umidità  
D dieta adeguata  
E\* acqua bollente
234. Quale delle seguenti manovre riabilitative non viene praticata nella fase acuta dell'ictus?  
A cambiamento di posizione del paziente ogni due ore;  
B posizionamento dell'articolazione del paziente per prevenire le contratture  
C posizionamento del paziente per prevenire polmoniti ab ingestis;  
D\* esercizi per la rieducazione muscolare  
E esercizi relativi all'ampiezza dei movimenti.
235. Con l'invecchiamento l'attività delle monoammino-ossidasi:  
A si riduce di poco  
B si riduce di molto  
C\* aumenta  
D aumenta di molto  
E resta invariata
236. Nell'ipertiroidismo dell'anziano sono meno frequenti:  
A esoftalmo  
B segni neuropsichici  
C diarrea  
D sudorazione  
E\* tutte le precedenti
237. Sono tutti fattori di rischio per malattia cardiovascolare tranne:  
A fumo di sigaretta  
B ipertensione sistolica e/o diastolica  
C aumentati livelli sierici di colesterolo totale  
D\* elevati livelli sierici di HDL  
E elevati livelli sierici di LDL
238. L'ipersensibilità al Warfarin è una caratteristica dell'anziano che scompare quando la dieta è integrata con:  
A vitamina C  
B vitamina A  
C\* vitamina K  
D tutte le precedenti  
E nessuna delle precedenti
239. La scala di valutazione più indicata per la determinazione del rischio di cadute nell'anziano è:  
A Geriatric Depression Scale  
B\* Scala di Tinetti  
C IADL  
D Indice di Barthel  
E Global Deterioration Scale
240. La forma clinica di diabete più frequente nell'anziano è:  
A diabete tipo 1  
B\* diabete tipo 2  
C diabete chetoacidotico  
D diabete insipido  
E nessuna delle precedenti
241. Quando sono controindicati i farmaci uricosurici nel trattamento della iperuricemia?  
A in assenza di lesioni delle vie urinarie  
B in paziente digitalizzati  
C\* in pazienti affetti da insufficienza renale  
D in pazienti anemici  
E in pazienti allergici alla penicillina
242. Qual'è fra quelli elencati l'ipoglicemizzante orale che, specie nell'anziano ed in particolari condizioni, può indurre lattico-acidosi?  
A glibenclamide  
B\* fenformina  
C tolbutamide  
D clorpropamide  
E glipizide
243. Di quale osteopatia è patognomonico il segno delle "zone di Looser"?  
A malattia di Paget  
B osteoporosi  
C\* osteomalacia  
D tutte le citate  
E nessuna delle citate
244. Qual'è la più comune complicanza della stipsi cronica nell'anziano?  
A colite ischemica  
B colon irritabile  
C\* megacolon  
D malassorbimento  
E ernia iatale
245. Le placche senili sono neoformazioni presenti:  
A\* nel cervello dell'anziano sano come in quello del demente senile  
B solo nel cervello del demente senile  
C nel cervello del demente senile ed in quello dello pseudodemente isterico  
D nel cervello del demente senile ed in quello del demente di Pick  
E solo quando si sono superati i 90 anni
246. Quali tra questi non è un fattore di rischio estrinseco per lo sviluppo delle ulcere da pressione?  
A pressione  
B frizione  
C strappo  
D macerazione  
E\* prensione
247. Qual è il grado minimo di stenosi di un vaso arterioso che determina riduzione di flusso a riposo?  
A 50%  
B\* 80%

- C 65%  
D 90%  
E 95%
248. Cosa non si effettua in un paziente anziano con crisi convulsive?  
A TAC  
B RMN  
C EEG  
D\* EMG  
E esame obiettivo generale
249. Quale modificazione si può riscontrare a carico dell'apparato muscoloscheletrico nell'anziano?  
A osteopenia  
B osteoporosi  
C osteoartrosi  
D sarcopenia  
E\* tutte le precedenti
250. Nell'appendicite dell'anziano la perforazione si riscontra nel:  
A 5% dei casi  
B 15% dei casi  
C 25% dei casi  
D 45% dei casi  
E\* >50% dei casi
251. Cos'è un T.I.A.?  
A trombosi improvvisa acuta  
B trombosi istantanea acuta  
C\* attacco ischemico transitorio  
D turba ischemica acuta  
E attacco ischemico tardivo
252. Nella Geriatric Depression Scale (GDS) a 30 items, la depressione lieve è indicata da un punteggio:  
A compreso tra 5 e 9  
B >9  
C\* compreso tra 10 e 19  
D >22  
E nessuna delle precedenti
253. Negli anziani con insufficienza cardiaca da alterazione isolata della funzione diastolica i sintomi sono contrallati con l'uso di:  
A\* diuretici  
B Ca-antagonisti diidropiridinici  
C vasodilatatori  
D digitalici  
E a+c+d
254. Con quale delle seguenti indicazioni è più frequentemente prescritta l'aspirina nell'anziano?  
A antipiretico  
B analgesico  
C\* antiaggregante piastrinico  
D prevenzione della demenza  
E b+d
255. La LBD (Lewy Body Disease) è la demenza :  
A di Alzheimer  
B\* a corpi di Lewy  
C di Parkinson  
D di Pick  
E di Huntington
256. Uno solo dei seguenti è un bloccante del recettore dell'angiotensina II:  
A fosinopril  
B\* valsartan  
C enalapril  
D moexpril  
E ramipril
257. Sono possibili cause di ipotensione ortostatica nell'anziano le seguenti condizioni:  
A disidratazione  
B assunzione di diuretici  
C insufficienza cortico-surrenalica  
D neuropatie autonome e periferiche  
E\* tutte le precedenti
258. L'ecografia addominale, in un paziente con ipertrofia prostatica benigna, non consente di valutare:  
A residuo vescicale post-minzionale  
B volume prostatico  
C\* il flusso urinario  
D calcoli o masse renali  
E idronefrosi
259. Non è un fattore di rischio maggiore per osteoporosi:  
A ipoestrogenismo  
B\* elevato peso corporeo  
C razza caucasica  
D menopausa prematura  
E sedentarietà
260. Qual è la causa più frequente di sanguinamento occulto nell'anziano, fra quelle elencate?  
A rettocolite ulcerosa  
B\* diverticolite del colon  
C morbo di Crohn  
D ernia iatale  
E varici esofagee
261. Con l'invecchiamento si ha una riduzione della massa corporea magra. Questa riduzione comporta:  
A riduzione del fabbisogno energetico  
B alterazione della forza muscolare  
C tendenza alla caduta  
D alterazione della mobilità  
E\* tutte le precedenti
262. Nelle donne in postmenopausa una sintomatologia caratterizzata da bruciore, prurito, dispareunia vaginale deve far pensare a :  
A dermatite  
B eczema  
C lichen  
D candida  
E\* vaginite atrofica
263. Quale tra le seguenti forme di "osteoporosi" è primaria e non secondaria?  
A\* postmenopausale  
B deficit di 25(OH)D  
C osteogenesi imperfetta tarda  
D diabete mellito  
E emocromatosi
264. Quale di questi indici è il più adatto a valutare lo stato nutrizionale dell'anziano?  
A sideremia  
B circonferenza addominale  
C uricemia  
D\* albuminemia  
E colesterolemia
265. Quali tra i tumori polmonari ha un accrescimento particolarmente rapido?  
A adenocarcinoma  
B carcinoma squamocellulare  
C\* microcitoma  
D tutte le precedenti  
E nessuna delle precedenti
266. Quale dei seguenti è un test oggettivo di performance fisico-funzionale nell'anziano?  
A ADL  
B IADL  
C\* Scala di Tinetti  
D GDS  
E MMSE
267. L'adenocarcinoma polmonare si localizza preferibilmente a livello:  
A\* periferico  
B ilare  
C parailare  
D ilare/parailare  
E centrale
268. L'agnosia è un difetto che concerne:  
A la memoria

- B l'archicerebello  
 C\* i processi centrali di riconoscimento degli oggetti  
 D la capacità di imparare  
 E nessuna delle funzioni elencate
269. Quali farmaci possono provocare costipazione nell'anziano?  
 A oppioidi  
 B antidepressivi  
 C ferro  
 D calcio  
 E\* tutte le precedenti
270. Quali sono le cause più frequenti di ipotiroidismo nell'anziano?  
 A neoplasia  
 B Morbo di Riedel  
 C Morbo di De Quervain  
 D\* malattia di Hashimoto  
 E tiroidite batterica
271. Quale dei seguenti reperti è presente negli stati di iperpotassiemia:  
 A\* astenia muscolare  
 B alcalosi metabolica  
 C riduzione del voltaggio dell'onda T all'ECG  
 D onda U di alto voltaggio all'ECG  
 E poliuria
272. Qual'è il segno che consente di distinguere l'artrite settica dall'attacco acuto gottoso?  
 A tumefazione  
 B iperestesia  
 C cute arrossata e calda  
 D febbre  
 E\* linfangite e linfoadenopatia
273. In anziani con funzioni cognitive conservate, il metabolismo ossidativo cerebrale:  
 A si riduce molto (>10%)  
 B si riduce poco (<10%)  
 C si riduce solo nelle donne  
 D aumenta  
 E\* resta immutato
274. Quali tra le seguenti condizioni deve essere posta in diagnosi differenziale con le polmoniti nell'anziano?  
 A atelettasia  
 B embolia polmonare  
 C scompenso cardiaco  
 D\* tutte le precedenti  
 E nessuna delle precedenti
275. Nella tubercolosi miliare dell'anziano possono essere presenti:  
 A febbre  
 B tosse  
 C espettorato  
 D astenia  
 E\* tutte le precedenti
276. Si parla di iperuricemia quando il livello sierico di urati supera:  
 A\* 7 mg/dl  
 B 10 mg/dl  
 C 5 mg/dl  
 D 1 mg/dl  
 E 15 mg/dl
277. La prevenzione più efficace dell'osteoporosi è:  
 A immobilizzazione  
 B\* attività fisica regolare  
 C sali di calcio  
 D cortisonici  
 E vitamina D3
278. Quali sono i meccanismi patogenetici dello scompenso cardiaco nell'anziano?  
 A compromissione funzione sistolica  
 B compromissione funzione diastolica  
 C valvulopatie gravi  
 D\* tutte le precedenti  
 E nessuna delle precedenti
279. Fanno obbligatoriamente parte dell'Unità di Valutazione Geriatrica:  
 A\* il geriatra, l'assistente sociale e l'infermiere  
 B il geriatra, il fisioterapista e l'infermiere  
 C il geriatra, il fisioterapista e il podologo  
 D il geriatra, il dietista e l'infermiere  
 E il medico di medicina generale, il geriatra, l'infermiere e l'assistente sociale
280. Il valore di glicemia a digiuno per porre diagnosi di diabete nell'anziano è:  
 A >200 mg/dl  
 B >180 mg/dl  
 C >160 mg/dl  
 D >140 mg/dl  
 E\* >125 mg/dl
281. Per poter fare diagnosi di Malattia di Alzheimer è richiesta l'assenza di:  
 A lesioni lacunari cerebrali  
 B ictus  
 C alterazioni metaboliche  
 D\* tutte  
 E nessuna
282. Quale fra i seguenti esami diagnostici richiederesti per primo nel caso di sospetto di lesioni ostruttive in sede carotidea?  
 A elettroencefalogramma  
 B oftalmodinamometria  
 C reografia cerebrale  
 D\* eco-Doppler dei tronchi sovraortici  
 E scintigrafia cerebrale
283. Individuare l'affermazione sbagliata riguardo all'ulcera gastrica:  
 A è una patologia cronica  
 B\* i pazienti che guariscono non hanno il rischio di recidive  
 C la guarigione è seguita da episodi di esacerbazione  
 D il processo di guarigione è prolungato negli anziani  
 E il risultato della terapia medica negli anziani è scarso
284. Sono fattori associati all'insorgenza delle ulcere da pressione:  
 A linfocitopenia  
 B ipoalbuminemia  
 C calo ponderale  
 D riduzione dello spessore della plica tricipitale  
 E\* tutte
285. Com'è, nell'anziano, il numero dei linfociti B circolanti in grado di rispondere agli antigeni?  
 A\* ridotto  
 B aumentato  
 C normale  
 D assente  
 E aumentato in caso di sindrome di De George
286. Il disturbo di tipo bipolare è:  
 A uno stato depressivo nevrotico  
 B uno stato depressivo su base tossica  
 C uno stato depressivo da somatizzazione tipico dell'anziano  
 D uno stato depressivo delirante tipico dell'anziano  
 E\* caratterizzato da uno o più episodi maniacali, con o senza episodi di depressione
287. La terapia trombolitica endovenosa in pazienti anziani con IMA:  
 A\* riduce la mortalità, anche se in misura inferiore rispetto a pazienti più giovani  
 B aumenta la mortalità  
 C non è utile nei pazienti anziani  
 D non può essere utilizzata nelle prime ore successive all'IMA acuto  
 E non si realizza affatto per via endovenosa
288. L'insorgenza dell'ulcera da pressione con quanti movimenti spontanei notturni è correlata?  
 A 51  
 B 45  
 C 30  
 D\* meno di 20  
 E non c'è correlazione tra i due eventi
289. La dose abituale di idroclorotiazide nel trattamento dell'ipertensione sistolica isolata è:  
 A 1 mg/die

- B\* 12,5 mg/die  
 C 25 mg/die  
 D 50 mg/die  
 E nessuna delle precedenti
290. Nella valutazione preoperatoria di un paziente anziano è richiesta l'emogasanalisi in presenza di:  
 A sintomi respiratori  
 B obesità  
 C cifoscoliosi  
 D procedure programmate sui quadranti addominali superiori  
 E\* tutte
291. Qual è l'agente eziologico più frequentemente responsabile delle infezioni delle vie urinarie nell'anziano?  
 A\* Escherichia coli  
 B Proteus  
 C Klebsiella  
 D Pseudomonas  
 E Enterococcus
292. La valutazione del danno d'organo in un paziente iperteso comprende:  
 A esame della retina  
 B esame dei polsi periferici  
 C ECG e RX torace  
 D\* tutte le precedenti  
 E nessuno dei precedenti
293. Quale tra le seguenti è causa di sincope ?  
 A diuretici  
 B Ca-antagonisti  
 C stenosi aortica  
 D\* tutte le precedenti  
 E nessuna delle precedenti
294. L'ipertrofia prostatica benigna si sviluppa:  
 A\* nella zona di transizione  
 B nella zona periferica esterna  
 C nella stessa zona dell'adenocarcinoma  
 D indifferentemente in tutta la prostata  
 E nessuna
295. Nei pazienti di età >65 anni operati di by-pass aorto-coronarico, qual'è la frequenza di sopravvivenza post-operatoria a 5 anni?  
 A\* >80%  
 B 65%  
 C 55%  
 D 40%  
 E 30%
296. Nell'anziano i T-linfociti sono:  
 A assenti  
 B\* diminuiti  
 C invariati  
 D aumentati  
 E molto aumentati
297. Quale dei seguenti segni o sintomi è poco frequente nei pazienti anziani con appendicite?  
 A nausea  
 B anoressia  
 C\* vomito  
 D vago fastidio addominale  
 E nessuno
298. Nei pazienti con stenosi carotidea sintomatica l'endoarterectomia offre sicuri benefici quando la stenosi è del:  
 A 30-70%  
 B\* 70-99%  
 C sempre indipendentemente dal grado di stenosi  
 D in nessun paziente trattato  
 E nessuna affermazione è corretta
299. Il delirium tremens comporta tutti questi sintomi eccetto:  
 A deterioramento cognitivo globale  
 B difficoltà nell'attenzione  
 C riduzione del livello di coscienza  
 D alterazione del ritmo sonno-veglia
- E\* nessuna delle precedenti
300. Nell'anziano il criterio diagnostico per la diagnosi di diabete mellito è:  
 A\* valore della glicemia a digiuno  
 B test di tolleranza al glucosio  
 C prove con tolbutamide e glucocorticoidi  
 D tutte  
 E nessuna
301. Nel trattamento della diarrea, quali antibiotici sono usati?  
 A ciprofloxacina  
 B norfloxacina  
 C aciclovir  
 D amfotericina  
 E\* a + b
302. Cosa sono le placche senili?  
 A accumuli di lipocromo  
 B accumuli di mielina  
 C\* accumuli di sostanza amiloide + astrociti + cellule gliali + neuriti  
 D accumuli di lipofuscina  
 E accumuli di melanina
303. Per lo screening del tumore della mammella, l'autopalpazione del seno deve essere effettuata con frequenza:  
 A\* mensile  
 B annuale  
 C ogni 1-2 anni  
 D ogni 6 mesi  
 E ogni 5 anni
304. L'intossicazione da digitale, frequente nel paziente anziano, si manifesta con i seguenti segni o sintomi:  
 A diarrea  
 B nausea e disappetenza  
 C aritmie ipercinetiche in presenza di ipokalemia  
 D bradiaritmie  
 E\* tutte le precedenti
305. Nella valutazione della perdita di liquidi in pazienti anziani sono utili:  
 A livelli sierici di elettroliti  
 B proteine plasmatiche totali  
 C osmolalità plasmatica  
 D a + b  
 E\* b + c
306. Per disartria si intende:  
 A\* incapacità di articolare in modo adeguato le parole per una lesione del S.N.C. o S.N.P.  
 B una alterazione della comprensione del linguaggio  
 C un movimento anomalo involontario  
 D tutte le precedenti  
 E nessuna delle precedenti
307. Quale tipo di anemia è generalmente associata a malattie linfoproliferative nell'anziano?  
 A sideroblastica  
 B talassemia  
 C\* emolitica  
 D sideropenica  
 E infiammatoria
308. Lo stadio II delle ulcere da pressione nell'anziano è caratterizzato da:  
 A eritema cutaneo persistente alla digitopressione  
 B danno o necrosi del tessuto sottocutaneo che può estendersi non oltre la fascia muscolare sottostante  
 C perdita cutanea estesa, necrosi tissutale o danno muscolare-osseo  
 D tutte le precedenti  
 E\* perdita di spessore parziale di cute interessando epidermide e /o derma
309. E' un sintomo specifico della malattia di Alzheimer:  
 A tremore cinetico  
 B iperreflessia  
 C\* perdita della memoria  
 D linguaggio conservato  
 E abilità visuo-spaziale intatta
310. Il terzo stadio nella classificazione delle ulcere da decubito corrisponde a:

- A ulcera superficiale  
 B eritema persistente alla digito-pressione  
 C perdita cutanea estesa con necrosi tissutale o danno muscolare-osseo  
 D prurito e secchezza cutanea  
 E\* danno-necrosi del sottocute non oltre la fascia muscolare
311. Qual'è la triade sintomatologica peculiare del morbo di Parkinson nell'anziano?  
 A\* tremori, bradicinesia, rigidità  
 B tremori, cefalea, scialorrea  
 C rigidità, tremori, discinesia  
 D tremori, cefalea, steatorrea  
 E vertigini, tremori, vomito
312. L'acalasia è:  
 A\* assenza di peristalsi esofagea  
 B contrazioni non peristaltiche con periodi di peristalsi normale  
 C peristalsi normale con onde di ampiezza elevata  
 D turbe aspecifiche della malattia esofagea  
 E ipertensione dello S.E.I.
313. Nella prescrizione degli analgesici nei pazienti con dolore bisogna tener conto che nell'anziano viene modificato:  
 A assorbimento  
 B distribuzione  
 C metabolismo  
 D escrezione  
 E\* tutte le precedenti
314. E' diagnostico per la malattia di Parkinson:  
 A\* esame obiettivo  
 B esami di laboratorio  
 C TAC  
 D RMN  
 E esame del liquido cerebrospinale
315. L'insufficienza pancreatica nell'anziano si presenta con:  
 A\* steatorrea massiva  
 B dolore epigastrico sempre presente  
 C iperpigmentazione cutanea  
 D ematemesi  
 E prurito
316. Possibili cause di iperglicemia nel paziente anziano sono:  
 A Sindrome di Cushing  
 B acromegalia  
 C iperaldosteronismo  
 D\* tutte le citate  
 E nessuna delle citate
317. Qual'è la sede dell'aneurisma aortico di più frequente riscontro nell'anziano?  
 A aneurisma dell'aorta ascendente  
 B aneurisma dell'aorta discendente  
 C aneurisma dell'arco aortico  
 D\* aneurisma addominale sottorenale  
 E aneurisma addominale soprarenale
318. E' una strategia preventiva utile per ridurre la morte per vasculopatia aterosclerotica nell'anziano:  
 A riduzione dell'attività fisica  
 B mantenimento dell'introito di calcio  
 C\* riduzione dell'introito lipidico  
 D esposizione al sole  
 E nessuna delle precedenti
319. Il deficit di tutte queste sostanze tranne una è responsabile di neuropatie nutrizionali, quale?  
 A tiamina  
 B piridossina  
 C\* alcool  
 D acido pantotenico  
 E acido folico
320. Nella valutazione iniziale dell'ipertensione nell'anziano quali indagini di laboratorio non si effettuano:  
 A esame delle urine  
 B elettrolitemia  
 C\* sideremia  
 D creatinemia  
 E calcemia
321. La perdita improvvisa e transitoria del visus in soggetti con retinopatia diabetica può conseguire a:  
 A sviluppo di glaucoma  
 B formazione di cataratta  
 C formazione di microaneurismi  
 D\* emorragie nel vitreo  
 E nessuna delle citate
322. Quali delle seguenti caratteristiche è tipica del dolore dell'attacco gottoso?  
 A è intermittente  
 B si risolve con il movimento  
 C migliora durante la notte  
 D\* interessa un'unica articolazione periferica  
 E non si associa a segni di flogosi
323. Il carcinoma della prostata più frequente è:  
 A carcinoma a cellule di transizione  
 B carcinoma a cellule squamose  
 C sarcoma  
 D carcinoma basocellulare  
 E\* adenocarcinoma
324. Il 60% dei pazienti anziani con carcinoma gastrico al momento della diagnosi si trovano nello stadio:  
 A I stadio  
 B II stadio  
 C III stadio  
 D\* IV stadio  
 E tutti
325. Il dolore della neuropatia periferica viene trattato con tutti i seguenti farmaci tranne:  
 A carbamazepina  
 B antidepressivi triciclici  
 C\* FANS  
 D benzodiazepine  
 E fenitoina
326. Sono microrganismi patogeni responsabili di infezioni frequenti delle vie urinarie nell'anziano tutti tranne  
 A Proteus  
 B Klebsiella  
 C Enterobacter  
 D Enterococco  
 E\* Staphylococcus aureus
327. La malattia di Parkinson colpisce:  
 A soprattutto le donne  
 B donne e uomini con la stessa frequenza  
 C\* soprattutto i maschi  
 D maschi < 50 anni  
 E donne < 50 anni
328. Gli enzimi proteolitici sono usati nella terapia delle ulcere da pressione:  
 A\* perchè facilitano la rimozione del tessuto necrotico  
 B quando il fondo dell'ulcera è deterso  
 C se il fondo dell'ulcera comincia a granuleggiare  
 D tutte  
 E nessuna
329. Quale alterazione della vista è più frequente nell'anziano:  
 A presbiopia  
 B riduzione acuità visiva  
 C ridotto adattamento all'oscurità  
 D nessuna delle citate  
 E\* tutte le citate
330. L'anemia sideropenica nell'anziano può essere dovuta a:  
 A deficit di folati  
 B deficit di vitamina B12  
 C\* sanguinamento da tumori del tratto gastroenterico  
 D nessuna delle precedenti  
 E tutte le precedenti



331. Tra le malattie dell'esofago la più frequente nell'anziano è:  
 A cancro  
 B esofagite peptica  
 C\* reflusso gastroesofageo  
 D diverticoli  
 E discinesie
332. L'aspettativa di vita alla nascita per le donne in Italia nel 1996 era:  
 A\* 80 anni  
 B 78 anni  
 C 76 anni  
 D 75 anni  
 E 82 anni
333. La sintomatologia della "claudicatio intermittens" nel vecchio:  
 A si verifica durante la deambulazione  
 B è localizzata al polpaccio  
 C si risolve con il riposo  
 D si accompagna a parestesie  
 E\* tutte le precedenti
334. La presbiopia è:  
 A una riduzione età-correlata della funzionalità uditiva  
 B\* una modificazione del visus età-correlata che si manifesta universalmente dopo i 40 anni  
 C l'incapacità di distinguere i colori  
 D una delle complicanze del diabete mellito scompensato  
 E una patologia a carico della retina
335. Quale tra i seguenti indici dello stato nutrizionale è quello più sensibile?  
 A albuminemia  
 B\* proteina legante il retinolo  
 C transferrinemia  
 D tutte  
 E nessuna
336. Cause di ipokaliemia nell'anziano sono:  
 A ipoaldosteronismo  
 B assunzione di spironolattone  
 C\* assunzione di diuretici dell'ansa  
 D morbo di Addison  
 E coma iperosmolare
337. Una ipertrofia prostatica benigna con sintomi prevalentemente irritativi va in diagnosi differenziale con:  
 A carcinoma vescicale  
 B vescica neurogena  
 C infezione urinaria  
 D\* tutte  
 E nessuna
338. Nell'infarto miocardico dell'anziano il dolore stenocardico è:  
 A assente  
 B\* frequente meno che nel giovane  
 C frequente più che nel giovane  
 D costante  
 E incoercibile
339. Quale tra le seguenti è la complicanza più seria delle ulcere da pressione?  
 A infezione locale  
 B cellulite  
 C osteomielite  
 D artrite  
 E\* sepsi
340. Le ulcere da pressione possono presentarsi come:  
 A eritema  
 B zone disepitelizzate  
 C vescicole  
 D escara  
 E\* tutte
341. Quale delle seguenti affermazioni sulla dermatite da pannolone nell'anziano non è esatta?  
 A\* colpisce soprattutto le pieghe cutanee  
 B è una reazione di tipo non-immunologico  
 C è una dermatite da contatto  
 D è una dermatite irritante  
 E l'eruzione acuta è di tipo eritematoso
342. I disturbi della memoria nell'anziano colpiscono più precocemente:  
 A i ricordi lontani  
 B indifferentemente i ricordi lontani e recenti  
 C\* i ricordi più recenti  
 D solo i ricordi legati ad eventi tragici  
 E solo i ricordi legati alla propria pregressa attività lavorativa
343. Il paziente con carcinoma prostatico può presentare i seguenti sintomi:  
 A dolore osseo  
 B asintomatico  
 C fratture patologiche  
 D\* tutti  
 E nessuno
344. I diabetici hanno una tipica predisposizione allo sviluppo precoce dell'aterosclerosi a livello di:  
 A\* arteria tibio-peroneale  
 B segmenti prossimali dell'arteria femorale superficiale  
 C arteria iliaca comune  
 D arteria intercostale  
 E arteria femorale
345. Sono più aterogene le:  
 A HDL  
 B APO A  
 C APO B  
 D IDL  
 E\* LDL
346. Il "drop-attack" (caduta a terra improvvisa senza perdita di coscienza) è un sintomo caratteristico di quale malattia?  
 A grande Male  
 B crisi ipoglicemica  
 C piccolo Male  
 D insufficienza carotidea  
 E\* ischemia vertebro-basilare
347. Quale, tra le seguenti condizioni, non è causa di convulsioni nell'anziano?  
 A morbo di Alzheimer  
 B astinenza da benzodiazepine  
 C trauma cranico  
 D insufficienza renale  
 E\* sindrome di De Quervain
348. Le ulcere che emanano cattivo odore sono verosimilmente infettate da:  
 A germi aerobi  
 B l'assenza di cattivo odore esclude l'infezione  
 C\* germi anaerobi  
 D la presenza di cattivo odore fa fare diagnosi di certezza  
 E parassiti
349. Sono malattie infettive frequenti nell'anziano:  
 A batteremia-sepsi  
 B broncopneumonia  
 C TBC  
 D endocardite infettiva  
 E\* tutte le precedenti
350. Sono cause di demenza non reversibile :  
 A malattie degenerative  
 B demenze post-traumatiche  
 C malattia di Creutzfeldt-Jacob  
 D infezioni SNC  
 E\* tutte