

Domande relative alla specializzazione in: Geriatria

Domanda #1 (codice domanda: n.321) :

Quale delle seguenti condizioni è MENO implicata nella patogenesi dell'osteoporosi in un paziente di età superiore a 65 anni?

- A: Terapia cronica con antinfiammatori non steroidei
- B: Terapia cronica con cortisonici
- C: Insufficienza renale
- D: Allettamento prolungato

Domanda #2 (codice domanda: n.322) :

Quale delle seguenti affermazioni circa la farmacocinetica nel paziente anziano è ERRATA?

- A: I livelli sierici di albumina sono usualmente aumentati e ciò riduce l'effetto di numerosi farmaci
- B: Vi è una riduzione del metabolismo epatico di molti farmaci eliminati dal citocromo p450
- C: L'escrezione renale è generalmente ridotta a causa della riduzione della massa e del flusso ematico
- D: Vi è in media un incremento del grasso corporeo, con un conseguente aumento dell'emivita dei farmaci lipofili

Domanda #3 (codice domanda: n.323) :

Quale delle seguenti affermazioni circa le vaccinazioni nell'anziano è ERRATA?

- A: Gli effetti avversi connessi alla pratica vaccinale nei pazienti anziani superano sempre i potenziali benefici
- B: La vaccinazione anti-influenzale andrebbe consigliata a tutti i pazienti con età maggiore di 65 anni, salvo controindicazioni specifiche
- C: È preferibile evitare, se possibile, la somministrazione di preparazioni vaccinali contenenti patogeni vivi
- D: La risposta immunitaria alle vaccinazioni è generalmente ridotta rispetto a quanto osservato nei giovani

Domanda #4 (codice domanda: n.324) :

Tutti i seguenti fattori concorrono alla riduzione della massa ossea, ECCETTO:

- A: obesità
- B: terapia prolungata con glucocorticoidi
- C: abuso di alcool
- D: immobilizzazione prolungata

Domanda #5 (codice domanda: n.325) :

Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le ulcere da decubito è ERRATA?

- A: La causa principale della loro insorgenza è un'infezione della cute non riconosciuta tempestivamente
- B: Sacro, malleoli e calcagno sono tra le sedi più frequenti
- C: Condizioni favorevoli al loro sviluppo sono malattie quali il diabete o la malattia vascolare periferica
- D: L'impiego di corticosteroidi è associato alla loro comparsa

Scenario 1:

A un controllo di routine degli esami, viene riscontrato a un uomo di 69 anni un valore di antigene prostatico specifico di 7 ng/mL con una frazione libera pari all'8% del PSA totale.

Domanda #6 (codice domanda: n.326) - (riferita allo scenario n. 1) :

Qual è la strategia diagnostica più appropriata?

- A: Richiedere un'ecografia prostatica transrettale con biopsia
- B: Ripetere il controllo del PSA dopo 12 mesi
- C: Eseguire esplorazione rettale e, se negativa, rassicurare il paziente
- D: Richiedere un'ecografia dell'addome inferiore con studio della prostata

Scenario 2:

Un uomo di 75 anni lamenta da tempo astenia e stipsi, ed è aumentato di peso, ma con scarso appetito. Gli esami mostrano un TSH di 10 mU/L che 3 mesi prima era pari a 6.

Domanda #7 (codice domanda: n.327) - (riferita allo scenario n.2) :

Quale delle seguenti condizioni NON è tipicamente associata alla condizione clinica sofferta dalla paziente?

- A: Adenoma ipofisario
- B: Presenza di anticorpi anti-tiroidei
- C: Pregresso trattamento con radioiodio
- D: Pregressa terapia con amiodarone

Domanda #8 (codice domanda: n.328) - (riferita allo scenario n.2) :

Qual è la strategia terapeutica più appropriata?

- A: Iniziare un trattamento con basse dosi di levotiroxina, incrementandola fino a ottenere valori di TSH normali
- B: Iniziare terapia corticosteroidica nel sospetto di tiroidite autoimmune
- C: Somministrare metimazolo
- D: Somministrare propiltiouracile

Scenario 3:

Paziente donna di 82 anni giunge all'osservazione per dolore al cingolo scapolare bilateralmente e al collo, nonché alle anche e alle gambe, esordito circa un mese prima e non responsivo alla terapia con antinfiammatori non steroidei (FANS). Gli esami mostrano un significativo aumento degli indici di flogosi (VES 67 mm/1h).

Domanda #9 (codice domanda: n.329) - (riferita allo scenario n.3) :

Qual è la diagnosi più probabile?

- A: Polimialgia reumatica
- B: Artrite reumatoide
- C: Ernia del disco C3-C4
- D: Osteoporosi grave

Scenario 4:

Una donna di 86 anni viene valutata in un centro di geriatria e dimessa con diagnosi di demenza.

Domanda #10 (codice domanda: n.330) - (riferita allo scenario n.4) :

Quale dei seguenti sintomi è MENO tipico di una demenza in fase iniziale?

- A: Difficoltà nella coordinazione nella deglutizione
- B: Labilità emotiva
- C: Cambiamenti di personalità
- D: Difficoltà a trovare le parole corrette