

## Domande relative alla specializzazione in: Psichiatria

### Domanda #1 (codice domanda: n.591) :

Qual è la performance richiesta dall'n-back test?

- A: L'n-back test presenta una sequenza di stimoli (es. numeri, figure, forme) e richiede di indicare quando lo stimolo corrente è il medesimo presentato nella sequenza in posizione n volte precedente
- B: L'n-back test richiede di associare una serie di simboli a una serie di numeri
- C: L'n-back test richiede, a partire da 100, il numero 7 per 5 volte, pronunciando i risultati delle sottrazioni volta per volta
- D: L'n-back test richiede di memorizzare sequenze di lunghezza di numeri di lunghezza crescente di un'unità per volta fino a 9 cifre

### Domanda #2 (codice domanda: n.592) :

Le allucinazioni sono tipiche:

- A: dei disturbi psichiatrici dovuti a condizione medica generale
- B: del disturbo bipolare
- C: del disturbo depressivo maggiore
- D: dei disturbi dissociativi

### Domanda #3 (codice domanda: n.593) :

La convinzione che i propri cari siano stati sostituiti da impostori a loro identici prende il nome di:

- A: Sindrome di Capgras
- B: Sindrome di Korsakoff
- C: Sindrome di Cotard
- D: Sindrome di Münchhausen

### Domanda #4 (codice domanda: n.594) :

Tra i seguenti antipsicotici quello che presenta una più lunga emivita e quindi viene somministrato preferibilmente una volta al giorno è:

- A: aripirazolo
- B: risperidone
- C: aloperidolo
- D: ziprasidone

**Domanda #5 (codice domanda: n.595) :**

L'insalata di parole NON è associata a quale di queste condizioni psicopatologiche?

- A: Disturbo Depressivo Maggiore
- B: Disturbo Bipolare
- C: Disturbo Schizoaffettivo
- D: Intossicazione da psicostimolanti

**Domanda #6 (codice domanda: n.596) :**

Quale tra questi farmaci è un antipsicotico tipico?

- A: Clorpromazina
- B: Lamotrigina
- C: Amitriptilina
- D: Clozapina

## Scenario 1:

Una paziente di 19 anni accede al Servizio Psichiatrico perché presenta repentine oscillazioni dell'umore, impulsività, aggressività contro oggetti e contro persone, e talvolta si incide gli avambracci con oggetti taglienti. Questo quadro è esordito da circa tre mesi dopo la rottura di una relazione sentimentale tormentata e non emergono precedenti sintomi, sebbene venga descritta dai familiari come "troppo emotiva" da sempre. A colloquio è perfettamente adeguata, riferisce di avere molti amici e conoscenti e non emergono disturbi del pensiero né della percezione. Ammette di aver iniziato ad assumere cannabis e cocaina da circa 3 settimane per colmare una sensazione di vuoto interiore. Dice anche che pensava di non presentarsi alla visita perché 3 giorni fa ha conosciuto un nuovo amico e si sente felice.

**Domanda #7 (codice domanda: n.597) - (riferita allo scenario n. 1) :**

Da quale disturbo (secondo diagnosi DSM) è verosimilmente portatrice la paziente?

- A: Disturbo Borderline di personalità
- B: Disturbo schizoide di personalità
- C: Episodio depressivo maggiore
- D: Un disturbo indotto da sostanze, associato all'abuso di sostanze

**Domanda #8 (codice domanda: n.598) - (riferita allo scenario n.1) :**

Quale trattamento sarà indicato alla paziente, a questo stato di evoluzione del disturbo?

- A: Un trattamento integrato farmacologico e psicoterapeutico
- B: Un trattamento farmacologico con un antidepressivo
- C: Un trattamento farmacologico con benzodiazepine
- D: Solo psicoterapia

**Domanda #9 (codice domanda: n.599) - (riferita allo scenario n.1) :**

Che cosa si intende per acting-out, manifestazione del disturbo di cui è verosimilmente portatrice la paziente?

- A: Un meccanismo di difesa, che opera trasferendo senza alcuna elaborazione il conflitto intrapsichico in un atto, o anche l'atto stesso che viene compiuto
- B: Una modalità di attaccamento insicuro
- C: Una personalità connotata da impulsività, instabilità emotiva e intolleranza alle frustrazioni
- D: Un episodio di panico in seguito a un evento traumatico

**Domanda #10 (codice domanda: n.600) - (riferita allo scenario n.1) :**

La paziente viene accompagnata in Pronto Soccorso in stato confusionale da un amico: PA 85/70, FC 120 aritmico, sat 96%, glicemia 85 mg/dl. Emerge che ha assunto un'importante dose di cocaina e nessun'altra sostanza. Quale esame diagnostico conviene venga eseguito per primo per escludere una conseguenza potenzialmente mortale dell'assunzione della droga?

- A: Un elettrocardiogramma
- B: Una radiografia del torace
- C: Una Risonanza Magnetica dell'encefalo
- D: Esami ematochimici e delle urine