

Domande relative alla specializzazione in: Ginecologia ed Ostetricia

Domanda #1 (codice domanda: n.331) :

Lo Sniff test individua la presenza di:

- A: vaginosi batterica
- B: infezione da Trichomonas
- C: infezione da Clamidia
- D: infezione da Micoplasma

Domanda #2 (codice domanda: n.332) :

Il punteggio di Bishop valuta:

- A: la possibilità di successo dell'induzione del travaglio
- B: lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari
- C: la maturazione follicolare
- D: il rischio di preeclampsia

Domanda #3 (codice domanda: n.333) :

Che farmaco contengono gli IUD medicati?

- A: Levonorgestrel
- B: Desogestrel
- C: Medrossiprogesterone acetato
- D: Enantone

Domanda #4 (codice domanda: n.334) :

Individuare l'affermazione NON corretta relativa alla PID (Malattia Infiammatoria Pelvica).

- A: Raramente interessa la tuba
- B: È più frequente nelle donne tra 20-30 anni
- C: È collegata alla molteplicità dei partner sessuali
- D: Uno degli agenti eziologici è la Chlamydia Trachomatis

Scenario 1:

Una ragazza di 16 anni presenta oligomenorrea e ipertricosi.

Domanda #5 (codice domanda: n.335) - (riferita allo scenario n.1) :

Quale tra questi esami NON è indicato?

- A: Ecografia epatica
- B: Dosaggio degli androgeni e del rapporto LH/FSH
- C: Dosaggio della prolattina
- D: Ecografia pelvica

Scenario 2:

Ad una paziente di 30 anni, nullipara, viene posto il sospetto diagnostico di endometriosi pelvica.

Domanda #6 (codice domanda: n.336) - (riferita allo scenario n.2) :

Quale dei seguenti trattamenti dell'endometriosi è ERRATO?

- A: Estrogeni
- B: Estroprogestinici
- C: Danazolo
- D: Progestinici

Domanda #7 (codice domanda: n.337) - (riferita allo scenario n.2) :

Tutti i seguenti sintomi riportati dalla paziente sono coerenti con l'ipotesi diagnostica TRANNE uno. Quale?

- A: Ipomenorrea
- B: Dismenorrea
- C: Dispareunia
- D: Disuria

Scenario 3:

Una donna di 50 anni si presenta chiedendo informazioni relative al papilloma virus umano (HPV) e alla vaccinazione che le hanno proposto per la figlia di 12 anni.

Domanda #8 (codice domanda: n.338) - (riferita allo scenario n.3) :

In relazione alla vaccinazione, la paziente viene informata che esistono due tipi di vaccini: il bivalente e il quadrivalente, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- A: entrambi i vaccini sono altamente immunogenici ed efficaci
- B: uno viene somministrato con iniezione endovenosa e l'altro con iniezione sottocutanea
- C: il bivalente richiede 2 somministrazioni e il quadrivalente 4 somministrazioni
- D: la vaccinazione è assolutamente sicura anche in gravidanza

Domanda #9 (codice domanda: n.339) - (riferita allo scenario n.3) :

Quale delle seguenti affermazioni relative a pap test e HPV è FALSA?

- A: Un PAP test annuale tra i 20 e i 29 anni ha probabilità di non diagnosticare una lesione di circa il 5%
- B: Un singolo PAP test ha una sensibilità dell'85% per HPV
- C: Il PAP test ha una specificità per le lesioni indotte dal virus del 95%
- D: Il PAP test consente di diagnosticare il 90% delle neoplasie cervicali se ripetuto ogni 3 anni

Scenario 4:

Una paziente in occasione di una visita di controllo vi esprime perplessità relative al fatto che la figlia di 12 anni ha uno sviluppo fisico adeguato alla sua età (97° percentile, comparsa di peli e iniziale ingrossamento delle mammelle) ma non ha ancora avuto il menarca, a differenza di molte sue compagne di classe. La bambina è nata con parto eutocico dopo una gravidanza normodecorsa, è sana e ha una vita attiva adeguata alla sua età.

Domanda #10 (codice domanda: n.340) - (riferita allo scenario n.4) :

Quale delle seguenti informazioni vi porta a considerare la diagnosi di imene imperforato?

- A: Frequenti accessi in pronto soccorso per dolore addominale rimasti senza diagnosi
- B: Consistente riduzione della massa grassa per veloce crescita in altezza
- C: Perdita di abbondanti secrezioni mucose dalla vagina
- D: Recente diagnosi di celiachia

