

## Domande relative alla specializzazione in: Chirurgia maxillo-facciale

Domanda #1 (codice domanda: n.221) :

La parotidectomia può essere eseguita con diverse tecniche, che dipendono dalla situazione clinica di partenza. L'obiettivo della chirurgia è ovviamente quello di asportare il tumore e identificare e preservare il più possibile il nervo che si trova nel contesto parotideo. Di quale nervo si tratta?

- A: Del nervo facciale
- B: Del nervo mandibolare
- C: Del nervo zigomatico
- D: Del nervo buccinatore

Domanda #2 (codice domanda: n.222) :

La frattura di Le Fort I:

- A: è una frattura trasversale del mascellare superiore
- B: è una frattura trasversale della mandibola
- C: non necessita mai di riduzione chirurgica
- D: interessa sempre la cavità orbitaria

Domanda #3 (codice domanda: n.223) :

La oloprosencefalia:

- A: nella sua variante estrema è detta ciclopia
- B: si manifesta solo in presenza di schisi del labbro
- C: è una condizione in cui vi è mancato sviluppo delle strutture derivate dai processi mandibolari
- D: è una condizione in cui vi è sempre presente ipertelorismo

Domanda #4 (codice domanda: n.224) :

La sindrome di Parry-Romberg è:

- A: progressiva
- B: presente alla nascita
- C: autosomica dominante
- D: sempre bilaterale

**Domanda #5 (codice domanda: n.225) :**

La classificazione di Tessier è relativa a:

- A: schisi facciali
- B: agenesie dentali
- C: tumori del cavo orale
- D: cisti e fistole laterali del collo

**Domanda #6 (codice domanda: n.226) :**

La microtia:

- A: è un'ipoplasia di grado variabile del padiglione auricolare associata talvolta a ipoplasia dell'orecchio medio
- B: è un'ipoplasia di grado variabile dell'orecchio medio
- C: è una condizione in cui è opportuno intervenire chirurgicamente entro il primo anno di età del paziente
- D: è una condizione in cui, anche nei casi più complessi, il condotto uditivo esterno è sempre presente

**Domanda #7 (codice domanda: n.227) :**

Quale dei seguenti tumori delle ghiandole salivari è maligno?

- A: Tumore mucoepidermoidale
- B: Cistoadenolinfoma
- C: Adenoma pleiomorfo
- D: Adenoma monomorfo

**Domanda #8 (codice domanda: n.228) :**

Il nervo trigemino è:

- A: il V nervo cranico
- B: il VII nervo cranico
- C: il III nervo cranico
- D: il VI nervo cranico

## Scenario 1:

Si consideri un paziente con ipoplasia dei padiglioni auricolari, una atresia dei condotti uditivi esterni, anomalie nella catena degli ossicini con conseguente sordità di trasmissione, ipoplasia delle ossa malari e zigomatiche, con una obliquità antimongolica delle rime palpebrali, coloboma della palpebra inferiore con assenza delle ciglia sul 1/3 inferiore, ipoplasia mandibolare e schisi palatina. Le malformazioni facciali sono bilaterali e asimmetriche. L'intelligenza è normale.

Domanda #9 (codice domanda: n.229) - (riferita allo scenario n.1) :

Il paziente è affetto da:

- A: sindrome di Treacher Collins
- B: sindrome di Apert
- C: sindrome di Crouzon
- D: sindrome di Romberg

## Scenario 2:

Un paziente di 50 anni si presenta nel vostro ambulatorio. In anamnesi forte fumatore, bevitore di superalcolici. Presenta una lesione ulcerata con un cratere centrale, dolente, al pavimento orale.

Domanda #10 (codice domanda: n.230) - (riferita allo scenario n.2) :

A quale condizione clinica si deve immediatamente pensare?

- A: Carcinoma del cavo orale
- B: Leucoplachia
- C: Papilloma
- D: Shwannoma