

Domande relative alla specializzazione in: Radioterapia

Domanda #1 (codice domanda: n.1281) :

Quali indagini vanno eseguite nella stadiazione del carcinoma del colon-retto?

- A: TC Torace addome
- B: L'ecografia epatica e la scintigrafia ossea
- C: Rx torace
- D: L'RM addome

Domanda #2 (codice domanda: n.1282) :

Qual è il trattamento adiuvante più indicato per il carcinoma del retto localmente avanzato (pT3-T4)?

- A: Chemioterapia + Radioterapia
- B: Sola chemioterapia
- C: Sola ormonoterapia
- D: Sola radioterapia

Domanda #3 (codice domanda: n.1284) :

Qual è l'obiettivo della radioterapia nel trattamento dei tumori vescicali localmente avanzati?

- A: Radicale o adiuvante o palliativo
- B: Solo radicale
- C: Solo adiuvante
- D: Solo palliativo

Scenario 1:

Una donna di 50 anni si presenta all'osservazione del medico con una tumefazione sospetta al seno.

Domanda #4 (codice domanda: n.1287) - (riferita allo scenario n. 1) :

Quali esami diagnostici è corretto richiedere?

- A: Esame clinico, mammografia ed ecografia mammaria
- B: RM mammaria
- C: Scintigrafia con tecnezio
- D: Direttamente esame biptico

Domanda #5 (codice domanda: n.1288) - (riferita allo scenario n. 1) :

In quale situazione clinica è corretto richiedere la RM mammaria?

- A: Ricerca di multicentricità, multifocalità, bilateralità, in caso di neoplasie già diagnosticate con tecniche tradizionali
- B: Solo in donne con assenza di familiarità per carcinoma mammario
- C: Solo in gravidanza
- D: Se la paziente è portatrice di pacemaker o protesi metallica

Domanda #6 (codice domanda: n.1289) - (riferita allo scenario n. 1) :

Dopo la chirurgia senologica, l'imaging radiologico nell'impostazione del trattamento radiante è necessario per:

- A: identificare il target e pianificare l'iter terapeutico
- B: identificare il linfonodo sentinella
- C: verificare il corretto posizionamento delle clips metalliche
- D: verificare il corretto posizionamento dell'espansore

Scenario 2:

Paziente di 60 anni, affetta da plurime metastasi encefaliche da neoplasia mammaria. La paziente verrà sottoposta a radioterapia a scopo palliativo a livello panencefalico.

Domanda #7 (codice domanda: n.1292) - (riferita allo scenario n.2) :

Quale dei seguenti farmaci deve essere prescritto alla paziente, da assumere in concomitanza al trattamento radioterapico?

- A: Cortisonico
- B: Anti-infiammatorio non steroideo
- C: Anti-coagulante
- D: Anti-ipertensivo

Scenario 3:

Paziente di 57 anni affetto da adenocarcinoma della prostata, Gleason 4+4:8, PSA 10.12 ng/ml. In anamnesi nessun'altra nessuna patologia di rilievo riferita.

Domanda #8 (codice domanda: n.1294) - (riferita allo scenario n.3) :

Qual è l'approccio terapeutico più corretto per questo paziente?

- A: Radioterapia + ormonoterapia
- B: Sola ormonoterapia
- C: Chemioterapia + radioterapia
- D: Chemioterapia

Scenario 4:

Paziente in corso di radioterapia per una neoplasia della tonsilla.

Domanda #9 (codice domanda: n.1296) - (riferita allo scenario n.4) :

Quale tra i seguenti effetti collaterali, correlati alla radioterapia, potrebbe presentare?

- A: Xerostomia
- B: Alopecia
- C: Diarrea
- D: Nausea

Scenario 5:

Un paziente di 65 anni, è in corso di radioterapia per un adenocarcinoma della prostata

Domanda #10 (codice domanda: n.1298) - (riferita allo scenario n.5) :

Quale tra i seguenti effetti collaterali, correlati alla radioterapia, potrebbe tipicamente presentare?

- A: Stranguria
- B: Vomito
- C: Eemicrania
- D: Febbre