

Domande relative alla specializzazione in: Malattie Infettive e Tropicali

Domanda #1 (codice domanda: n.381) :

Individuare, tra i seguenti, il farmaco antiretrovirale associato a maggior rischio di tubulopatia.

- A: Tenofovir
- B: Zidovudina
- C: Lamivudina
- D: Efavirenz

Domanda #2 (codice domanda: n.382) :

Quale delle seguenti affermazioni relative al morbillo è corretta?

- A: È una malattia ad andamento endemo-epidemico
- B: Il tempo di incubazione è circa 3 giorni
- C: La vaccinazione post-esposizione è efficace se effettuata 8 giorni dopo l'esposizione
- D: È una malattia infettiva di tipo maculo-papulo-pustoloso

Domanda #3 (codice domanda: n.383) :

Nella teniasi, qual è il farmaco di prima scelta, tra i seguenti?

- A: Praziquantel
- B: Albendazolo
- C: Rifampicina
- D: Ampicillina

Domanda #4 (codice domanda: n.384) :

Il virus Ebola appartiene alla famiglia delle:

- A: Filoviridae
- B: Aremeviridae
- C: Togaviridae
- D: Coronaviridae

Domanda #5 (codice domanda: n.385) :

Nella terapia della malaria, quale tra questi farmaci è efficace anche sugli Ipnozoiti del Plasmodium vivax?

- A: Primachina
- B: Artemisina e derivati
- C: Meflochina
- D: Cloroquina

Scenario 1:

Un giovane di origine marocchina, in Italia da 2 anni, si presenta in Pronto Soccorso lamentando febbricola e calo ponderale di circa 5 kg negli ultimi 4 mesi, associate a tosse produttiva e a sudorazioni notturne. All'esame radiografico del torace viene riscontrato un addensamento al lobo superiore di destra in parte escavato. Viene posta diagnosi microbiologica di tubercolosi polmonare.

Domanda #6 (codice domanda: n.386) - (riferita allo scenario n. 1) :

Quale tra le seguenti rappresenta la prima linea terapeutica?

- A: Isoniazide + rifampicina + etambutolo + pirazinamide
- B: Isoniazide + amikacina + pirazinamide
- C: Rifampicina + etambutolo + pirazinamide + linezolid
- D: Rifampicina + etambutolo + linezolid + amikacina

Scenario 2:

Si presenta in Pronto Soccorso paziente di 40 anni, caucasico, proveniente dal Kenya. Riferisce febbre, astenia. Nega profilassi per malaria durante il soggiorno. All'esame emoscopico, presenza di trofozoiti di *P. falciparum*.

Domanda #7 (codice domanda: n.387) - (riferita allo scenario n.2) :

Quale di questi parametri NON identifica una forma di malaria grave?

- A: Piastrinopenia < 100.000
- B: Ipoglicemia < 40 mg/dL
- C: Iperparassitemia \geq 5%
- D: Insufficienza renale acuta

Scenario 3:

Si presenta in ambulatorio un uomo di 49 anni, egiziano, con anamnesi di episodi di ematuria.

Domanda #8 (codice domanda: n.388) - (riferita allo scenario n.3) :

Nell'ambito delle ipotesi infettive, quale agente eziologico deve essere escluso in prima istanza?

- A: Schistosoma haematobium
- B: Schistosoma mansoni
- C: Schistosoma japonicum
- D: Schistosoma mekongi

Scenario 4:

Un neonato di 21 giorni si presenta letargico con iperpiressia (38,5 °C), difficoltà respiratoria e anoressia; viene ricoverato nel sospetto di meningite batterica.

Domanda #9 (codice domanda: n.389) - (riferita allo scenario n.4) :

Quale tra i seguenti risulta essere il patogeno più frequentemente causa del quadro clinico descritto?

- A: Streptococcus agalactiae
- B: Chlamydia trachomatis
- C: Neisseria meningitidis
- D: Streptococcus pneumoniae

Scenario 5:

Il medico visita al domicilio un uomo di 75 anni, iperteso in trattamento, che riferisce la comparsa dalla notte precedente di febbre (38,5 °C) associata a dolore puntorio all'emitorace di sinistra e malessere. All'esame obiettivo il medico riscontra aumento del fremito vocale tattile, ipofonesi plessica e crepitii all'auscultazione.

Domanda #10 (codice domanda: n.390) - (riferita allo scenario n.5) :

Quale regime terapeutico domiciliare risulta più indicato?

- A: Amoxicillina/clavulanato + azitromicina per os
- B: Linezolid per os
- C: Vancomicina per os
- D: Gentamicina intramuscolo