

Domande relative alla specializzazione in: Urologia

Scenario 1:

Un paziente di 64 anni, forte fumatore e iperteso in terapia con amlodipina, riferisce difficoltà ricorrenti a ottenere un'erezione peniena soddisfacente da circa 8 mesi.

Domanda #1 (codice domanda: n.651) - (riferita allo scenario n. 1) :

Qual è l'eziologia più probabile della disfunzione erettile del paziente?

- A: Multifattoriale (età, ipertensione e fumo)
- B: Di natura psicogena
- C: Ipertrofia prostatica in terapia
- D: Unica causa è il fumo di sigaretta

Domanda #2 (codice domanda: n.652) - (riferita allo scenario n. 1) :

Quale terapia di prima linea è indicata per questo paziente, dopo il necessario intervento correttivo sui fattori di rischio?

- A: Inibitori della fosfodiesterasi tipo 5
- B: Inibitori selettivi del reuptake della serotonina
- C: Farmacoprotesi intracavernosa con Prostaglandina E1
- D: Impianto di protesi peniena

Scenario 2:

Un uomo di 19 anni si presenta in Pronto Soccorso per una tumefazione non dolente dell'emiscroto destro. Il paziente non lamenta sintomatologia di altro genere.

Domanda #3 (codice domanda: n.653) - (riferita allo scenario n.2) :

Qual è l'iter diagnostico più indicato per questo paziente?

- A: Esame obiettivo ed ecografia scrotale
- B: Esame completo delle urine e urinocoltura con antibiogramma
- C: RMN scrotale
- D: Uno spermioγραμμα

Domanda #4 (codice domanda: n.654) - (riferita allo scenario n.2) :

Si riscontra una completa disomogeneità ecografica dell'intero testicolo destro. Il paziente viene candidato a:

- A: intervento chirurgico per via inguinale, con esame istologico estemporaneo e orchifunicolectomia in caso di tumore maligno
- B: intervento chirurgico per via scrotale, con esame istologico estemporaneo del testicolo e orchifunicolectomia per via scrotale in caso di tumore maligno
- C: una biopsia testicolare trans-cutanea
- D: una spermio-coltura con antibiogramma

Scenario 3:

Un uomo di 45 anni giunge in Pronto Soccorso per una sintomatologia algica al fianco destro che si irradia fino all'inguine omolaterale, associata a nausea. Il dolore è insorto improvvisamente ed è poco responsivo a terapia antalgica.

Domanda #5 (codice domanda: n.655) - (riferita allo scenario n.3) :

La diagnosi più probabile è:

- A: colica renale destra
- B: esofagite da reflusso gastro-esofageo
- C: pancreatite
- D: diverticolite in diverticolosi del colon discendente

Domanda #6 (codice domanda: n.656) - (riferita allo scenario n.3) :

L'approccio diagnostico di prima istanza è:

- A: ecografia addome completo
- B: risonanza magnetica senza contrasto
- C: scintigrafia renale sequenziale
- D: ecografia addomino-pelvica

Scenario 4:

Un uomo di 28 anni si presenta in ambulatorio riferendo l'insuccesso nel tentativo di avere figli da circa 16 mesi. All'anamnesi riferisce di essere stato sottoposto da bambino a un intervento ai genitali, di cui però non conosce i dettagli.

Domanda #7 (codice domanda: n.657) - (riferita allo scenario n.4) :

L'esame obiettivo rivela la mancanza del testicolo destro. L'emiscroto destro presenta solo del tessuto fibroadiposo al suo interno. Si tratta di:

- A: esiti di intervento per criptorchidismo
- B: varicocele sx
- C: atrofia testicolare post-parotitica
- D: anorchia idiopatica

Scenario 5:

Un paziente di 40 anni giunge in Pronto Soccorso lamentando una erezione molto rigida, dolorosa e che si prolungava da più di 4 ore, non associata a stimolazione e/o a desiderio sessuale.

Domanda #8 (codice domanda: n.658) - (riferita allo scenario n.5) :

L'iter diagnostico più indicato per questo paziente è rappresentato da:

- A: anamnesi medica e sessuale accurata, seguita da esame obiettivo ed emogasanalisi dei corpi cavernosi
- B: ecografia dinamica del pene
- C: RMN del pene
- D: uretroscopia

Scenario 6:

Un uomo di 60 anni si presenta in ambulatorio riferendo di aver osservato delle urine francamente ematiche nel corso degli ultimi 3 mesi. Per il resto il paziente era asintomatico. Il paziente riferisce di aver lavorato nel campo delle vernici negli ultimi 30 anni, circa.

Domanda #9 (codice domanda: n.659) - (riferita allo scenario n.6) :

Qual è l'approccio terapeutico più corretto nel sospetto di un tumore alla vescica?

- A: Resezione endoscopica di eteroformazione vescicale
- B: Chemioterapia endovesicale
- C: Chemioterapia sistemica
- D: Radioterapia conformazionale

Scenario 7:

Un uomo di 45 anni si sottopone a una TC dell'addome con mezzo di contrasto per follow-up di una neoplasia onco-ematologica. Durante l'esame lo specialista radiologo osserva una formazione cistica del rene destro iperdensa, ovalare, di circa 3.5 cm, contenente numerosi setti e calcificazioni nodulari, ma senza impregnazione di mezzo di contrasto.

Domanda #10 (codice domanda: n.660) - (riferita allo scenario n.7) :

A quale categoria della classificazione di Bosniak corrisponde la lesione cistica indicata nel caso clinico?

- A: IIF
- B: IV
- C: II
- D: III