

Domande relative alla specializzazione in: Chirurgia Vascolare

Domanda #1 (codice domanda: n.261) :

Relativamente al trattamento endovascolare degli aneurismi dell'aorta sottorenale, il colletto deve avere una lunghezza:

- A: di almeno 10 mm
- B: non superiore agli 8 mm
- C: non superiore ai 6 mm
- D: di almeno 37 mm

Domanda #2 (codice domanda: n.262) :

La lesione di quale dei seguenti nervi NON è una complicanza contemplata della tromboendoarteriectomia carotidea?

- A: Nervo di Bell
- B: Vago
- C: Ipoglosso
- D: Glossofaringeo

Domanda #3 (codice domanda: n.263) :

L'associazione di emangiomi cutanei, varici e ipertrofia con abnorme allungamento degli arti prende il nome di sindrome di:

- A: Klippel-Trenaunay
- B: Brugada
- C: Gilbert
- D: Turner

Domanda #4 (codice domanda: n.264) :

Una dilatazione aneurismatica che si estende dall'arco aortico fino a 3 cm a valle delle arterie renali, che tipo di aneurisma è?

- A: II
- B: I
- C: III
- D: IV

Scenario 1:



Paziente di 65 anni lamenta dolore crampiforme a livello degli arti inferiori, bilaterale, insorgente durante la marcia dopo aver percorso circa 100 metri. In anamnesi ipertensione arteriosa sistemica, tabagismo attivo, ernia del disco L4L5 destro, impotenza erigendi.

Domanda #5 (codice domanda: n.265) - (riferita allo scenario n. 1) :

Porta in visione una ricostruzione della Angio-tomografia assiale computerizzata che dimostra:

- A: occlusione dell'aorta addominale sottorenale
- B: aneurisma dell'aorta addominale
- C: neoformazione rene sinistro
- D: malformazione artero-venosa della parete addominale

Scenario 2:

Paziente di 67 anni riferisce la comparsa di acrocianosi bilaterale delle dita dei piedi dolente a esordio improvviso, recente. In anamnesi terapia con anticoagulanti orali da 6 mesi per intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica con protesi meccanica; NO abitudine tabagica.

Domanda #6 (codice domanda: n.266) - (riferita allo scenario n.2) :

L'esame obiettivo mostra: cianosi delle dita dei piedi, assenza di deficit sensitivo-motori, termotatto conservato, no edema, polsi distali presenti e normosfigmici, normale riempimento venoso. Qual è il sospetto diagnostico?

- A: Blue toe syndrome
- B: Malattia di Buerger
- C: Trombosi venosa profonda
- D: Arteriopatia obliterante degli arti inferiori IV stadio

Scenario 3:

Un uomo di 58 anni, iperteso noto, si presenta in Pronto Soccorso lamentando l'insorgenza improvvisa di un dolore interscapolare, trafittivo e dilaniante, che si estende lentamente lungo la schiena.

Domanda #7 (codice domanda: n.267) - (riferita allo scenario n.3) :

Qual è la diagnosi più probabile?

- A: Dissecazione dell'aorta toracica
- B: Infarto del miocardio
- C: Colica biliare
- D: Colica renale

Scenario 4:

Un tecnico informatico di 58 anni, sovrappeso, iperteso, in terapia con PPI per recente sanguinamento di ulcera antrale, si presenta in Pronto Soccorso lamentando dolore improvviso alla gamba destra associato a parestesie. L'arto si presenta ipotermico e pallido dal ginocchio in giù, i polsi pedali sono assenti.

Domanda #8 (codice domanda: n.268) - (riferita allo scenario n.4) :

Qual è la diagnosi più probabile?

- A: Ischemia acuta
- B: Trombosi venosa profonda
- C: Crampi da ipokaliemia
- D: Paralisi ipocalcemia

Domanda #9 (codice domanda: n.269) - (riferita allo scenario n.4) :

Quale terapia si consiglia?

- A: Embolectomia
- B: Amputazione di coscia
- C: Eparina a basso peso molecolare
- D: Profilassi antibiotica

Scenario 5:

Una donna di 72 anni, degente in reparto di ortopedia per frattura di femore, sottoposta a osteosintesi e attualmente allattata, lamenta dolore sordo e crampiforme e sensazione di tensione alla gamba controlaterale, la caviglia appare edematosa, i polsi periferici sono presenti

Domanda #10 (codice domanda: n.270) - (riferita allo scenario n.5) :

Qual è la complicanza più grave che può svilupparsi in assenza di terapia nel caso descritto?

- A: Tromboembolia polmonare
- B: Infezione
- C: Ulcera da stasi
- D: Ulcera da pressione