

Domande relative alla specializzazione in: Neuropsichiatria infantile

Domanda #1 (codice domanda: n.1102) :

Qual è la caratteristica distintiva del disturbo dello spettro autistico noto come sindrome di Asperger?

- A: l'assenza di ritardo mentale
- B: l'assenza di comportamenti ripetitivi e stereotipati
- C: l'assenza di un restringimento del campo di interessi
- D: l'assenza di deficit nelle interazioni sociali

Domanda #2 (codice domanda: n.1104) :

Quale affermazione relativa alla balbuzie è FALSA?

- A: È determinata esclusivamente da fattori ambientali
- B: La maggior parte dei casi insorge entro il sesto anno di vita
- C: Prevale nei soggetti di sesso maschile
- D: Solo una minoranza dei casi persiste in età adulta

Domanda #3 (codice domanda: n.1107) :

Quale terapia è più clinicamente indicata in un bambino di 9 anni con enuresi notturna isolata, assenza di anomalie endocrinologiche e sintomi d'ansia?

- A: Desmopressina
- B: Fluvoxamina
- C: Metilfenidato
- D: Aloperidolo

Domanda #4 (codice domanda: n.1108) :

Quale delle seguenti classi di farmaci è più indicato per migliorare i comportamenti ripetitivi dei pazienti affetti da autismo?

- A: Inibitori selettivi del reuptake della serotonina
- B: Neurolettici
- C: Antipsicotici atipici
- D: Anticonvulsivanti

Domanda #5 (codice domanda: n.1109) :

Rispetto alla forma dell'adulto, il disturbo bipolare a esordio infantile si differenzia per:

- A: una peggiore prognosi
- B: un miglior funzionamento sociale
- C: minori oscillazioni dell'umore
- D: la non necessità di un intervento farmacologico

Scenario 1:

Un paziente di 9 anni viene condotto in Pronto Soccorso per la comparsa improvvisa di movimenti involontari, rapidi, irregolari e afinalistici che interessano tutti e 4 gli arti. La familiarità è negativa per disturbi del movimento e le facoltà cognitive e relazionali sono integre.

Domanda #6 (codice domanda: n.1111) - (riferita allo scenario n.1) :

Il sospetto diagnostico è di:

- A: corea di Sydenham
- B: corea di Huntington
- C: Disturbo dello spettro autistico
- D: sindrome di Tourette

Scenario 2:

Un paziente di 12 anni viene condotto all'attenzione medica per la presenza di tic motori e vocali e multipli. I primi sintomi erano comparsi l'anno prima ma si caratterizzavano solo per una chiusura improvvisa degli occhi e il sollevamento della spalla destra.

Domanda #7 (codice domanda: n.1112) - (riferita allo scenario n.2) :

Quale tra i seguenti esami è il meno utile?

- A: Elettromiografia
- B: TSH
- C: RMN
- D: Elettroencefalogramma

Domanda #8 (codice domanda: n.1113) - (riferita allo scenario n.2) :

Nel caso tutti gli esami strumentali fossero negativi, il trattamento più indicato sarebbe con:

- A: neurolettici
- B: antidepressivi
- C: benzodiazepine
- D: anticolinergici

Scenario 3:

Giunge all'osservazione clinica un adolescente con multiple crisi tonico-clonico generalizzate, storia di convulsioni febbrili, familiarità positiva per epilessia, assenza di comorbidità mediche e buon rendimento scolastico.

Domanda #9 (codice domanda: n.1114) - (riferita allo scenario n.3) :

Il sospetto diagnostico è di:

- A: epilessia mioclonica giovanile
- B: sindrome di Lennox-Gastaut
- C: epilessia associata ad autismo
- D: epilessia mioclono-astatica di Doose

Domanda #10 (codice domanda: n.1115) - (riferita allo scenario n.3) :

Il trattamento più indicato è con:

- A: acido valproico
- B: lamotrigina
- C: topiramato
- D: fenobarbital