

Domande relative alla specializzazione in: Medicina d'emergenza-urgenza

Domanda #1 (codice domanda: n.881) :

Quale dei seguenti farmaci può essere responsabile di nefropatia tossica?

- A: Colchicina
- B: Amiodarone
- C: Metronidazolo
- D: Pindololo

Domanda #2 (codice domanda: n.883) :

Il "segno del cassetto" identifica:

- A: la lesione dei legamenti crociati del ginocchio
- B: la calcolosi renale
- C: l'irritazione del peritoneo
- D: la frattura della base cranica

Domanda #3 (codice domanda: n.885) :

La manovra di disostruzione delle vie aeree superiori si chiama manovra di:

- A: Heimlich
- B: Ippocrate
- C: Kocher
- D: Pringle

Domanda #4 (codice domanda: n.887) :

Quale delle seguenti affermazioni è corretta in riferimento alla pericardite acuta?

- A: Il dolore è attenuato dalla posizione seduta
- B: L'ECG registra alti voltaggi
- C: La causa è quasi sempre identificabile
- D: Il dolore è alleviato dalla respirazione profonda

Scenario 1:

Un uomo di 57 anni, forte bevitore, viene ricoverato in Ortopedia per trauma e caduta accidentale da una scala.

Domanda #5 (codice domanda: n.891) - (riferita allo scenario n.1) :

Qual è la manifestazione più grave della crisi di astinenza da alcol?

- A: Delirium tremens
- B: Insonnia
- C: Attacchi di panico
- D: Microzoopsie

Scenario 2:

Si presenta in Pronto Soccorso un paziente maschio di 77 anni inviato dal medico curante per riscontro, durante una visita di controllo, di fibrillazione atriale (FA) non accertata precedentemente.

Domanda #6 (codice domanda: n.894) - (riferita allo scenario n.2) :

Tutti i seguenti possono essere fattori favorenti lo sviluppo della FA, tranne:

- A: ipotiroidismo
- B: ipertiroidismo
- C: polmonite
- D: abuso di alcool

Domanda #7 (codice domanda: n.895) - (riferita allo scenario n.2) :

Il paziente è asintomatico ed emodinamicamente stabile, quindi la priorità è:

- A: controllo farmacologico della frequenza cardiaca
- B: cardioversione elettrica
- C: cardioversione farmacologica
- D: eseguire una coronarografia

Domanda #8 (codice domanda: n.896) - (riferita allo scenario n.2) :

Quale tra i seguenti segni e sintomi NON si può attribuire alla fibrillazione atriale?

- A: Aumento della pressione arteriosa
- B: Ipotensione arteriosa
- C: Angina pectoris
- D: Cardiopalmo

Scenario 3:

Un bambino di 18 mesi giunge in PS per tosse abbaiante, tendenza al sopore e cianosi.

Domanda #9 (codice domanda: n.897) - (riferita allo scenario n.3) :

Quali sono i parametri cardine per la valutazione della gravità del bambino affetto da crup?

- A: Stridore respiratorio, colorito della cute, stato di coscienza, frequenza respiratoria, rientramento degli spazi intercostali
- B: Temperatura ascellare e rettale, PaO₂, PaCO₂
- C: Pressione arteriosa, diuresi oraria, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria
- D: Pressione venosa centrale, colorito della cute, diuresi nelle 24 ore, dosaggio dei bicarbonati sierici

Domanda #10 (codice domanda: n.898) - (riferita allo scenario n.3) :

Qual è la terapia d'attacco per la crisi acuta?

- A: Desametasone im e Budesonide/Beclometasone per aerosol. Nei casi più gravi adrenalina in aerosol
- B: Prednisolone ev
- C: Intubazione nasotracheale di principio
- D: Ossigenazione iperbarica associata ad antibiotici ad ampio spettro